



# সামাজিকনীতি

নবম সংস্করণ

শ্রী প্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত

কল্যাণ একাডেমি দ্বারা



# সব্‌জীবাগ

( নবম সংস্করণ )

কৃষিক্ষেত্র, স্মৃতিকাঁতত্ব, ভূমিকর্ষণ, প্রভৃতি রচয়িতা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে

*Late Fellow of the Royal Horticultural Society of London;  
Late Superintendent of Gardens and Farms, Raj-  
Durbhanga ; the Nizamat Gardens Murshelabad ;  
Chaluvamba Vilas Park, Mysore ; formerly  
of the Cossipur Institution of  
Horticulture & , & ,*

প্রণীত

*All rights Reserved.*]

মূল্য এক টাকা মাত্র ।









# সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়		সপ্তম অধ্যায়	
অবতরণিকা (১) ...	১	সব্জীবাগের শত্রু ও মিত্র	৪১
এ (১) ...	৩	অষ্টম অধ্যায়	
এ (৩) ...	৫	সব্জীর প্রয়োজনীয়তা	৪৬
এ (৪) ...	৯	নবম অধ্যায়	
এ (৫) ...	১১		
দ্বিতীয় অধ্যায়		বাঁধা কপি	৫৩
চোকা ও পটি ...	১৬	ফুল কপি	৫২
তৃতীয় অধ্যায়		ওল কপি	৬২
ভাটী ...	১০	শালজম	৬৩
চতুর্থ অধ্যায়		গাজর	৬৪
বীজসংগ্রহ ও বীজ রক্ষা	২০	ব্রকোলি	৬৭
পঞ্চম অধ্যায়		ব্রসেলস	৬৯
বীজ বপন ...	২৫	লেটিউস্	৭১
বপনের সময় ...	২৯	দশম অধ্যায়	
বীজের প্রকৃতিভেদ ...	৩১	মূলজ উদ্ভিদের চারা উৎপাদন	৭৩
বীজ অঙ্কুরিত হয় না কেন ?	৩২	লীক	৭৭
চারা ...	৩৬	পলাঙ বা পেঁয়াজ	...
ষষ্ঠ অধ্যায়		গন্ধন বা গদিনা	৮১
ক্ষেত্রে চারা রোপণ	৩৯	লম্বণ	৮১

একাদশ অধ্যায়		দ্বাদশ অধ্যায়	
মটর বা কলাই স্ট্রুটি	৮২	শসা	...
টমেটো বা বিলাতী বেগুন	৮৫	লাউ	...
গোল আলু	৮৮	ভুট্টা	...
বীন	৯৩	লঙ্কা	...
আটিচোক	৯৪	সেলেরি	...
বার্গাকু	৯৭	আম-আদা	...
বাকলা	১০৫	মেথি	...
বিলাতী বাকলা	১০৬	ধন্ডা বা ধনিয়া	...
মুলা	১০৬	পুদিনা	...
স্যানসিকি	১০৯	পিপারমেন্ট	...
পারদ্রিপ	১১০	টাইম	...
মোরী	১১১	দ্বাদশ অধ্যায়	
শুল্কা শাক	১১২	নটেশাক	...
কালজিরা	১১২	ডেলো	...
বেতুয়া বা বেতোশাক	১১২	লালশাক	...
পালঙ	১১৩	পুতিকা বা পুই	...
চুকা পালঙ	১১৫	বিলাতী বা মিঠে-কুমড়া	...
বরবটী	১১৫	সাঁচি বা চাল-কুমড়া	...
সীম	১১৬	তেলাকুচা	...
মাখন সীম	১১৬	কাঁকড়	...
চারকোণা সীম	১১৭	ঝিজে	...
স্কোয়াশ	১১৮	পটোল	...
জীরা	১২০	উচ্ছে	...
		করলা	...

ଧୁହଳ	...	୧୭୨	ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ	
ଚିଚିଳା	...	୧୭୩	ତରମୁଞ୍ଚ	... ୧୮୧
ଡେ଼଼ସ	...	୧୭୪	ବୈଢ଼ୋ	... ୧୮୧
ମେନ୍ତା ବା ମାଳ-ଅବରୀ	...	୧୭୫	ବରମୁଞ୍ଚା	... ୧୮
ମର୍ଜିନା	...	୧୭୫	ହୁଟି	... ୧୮୧
ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ			ଟେପାରୀ	... ୧୮୮
ହୁବଢ଼ି ଆଳୁ	...	୧୭୧	ମାଙ୍କାଳୁ	... ୧୮୨
ରାଜା ଆଳୁ	...	୧୭୨	ହୁବେରି	... ୧୨୦
ମକରକନ୍ଦ ଆଳୁ	...	୧୧୧	କେନ୍ଦୁର	... ୧୨୦
ମାନକ ବା ମାନକହୁ	...	୧୧୩	ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ	
ଶୋଳାକହୁ	...	୧୧୬	ଆନର୍ଦ୍ଦନୀ	... ୧୨୪
ମଞ୍ଜୁଷ୍ଠୀ କହୁ	...	୧୧୬	ଆନର୍ଦ୍ଦନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ	
ମୁଷ୍ଠୀକହୁ	...	୧୧୧	ଉପକାରିତା	... ୧୨୧
ଓଳ	...	୧୧୨		



# সব্জীবাগ

## প্রথম অধ্যায়

### অবতরণিকা

( ১ )

সব্জীবাগের জন্ম বারমেসে জমীর প্রয়োজন। উচ্চতা বা নিম্নতা অনুসারে ভূমি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যে ভূমিতে বারমাসই আবাদ হইতে পারে তাহাকে ‘বারমেসে’, যে জমীতে সম্বৎসরে দুইবার আবাদ হইতে পারে তাহাকে ‘দো-ফসলে’, এবং যে জমীতে একবার মাত্র আবাদ হইতে পারে তাহাকে ‘এক-ফসলে’-জমী কহে। উচ্চনিম্নতানুসারে শ্রেণীনির্দেশ হইয়া থাকে। অতিরিক্ত জল সঞ্চিত হইয়া যে জমী অগ্রহায়ণ মাস বা পৌষ মাস পর্য্যন্ত ডুবিয়া থাকে তাহাই এক-ফসলে জমী, কারণ তাহাতে একটা ফসলের অধিক আবাদ চলে না। ‘ভাহুই’ ফসল যে জমীতে জন্মিয়া থাকে, তাহাকে দো-ফসলে জমী বলা যায়। যে সময়ের যে সব্জী, তাহা উৎপন্ন করিতে হইলে বারমাস যে স্থানে আবাদ করা চলিতে পারে, এরূপ স্থান নির্বাচন না করিলে সমুদ্র-বিপত্তি ঘটবার সম্ভাবনা। ~~ইহা~~ প্রতিনিয়ত দেখা যায় যে, সামান্ত বৃষ্টিপাতেই অনেক জমী ডুবিয়া যায় কিম্বা বৃষ্টির অল্পতা প্রযুক্ত নীরস ও কঠিন হইয়া ফসলের অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে।



ভূমি নির্বাচন সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। জমীর মধ্যে বিস্তৃত আওতা বা ছায়া না থাকে, জমী অতিরিক্ত উচ্চ বা ডোবা না হয় এবং অতিরিক্ত বর্ষার সময় ক্ষেত্রে যে জল সঞ্চিত হয়, তাহা অনায়াসে নির্গত হইয়া যাইতে পারে তাহার উপায় করিতে হইবে। এজন্ত ক্ষেত্রের চারিদিকে অথবা ঢালুদিকে পগার থাকা উচিত। এতদ্ব্যতীত ক্ষেত্রের মধ্যে বা সন্নিহিত জল আয়োজন রাখিতে হইবে। সব্জীক্ষেত্রে প্রায় সর্বদাই জলের আবণ্ণক হইয়া থাকে। ক্ষেত্র হইতে অধিক দূরে পুষ্করিণী বা কূপ থাকিলে তাহা হইতে জল তুলিয়া ক্ষেত্রে আনিতে অনেক খরচ পড়ে এবং অনেক সময়ে পরিশ্রম নষ্ট করিতে হয়।

গো, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি জন্তুগণ অনেক সময় সব্জীক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বিশেষ ক্ষতি করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত ক্ষেত্রের চারিদিকে ৩৪ হাত উচ্চ করিয়া বেড়া দেওয়া উচিত। বেড়ার জন্ত মেদি, শিয়ালকাঁটা, ভেরেণ্ডা, রাংচিত্রা, কামিনী, ডুরেন্টা প্রভৃতি গাছ বিশেষ উপযোগী। এই সকল গাছ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে এবং যতই ছাঁটিয়া দেওয়া যায়, ততই ঘন হইয়া থাকে। জিওল গাছেও উত্তম মজবুত বেড়া হইয়া থাকে। ব্যোয়ক্সিসহকারে ইহাদিগের কাণ্ড সকল স্থূলতা প্রাপ্ত হইলে বেড়া অধিকতর মজবুত ও দৃঢ় হয়। উল্লিখিত গাছসকল রোপণ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না অথবা তাহা ব্যয়সাপেক্ষও নহে। স্থানান্তর হইতে বর্ষাকালে ইহাদিগের শাখা কাটিয়া আনিয়া পুঁতিয়া দিলে একমাসের মধ্যেই শাখা-প্রশাখা উদগত হইয়া থাকে। তখন তাহাদিগকে চেরা বাঁশ বা কক্কির দ্বারা বাঁধিয়া দিতে হয়।

ক্ষেত্র বিস্তৃত হইলে, তাহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা উচিত। সাধারণতঃ এদেশে বৎসর মধ্যে তিনটি সব্জী ফসল জন্মিয়া থাকে। শীত, গ্রীষ্ম

ও বর্ষা—এই তিন ঋতুতেই ফসলগুলিকে বিভক্ত করা যায়। কপি, শাল-গম, গাজর, বীট, নুলা, সীম, পেঁয়াজ, লসুন, মটর, লাউ প্রভৃতি শীত-কালের তরকারী। কুমড়া, ঢেঁড়স, কুলি-বেগুন, পটোল, নটে ও ডেঙ্গো শাক প্রভৃতি গ্রীষ্মকালের তরকারী, এবং উচ্ছে, চিচিঙ্গা, ধুঁন্দুল, ঝিঙ্গে প্রভৃতি বর্ষাকালের তরকারী। একই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বারমাস সব্জীর আবাদ করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয় না, অধিকন্তু এক ফসলের সময় সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ না হইতেই পরবর্তী ফসলের আবাদ করিবার সময় অতি-বাহিত হইয়া যায়। এই সকল কারণে তিন ঋতুর ফসলের জন্ত তিনটা স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যিক। অবিশ্রান্ত একই ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ আবাদের পক্ষে আর একটা আপত্তি—গুরুতর আপত্তি এই যে, এক আবাদ শেষ হইবার পরে তাড়াতাড়ি বশতঃ যে কোন প্রকারে জমির পাট শেষ করিয়া দ্বিতীয়বার ফসল বুনিলে আশাজনক ফললাভ করিতে পারা যায় না। এক ফসল উঠিয়া গেলে, অন্ততঃ একমাসও সেই জমিকে বিশ্রাম দিয়া, পরে যথাবিধি পাট করিয়া দ্বিতীয় ফসলের আবাদ করিতে হয়। এই সকল কারণ অতিশয় সামান্য বোধ হইলেও, অবশেষে যে ইহাই লাভ ও ক্ষতির মূলীভূত কারণ হইয়া থাকে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাতেই বুঝেন।

## অবতরণিকা

২

এই প্রস্তাবে আমরা দেখিব যে, ক্ষেত্রের উর্বরতা কি উপায়ে বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। বহুল পরিমাণে সার প্রয়োগ করিলে ও বারমাস চল-চালনা করিলে ক্ষেত্র শস্যশালী হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহা পরের কথা।

কি উপায়ে মৃত্তিকার স্থায়ী উপকার সাধিত হইতে পারে, অগ্রে তাহাই বিবেচ্য।

বর্ষার জল ক্ষেত্রে অধিকক্ষণ না আটকাইয়া থাকে, ইহারই প্রতি প্রধান লক্ষ্য রাখিবে। ভূমি সমতল হইলেই যে উঁচু উৎকৃষ্ট হইল এরূপ মনে করা বিষম ভ্রম। সমতল ভূমিই অধিকতর দূষিত হইবার সম্ভাবনা। সমতল ভূমির জল-নিকাশ হইতে না পাইয়া ক্ষেত্র-মধ্যেই শোষিত হইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন ভূগর্ভের উত্তাপ হ্রাস-প্রাপ্ত হয় এবং শৈত্যের আধিক্য হয়। নিম্নতল জমীতেও উত্তাপের অল্পতা হেতু তরিতরকারি উত্তম ভাবে জন্মিতে পারে না। এইজন্য সমতলতাই জমীর প্রশংসা-পত্র নহে। জমীকে ঈষৎ ঢালু বা গড়েন করিতে হইবে; কিন্তু তাহা অতি সাবধানে ও যত্ন-সহকারে করা উচিত। প্রথমতঃ, মৃত্তিকার গঠন পরীক্ষা করিয়া, পরে কিরূপ ঢালুতা তাহার পক্ষে প্রয়োজন তাহা স্থির করিতে হইবে। যে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা অতিশয় লঘু ও জলশোষক (porous) তাহা ২০০ ফুটে ২১৩-ইঞ্চ ঢালু করিতে হইবে, কিন্তু কঠিনও এঁটেল জমীতে প্রতি ১৫০ ফুট ৩ ইঞ্চ নামাইলে ভাল হয়। উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বিত হইলে ভূপৃষ্ঠোপরি দীর্ঘকাল জল সঞ্চিত থাকিবার তত আশঙ্কা থাকে না। অতঃপর জমীর নিম্ন-স্তরের (sub-soil) প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেবল উপরি-স্তরের বা তলাচির (surface-soil) ৫।৭ বা ৮।১০ ইঞ্চ মাটির অবস্থা দেখিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া কোনও মতে উচিত নহে। অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায় যে, উপরের মাটি চলনসই অথচ এক হাত নিম্নের মৃত্তিকা-স্তর এতই শক্ত এঁটেল যে, উপরিভাগের রস অধিক দূর নিম্নে প্রবিষ্ট হইতে পারে না কিম্বা শোষিত হইতে বিলম্ব হয়, তন্নিবন্ধন মাটি সর্বদা অগ্নাধিক সিক্ত থাকে এবং তাহাতে উত্তাপের অভাব উপলব্ধি হয়। নিম্নস্তরের মাটি যে কেবল এঁটেল হইতে পারে তাহা নহে, বালুকাময় হওয়াও অসম্ভব

নহে। নিম্নস্তর বালুক-প্রধান বা কঁকুরে হইলে উপরিস্তরের মাটিতে অতি সহজেই রসভাব হয়।

ক্ষেত্রের মৃত্তিকা ২১৩ ফুট গভীর করিয়া কোদলাইয়া ও বারম্বার উলট-পালট করিয়া লইতে পারিলে স্থানীয় মাতীর যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইতে পারে। সবজী-ক্ষেত্র হইতে নিরন্তর রাশি রাশি উদ্ভিদ-খাত্ত নির্গত হইয়া যায়। ভূপৃষ্ঠের বহুপরিমাণ সূক্ষ্ম উদ্ভিদ-খাত্ত রসের সহিত ভূগর্ভ মধ্যে নামিয়া যায়, কিন্তু স্বল্পজীবী তরিতরকারীর গাছপালা-সকল তাহা হইতে আহারীয় সংগ্রহ করিতে পারিবার পূর্বেই মরিয়া যায় কিম্বা সংগৃহীত হয়। যে ক্ষেত্রে শৈত্য অধিক বা যে মাটি বেশী ভিজ়ে, তাহা স্বভাবতঃই অল্পাধিক উত্তাপহীন কিম্বা তাহাতে উত্তাপের ভাগ অল্প বা নাই। তাহাকে খনন বা উলট-পালট করিয়া তবে স্থায়ীরূপে সবজী-ক্ষেত্রে পরিণত করা উচিত, নতুবা নিম্নস্তরের দোষে উপরিভাগের মাটি ও জড়বৎ হইয়া যায়। \*

মৃত্তিকার ধারকতা ( power of retention ) বুঝিয়া জমীকে অল্পাধিক ঢালু করিতে হইবে, একথা পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে। মাটি যতই আল্গা অথচ দৃঢ় থাকিবে ততই তাহা সুর হইবে। কঠিন ও ঢেলা-বিশিষ্ট হইলে মাটি শুষ্ক ও নীরস হয়।

## অবতরণিকা

৩

আবাদ করিবার পূর্বে কয়েকটা বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ক্ষেত্রে গাছ বসাইবার অন্ততঃ ৫১৭ দিন পূর্বে ভূমিকে উত্তমরূপে কর্ষণ ও মাটিকে চূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে। বিদ্যমান বীজ-ব্যবসায়ীর

---

\* মৎপ্রণীত 'কৃষিক্ষেত্রে' এ বিষয় বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে।

যায়। ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। এক দিন বা ছই দিনের মধ্যে জমীকে বারম্বার কোদাল দ্বারা কোপাইয়া বা লাঙ্গল দ্বারা চষিয়া চূর্ণ করিলে তাদৃশ উপকার হয় না। কেন না, ইহাতে সমুদয় মৃত্তিক অধিক্ষণ বাতাস বা সূর্যালোকের সংস্পর্শে থাকিতে পায় না, ফলতঃ উপরিভাগের মাটিরই কথঞ্চিৎ উপকার হইয়া থাকে।

এঁটেল মাটি হালকা করিতে হইলে, তাহাতে বালি-মাটি, পাতা-সার, পলি বা প্রাণিজ টাটকা-সার প্রদান করা উচিত। কিন্তু ফসল বিনিবার অব্যবহিত পূর্বে জমীতে টাটকা-সার প্রদান করিলে ক্ষেত্রে নানাবিধ কীট জন্মিয়া ফসলের ক্ষতি করে।

নিতান্ত বেলে-মাটির প্রকৃতি পরিবর্তন করিয়া দোয়াঁশ করিতে হইলে, আবশ্যকমত এঁটেল-মাটি সংযুক্ত করা আবশ্যক।

বেলে-মাটির সহিত পুষ্করিণীর পান-মাটি মিশ্রিত করিলে এক দিকে যেরূপ উহা হালকা হয়, অত্র দিকে সেইরূপ উর্বরা হইয়া থাকে।

বাগানের জমীর পরিমাণ অল্প হইলে, এঁটেল বা বেলে-মাটির স্বভাব পরিবর্তন করিয়া ‘বারমেসে’ বা সাধারণ ফসলোপযোগী করিয়া লওয়া আবশ্যক, কিন্তু জমীর পরিমাণ অধিক হইলে এরূপ আড়ম্বর করিয়া মাটি সংস্কার করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ সেই সকল জমীতে যে ফসল জন্মিতে পারে, তাহারই জন্ত উহা স্বতন্ত্র রাখিলেই চলিতে পারে।

এঁটেল-মাটি সূক্ষ্মপরমাণুবিশিষ্ট বলিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত উহার মধ্যে রস সঞ্চিত থাকে, সুতরাং উহাতে শীত ও গ্রীষ্মকালেও ফসল জন্মিতে পারে, কিন্তু বর্ষাকালে শীঘ্র জল শুষ্ক হইতে না পারিয়া, জমীকে অত্যন্ত আর্দ্র করিয়া রাখে। উত্তাপের অল্পতা বা আধিক্যবশতঃ

ফসলও সমধিক আশাশ্রুত হইতে পারে না। অগ্র দিকে আবার বেল-মাটি এত শীঘ্র নীরস হইয়া পড়ে যে, শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে ধূলাবৎ হইয়া যায়। ইহাতে ফসলের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে; কিন্তু মাটি দো-বরা অর্থাৎ দোয়াঁশ হইলে তাদৃশ ভয়ের কারণ থাকে না।

## অবতরণিকা

৪

একই জমীতে বারমাস আবাদ না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর ফসলের জ্ঞাত ভিন্ন ভিন্ন জমী নির্দিষ্ট রাখিতে পারিলে ভাল হয়। জমীতে আবাদ হইলেই তাহার অল্লাধিক সারাংশ হ্রাস পাইয়া থাকে, সুতরাং উপযুক্ত পরিমাণে তাহাতে আবাদ করিলে মাটি শীঘ্র হীনতেজ হইয়া পড়ে। একটা ফসল উৎপন্ন করিয়া লইয়া, যদি সে জমীকে কিছুদিন, অন্ততঃ ২১ মাসও পতিত রাখা যায়, তাহা হইলে মৃত্তিকা বিশ্রাম পায়, এবং সেই অবসরে রৌদ্র, বায়ু ও শিশিরের সংস্পর্শে,—সম্পূর্ণরূপে না হইলেও, অনেক পরিমাণে উহা পূর্বাভ্যাস হইয়া থাকে। ইহা সচরাচর দেখা যায় যে, কৃষকগণ অবিশ্রান্তভাবে জমী হইতে ফসল উৎপন্ন করিয়া জমীকে একেবারে অকর্মণ্য করিয়া ফেলে, অবশেষে সে জমী পরিত্যাগ করিয়া অন্য জমীর অন্বেষণ করে। কিন্তু জমীকে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম দিলে সেরূপ ঘটিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। কয়েক মাস জমী পতিত থাকিলে একদিকে যেমন তজ্জ্ঞাত খাজনার দায়ী হইতে হয়, অন্য দিকে

তেমনই পরবর্তী ফসলের দ্বারা তাহা অপেক্ষা অধিকতর লাভবান হইবার আশা থাকে এবং অধিক লাভ হইয়া থাকে।

সকল জমীই যে এক ফসলের পরে পতিত রাখিতে হইবে তাহার কোন প্রয়োজন দেখি না। যে জমীতে নগণ্য শাকসজ্জী জন্মিয়া থাকে, তাহা পতিত রাখিবার প্রয়োজন হয় না; তবে যে জমীতে অর্থকরী, মূল্যবান ও উপাদেয় তরকারীর আবাদ করিতে হইবে, সে জমীকে পতিত রাখা নিতান্ত প্রয়োজন।

এরূপ অনেক জমী আছে, যাহাতে সূচাক্রমে কোন ফসল জন্মে না; কিন্তু সেই জমীকে উর্বর করিবার জন্য তাহাতে নানাবিধ সার প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। এবশ্পকারের জমীতে চূণ প্রদান করিলে মাটির অনেক দোষ সংশোধিত হইয়া যায়, মাটিও উর্বর হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত চূণ দ্বারাও এঁটেল মাটি আলগা হইয়া থাকে।

ক্ষেত্র মধ্যে আগুন জ্বালাইয়া দিলেও তাহার অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। ক্ষেত্র মধ্যে আগুন জ্বালাইতে হইলে প্রথমতঃ জমীকে একবার কোপাইয়া, পরে তাহার স্থানে স্থানে শুষ্ক তৃণ জঙ্গলাদি একত্র করিয়া আগুন দিতে হয়। সেই সকল জঙ্গলাদি যাহাতে প্রজ্জ্বলিত না হইয়া, গুমাইয়া-গুমাইয়া পুড়িতে পারে, সেজন্ত স্তূপের উপরে ও মধ্যে কাঁচা ঘাস বা জঙ্গলাদি মিশাইয়া দিতে হইবে। স্তূপের সমুদয় জঞ্জাল শুষ্ক থাকিলে সহজেই জলিয়া উঠে, কিন্তু গুমাইয়া পুড়িয়া অর্দ্ধ-দগ্ধ হইলে জল সিঞ্চন দ্বারা নির্বাপিত করিয়া দিলে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহা পূর্ণদগ্ধ ভস্ম অপেক্ষা মূল্যবান হয়। ক্ষেত্রের মধ্যে অধিকক্ষণ বা অতিরিক্ত পরিমাণে আগুন জ্বলিলে আর একটা অনিষ্ট ঘটবার আশঙ্কা এই যে, মৃত্তিকাস্তর্গত অনেক জৈব (organic) সারাংশ পুড়িয়া যায়, ফলতঃ মৃত্তিকা লালাভ হইয়া যায়। মাটি পুড়িয়া গেলে, তাহার মধ্যস্থিত কীটপতঙ্গাদি বিনষ্ট

হইয়া যায়, মাটির দূষিত বায়ু সংশোধিত হয়, এবং মৃত্তিকায় কার্বনের বা  
অক্সিজেনের ভাগ বদ্ধিত হইয়া বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন ও আমোনিয়া  
আকর্ষণ করে, তন্নিবন্ধন ক্ষেত্রের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়া থাকে ।

## অবতরণিকা

৫

সব্জীবাগে সাধারণতঃ গোয়াল বা অশ্ব-শালার আবর্জনা, খৈল, লবণ,  
অস্থিচূর্ণ প্রভৃতি সার ব্যবহৃত হইয়া থাকে । প্রত্যেক সারের কার্য স্বতন্ত্র,  
সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে তাহার আলোচনা করিতেছি । গবাদিগ্ৰাস সার কৃষি  
ক্ষেত্রে উত্তমরূপে না পচাইয়া কোন ফসলে ব্যবহার করা উচিত নহে । ঐ  
সকল স্তম্ভ-অনীত সার ব্যবহৃত হইলে ক্ষেত্র নানাবিধ কীটপতঙ্গাদির  
আকর হইয়া উঠে । অনেকে ক্ষেত্রে চারা রোপণ বা বীজ বপন করিবার  
অব্যবহিত পূর্বে মৃত্তিকার সহিত সার মিশ্রিত করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা  
দ্বারা যে ঘোর অনিষ্ট ঘটয়া থাকে তাহা বোধ হয় তাঁহাদিগের জানা  
নাই । প্রথমতঃ দেখা যায় যে, উহা যত দিন পর্য্যন্ত না উত্তমরূপে পচিয়া  
যায়, ততদিন উদ্ভিদ-শরীরে সারের কোন কার্য বা ফল হয় না । দ্বিতীয়তঃ  
নূতন সার-প্রদত্ত-স্থানে চারা বসাইলে, সেই সার বিগলিত হইবার সময়  
এতই উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে, তাহাতে চারা গাছের প্রভূত অনিষ্ট হয় ।  
অতঃপর দেখা যায় যে, সেই সার পচিয়া উদ্ভিদের আহরণের উপযোগী  
হইবার পূর্বেই গাছ অনেক বড় হইয়া পড়ে ; ফলতঃ সেই সারের কার্য  
তৎসমুদয় উদ্ভিদের পক্ষে অধিক ফলপ্রদ হয় না । এই জন্য ক্ষেত্রে লাঙ্গল  
দিবার সময়েই এক দফা সার সংযোজিত করিলে জমীর পরবর্তী পরিচর্যা-



কালে মাটির সহিত উহা মিশিয়া যায়। পরে ফসলের সময় যদি পুনরায় কোন সার দিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উত্তম অর্দ্ধ পুরাতন সার দিলেই চলিতে পারে। ক্ষেত্রে চারা রোপিত হইবার অন্ততঃ ১৫।২০ দিন পূর্বে খৈল কিম্বা গবাদি পশুর সার সংযোজিত করা উচিত। অস্থিচূর্ণ বিগলিত হইতে ঋতুভেদে ২।৩ মাস হইতে ৫।৬ মাস সময় লাগে। বলা বাহুল্য, শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মবর্ষাদিতে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র বিগলিত হয়।

লবণ-প্রয়োগে জমীর পোকা মরে এবং গোড়ায় অল্লাধিক পরিমাণে লবণ প্রদান করিলে গাছ অতি দ্রুতভাবে বাড়িয়া থাকে। লবণ সাধারণ সাররূপে গণ্য নহে; কিন্তু উহার সংযোগে মৃত্তিকাস্তর্গত গলনীয় পদার্থ সকল অপেক্ষাকৃত শীঘ্র বিগলিত হয়। কোন কোন ফসলের পক্ষে লবণ বিশেষ উপকারী। লবণ-প্রয়োগে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। লবণের মাত্রা অধিক হইলে উদ্ভিদের ক্ষতি হইয়া থাকে। সাবধান, যেন গাছের মূলদেশে লবণ কোনওরূপে সংস্পৃষ্ট না হয়।

প্রাণিজ আবর্জনা সব্জীবাগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, কিন্তু ব্যবহার করিবার পূর্বে উহাকে উত্তমরূপে বিগলিত করিয়া লইতে হইবে। এজন্ত ক্ষেত্রের কোনও নিভৃত স্থানে নির্মিত পাকা হৌজ মধ্যে সার সঞ্চিত করিয়া রাখা উচিত। সারের সহিত খণ্ড খণ্ড বিচালি বা খড় মিশাইয়া রাখিলে উহা অপেক্ষাকৃত শীঘ্রই পচিয়া যায়। অনেকে গর্তের মধ্যে সার রাখিয়া মাটি চাপা দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে সার পচিতে বিলম্ব হয় এবং তন্মধ্যে উত্তাপ জন্মে। ফলতঃ স্তূপাস্তর্গত অনেক সারাংশ নষ্ট হইয়া যায়। এজন্ত গর্তের উপরিভাগে ঘনভাবে মাটি চাপা না দিয়া উপরে বরং চালা বাঁধিয়া দিলে সমধিক উপকার দর্শিয়া থাকে। চালা বাঁধিয়া দিতে অনুবিধা হইলে সারসঞ্চিত গর্তের মধ্যস্থিত আবর্জনাবিশিষ্ট উপরিভাগে

চেটাই বা ঝাঁপ প্রসারিত করিয়া তহুপরি মাটি চাপা দেওয়া উচিত। উপরে চাপা না দিলে সারের জলীয় ভাগ শুষ্ক হইয়া যায় এবং বাষ্পীয় সারাংশ সেই সঙ্গে উড়িয়া যায়। অতঃপর ইহাও দেখিতে হইবে যে, বৃষ্টির জলে সার না ধৌত হইয়া চলিয়া যায়। এজন্য তাহার প্রতিরোধস্বরূপ হয় গর্তের চারিদিকে দৃঢ়রূপে আল দিতে হইবে কিম্বা গর্তটি সার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ভরুট না করিয়া জমীর উপরিতাপ হইতে আধ হাত নিম্নদেশ পর্য্যন্ত ভরাট করা ভাল। আপাত-ব্যবহার্য্য বলিয়া সার-সম্পর্কীয় সূক্ষ্মাংশেরই কল্যাণ অধিক। উক্ত সূক্ষ্মদশা প্রাপ্ত পরমাণুরাশি যদি বিধৌত হইয়া বহির্দেশে নির্গত হইয়া যায় তাহা হইলে অবশিষ্ট সূক্ষ্মাংশ দ্বারা ফসলের আশু উপকারের বিশেষ আশা করা যাইতে পারে না।

সবজীসারের মধ্যে ক্ষেত্রস্থিত লতা-পাতা, আগাছা, পুষ্করিণীর পানা, শেওলা, কচুরী প্রধান এবং সহজলভ্য। আগাছা-আবর্জনা করিয়া ক্ষেত্রে প্রদান করিতে পারিলে প্রভূত উপকার দর্শিয়া থাকে। পাতাসার অনেক স্থলে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু শুষ্কী-কলমী পানা বা শেওলা কিম্বা কচুরী (hyacinth) কদাচ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। অনেক পুষ্করিণী, জলা ও বিলে উল্লিখিত আগাছাসকল প্রভূত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, কিন্তু সাররূপে ব্যবহার নাই বলিয়া তৎসমুদায় অনর্থক নষ্ট হইয়া থাকে। পুষ্করিণী হইতে যখন শেওলা বা পানা পরিষ্কৃত হয়, তখন তাহা যথেষ্ট ফেলিয়া না দিয়া ক্ষেত্রের মধ্যে কয়েক দিবস প্রসারিত রাখিলেই তৎসমুদায় অচিরে পচিয়া যায় এবং তখন ক্ষেত্রে হলচালনা করিলেই মাটির সহিত মিশিয়া যায়।

অনেক সবজীর পক্ষে তরল-সার বিশেষ উপযোগী; কিন্তু আশু উপকার লাভের জন্তও তরল-সার ব্যবহৃত হইতে পারে। এতদ্বারা যেরূপ তৎপর উপকার দর্শিয়া থাকে, সেইরূপ ইহার উপকারিতা বড়ই ক্ষণিক। যাহা হউক, তরল-সার প্রস্তুত করিতে হইলে গবাদি পশু এবং পক্ষীদিগের


সার সংগ্রহ করিয়া, কিম্বা খৈলচূর্ণ কোন বৃহৎ গামলায় রাখিয়া তাহাতে প্রচুর পরিমাণে জল দিতে হয়। এইরূপে ১০।১৫ দিবস জলে ভিজিলে, এক ঋণ্ডা যষ্টি দ্বারা সেই সারবিশিষ্ট জল ক্ষণকাল আন্দোলিত করিলে জলের সহিত গলিত সার উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া যায়। এইরূপে তরল-সার প্রস্তুত করিয়া প্রথমাবস্থায় গাছের গোড়ায় দিলে গাছের তেজ বৃদ্ধি হয় এবং মধ্যমাবস্থায় দিলে ফসলের বৃদ্ধির উপকার দর্শিয়া থাকে।

পোড়ামাটি অনেক সব্জীতে প্রয়োজন হয়। উনানের মাটি গাছের গোড়ায় দিলে প্রত্যক্ষ ও প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। দুই চারিটা গাছের জন্য প্রয়োজন হইলে উনানের মাটিতেই কাজ চলিতে পারে। রন্ধনশালার উনান ভাঙ্গিয়া গাছের গোড়ায় দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে, কিন্তু বর্জিত উনানের মাটি পাওয়া গেলে মন্দ হয় না। গৃহস্থ বাটিতে চুল্লি-ভাঙ্গা মাটি সকল সময় পাওয়া যায় না, এবং যদিও পাওয়া যায় তাহার পরিমাণ অধিক হয় না। যেস্থলে বহু গাছ বা বৃহৎ ক্ষেত্রের জন্য পোড়া-মাটি আবশ্যক, সে স্থলে স্বতন্ত্রভাবে উহা প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। পোড়া-মাটি তৈয়ার করিবার জন্য মাটির চাপড়া, জঙ্গল ও তৃণাদি স্তরে স্তরে সাজাইতে হইবে। নিজের প্রয়োজন বুঝিয়া পাজার আকার ছোট বা বড় করিতে হইবে এইরূপে মাটির চাপড়া ও জঙ্গলাদি স্তরে স্তরে সাজাইয়া যে পাজা নির্মিত হয়, তাহাকে ইষ্টকের পাজার স্থায় উত্তমরূপে কৰ্দম দ্বারা লেপ দিতে হইবে। সেই পাজার উপরে ও চারিদিকে কৰ্দমের প্রলেপ দিয়া, পাজার নিয়ে আগুন জ্বালাইয়া দিতে হয়। ক্রমে পাজার সমুদায় জঙ্গলাদি পুড়িয়া গেলেই পোড়া-মাটি (charred turf) প্রস্তুত হইল। পাজা পুড়িবার সময় আগুন জ্বলিয়া উঠিতে দেওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি জ্বলিয়া উঠে, তাহা হইলে জলের ছিটা দিয়া অগ্নির তেজ নির্কাপিত করিতে হইবে।

সুচারুরূপে গুমাইয়া পুড়িয়া যে পোড়'-মাটি উৎপন্ন হয়, তাহাই বিশেষ উপকারী ;

বুল ও ভুষা অনেক সময় আবশ্যক হইয়া থাকে, এজন্ত কারখানা বা রন্ধনশালার বুল বা ভুষা যত্নসহকারে সঞ্চয় করিয়া রাখিলে সময়ে সময়ে সবজীবাগানে অনেক কাজে লাগিতে পারে। বাসগৃহ অপেক্ষা রন্ধন-শালা বা কারখানার বুল সমধিক সারবান, সুতরাং শেষোক্ত প্রকারের বুলই আদরণীয়। আবার কোক-কয়লা-জাত বুল কাষ্ঠাদি-জাত বুল অপেক্ষা মূল্যবান। প্রথম প্রকারের বুলে শতকরা ১৮ হইতে ৪৮ ভাগ খানজ পদার্থ বিদ্যমান। এইজন্ত ইহা সমধিক আদরণীয়। আমি ইহা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সবজীক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া সময়ে সময়ে বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি। গাছকে তেজোবান্ করিবার জন্ত ইউক বা গাছের শ্রীরন্ধি করিবার জন্ত ইউক অথবা ফসলের আকার বা পরিমাণ বৃদ্ধির জন্তই ইউক, ইহা ব্যবহার করিলে যে বিশেষ উপকার পাওয়া যাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বুল ও ভুষা এতই হাল্কা যে, সহজে উহা জলের সহিত মিশিতে চাহে না, এজন্ত উহাকে এক খণ্ড কাপড়ে বা চটের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া তাহার সহিত এক খণ্ড প্রস্তর বা ইষ্টক বাঁধিয়া, জলের গামলায় ফেলিয়া দিতে হয়। অতঃপর নির্মজ্জিত ভুষা ভাসিবার সুযোগ না পাইয়া অল্লাধিকক্ষণ মধ্যেই জলে ভিজিয়া যাইবে, অতঃপর আবশ্যকমত জলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হইবে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়



### চৌকা ও পটা

কাজের সুবিধার জন্ত পরিমিত আকারে যে জমী বিভক্ত ও আল-বেষ্ট করা যায় তাহাকে চৌকা কহে। উদ্ভানস্বামীর উদ্দেশ্য এবং ক্ষেত্রের পরিমাণানুসারে চৌকার আকার ক্ষুদ্র বা বৃহৎ করিতে হইলে চৌকার আকার প্রয়োজনানুরূপ বড় হওয়া আবশ্যক ; নতুবা ছোট ছোট চৌকাতেই কাজ চলিতে পারে। স্বতন্ত্র তরকারীর জন্ত এক একটা চৌকা নির্দিষ্ট থাকা উচিত, নতুবা পাট-পরিদর্শনের অসুবিধা ঘটয়া থাকে। চৌকার পদ্ধতি অনুসরণ করিবার জন্তই উদ্দেশ্য,—ইহাতে জন-মজুর খাটাইবার সুবিধা হয়, চৌকার পরিমাণ-অনুসারে তাহাতে কত সার লাগিতে পারে, জলসেচন করিতে কত মজুরী পড়ে, চৌকার উৎপন্ন সামগ্রীতে লাভ কি লোকসান হয়,—এ সব তথ্য সহজেই হিসাব করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত, চৌকা দ্বারা বাগানেরও শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহাও যে অবিবেচনার কথা তাহা নহে। চৌকা সমচতুর্ভুজ ও স্কোয় (square) অপেক্ষা ঈষৎ লম্বা ধরণের (oblong) রচিত হইলে ভাল হয়। সমচতুর্ভুজ অর্থে ক্ষেত্রের চারিটা বাহু সমান বুঝায়। আর লম্বা বলিলে বিপরীত দুই বাহু যে মাপের, অপর বিপরীত বাহুদ্বয়ের পরিমাণ তাহা অপেক্ষা বড় কিম্বা ছোট বুঝায়। চৌকার প্রান্তভাগ হইতে কার্য্য আরম্ভ করিলে যতটুকু কাজ হয় তাহা পূরাপূরি হইতে পারে, কিন্তু স্ফুৰ্ণ সমচতুর্ভুজবিশিষ্ট ক্ষেত্রে তাহা অনেক সময় সুবিধা হয় না।

বেগুন, পটোল, কপি প্রভৃতি যে সকল গাছের আয়তন বড়, তাহাদিগের জন্ত চৌকা-প্রথা প্রশস্ত।

চৌকাতে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌকা উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে পটী কহে। ব্লা, শালগম, গাজর, বীট, পেঁয়াজ ও নানাবিধ ক্ষুদ্র জাতীয় শাক পটীতে ভাল জন্মে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পটীতে ইহাদিগকে আবাদ করিলে পাট-পরিচর্য্যার বিশেষ সুবিধা হয়। এই সকল ক্ষুদ্রজাতীয় ফসলের সর্ব্বদা পাট আবশ্যক হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদিগকে যদি পটীর পরিবর্তে চৌকায় স্থান দেওয়া যায়, তাহা হইলে জন-মজুরগণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাজ করিবার সময় অনেক গাছ পদদলিত হইবার সম্ভাবনা। পটীর পরিমাণ প্রস্থে তিন হাতের অধিক হওয়া কোন মতে উচিত নহে। ঈদৃশ ফসলের জন্ত পটী সকলকে দশ হইতে বিংশ হাত পর্য্যন্ত লম্বা করিলে চলিতে পারে। পটীর প্রস্থ তিন হাতের অধিক হইলে জন-মজুরগণ দীর্ঘভাগের আলের উপর বসিয়া পটীর মাঝখান পর্য্যন্ত হাত প্রসারিত করিতে পারে না, কিন্তু যদি তিন হাতের অধিক প্রশস্ত না হয়, তাহা হইলে তাহারা পটীর মধ্যে প্রবেশ না করিয়াই উভয় পার্শ্ব হইতে কাজ করিতে পারে। অনন্তর পটী দ্বারা আরও লাভ,—উহার মধ্যে আবশ্যকমত জল পুরিয়া আবদ্ধ রাখিতে পারা যায়।

চৌকা বা পটীর যে আল বাঁধিতে হইবে, তাহা অন্ততঃ এক হাত চওড়া হওয়া আবশ্যক। ইহা অপেক্ষা কম হইলে আলের উপর দিয়া মাঝুষ যাতায়াত করিতে পারে না এবং যাতায়াত করিলেও আল ভাঙ্গিয়া যায়, সময়ে সময়ে ফসলেরও অনিষ্ট হইয়া থাকে।

চৌকার আল,—মধ্যবর্তী জমী হইতে ৩।৪ ইঞ্চি এবং পটীর আল,—দুই ইঞ্চি উচ্চ করিতে হয়। আল ঈষৎ উচ্চ থাকিলে চৌকায় জল আটক রাখিতে পারা যায়। ক্ষেত্র মধ্যে জল ক্রণকাল আবদ্ধ থাকিলে সমুদয়

জলই মাটিতে শোষিত হয়, সুতরাং মাটি শীঘ্র শুষ্ক হয় না। জমীতে আল না থাকিলে জলসেচনকালে সমুদয় জল ক্ষেত্রমধ্যে সমভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে না, আবার কোন স্থানে আদৌ পড়ে না। আল না রাখিবার পক্ষে আরও এক আপত্তি এই যে, জলসেচনকালে বা বৃষ্টির সময় জলের বেগে ক্ষেত্রের মাটি বিচলিত হয় এবং জলের সহিত সূক্ষ্ম মৃত্তিকাকণা সকল উচ্চ স্থান হইতে নিম্নস্থানে গিয়া সঞ্চিত হয়, সুতরাং তাহাতে ফসলের অনিষ্ট হইয়া থাকে।

ক্ষেত্র মধ্যে যে সকল চৌকা বা পটী রচনা করিতে হইবে তাহা যেন পরস্পর সংলগ্ন থাকে। অবিসৃম্ব্যভাবে যথা-তথা চৌকা বা পটী রচিত হইলে বর্ষাকালে অনেক সময় নষ্ট হয়, পরিদর্শনের অসুবিধা ঘটে এবং মজুরীও অপেক্ষাকৃত অধিক পড়িয়া যায়। কিন্তু চৌকা বা পটীগুলি পরস্পর-সংলগ্ন থাকিলে কাজের বিশেষ সুবিধা হয়।

ভেলি ও জুলি—এতদ্ব্যয়ের পরস্পরে অতি নিকট সম্বন্ধ। ভেলি রচিত হইলেই জুলি স্বতঃই দেখা দেয় এবং জুলি কাটিলেই ভেলিও আপনা হইতে উৎপন্ন হয়। চৌকার মধ্যে নিয়মিত স্থান ব্যবধানে যে সরাসরি দীর্ঘ অগভীর নালা রচিত হয় তাহাকে জুলি কহে। অনেক গাছ আছে যাহাদিগকে সমতলভূমি হইতে কথঞ্চিৎ নিম্নে বসাইলে তাহাদিগের উপকার হয়। এই জন্তই তাদৃশ উদ্ভিদসকল জুলি মধ্যে রোপিত হইয়া থাকে। আবার অনেক গাছ অতিশয় আর্দ্রতা সহ্য করিতে পারে না। এই কারণে তাদৃশ উদ্ভিদগণকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থান দিতে হয় সেই জন্ত তাহাদিগের গোড়ায় ভেলি তুলিয়া দেওয়া উচিত। জুলির বিপরীত ভাবই ভেলি অর্থাৎ জুলির জন্ত সমতল স্থানের মাটি কাটিয়া নালা (furrow) প্রস্তুত করিতে হয়, ভেলির (ridges) জন্ত তেমনি সমতল জমীর উপরেও পরিমিত স্থান ব্যবধানে আলের

শ্রায় মাটি উচ্চ করিতে হয়। দুই ভেলির মধ্যস্থিত খাদকে জুলি এবং দুই জুলির মধ্যবর্তী আলকে ভেলি কহে।

পূর্ক প্রস্তাবে বলা গিয়াছে যে, সমতল ক্ষেত্রে সমভাবে জল সঞ্চারিত হয় না; কিন্তু জুলি থাকিলে তন্মধ্যে জল অনেকক্ষণ আবদ্ধ থাকে, ফলতঃ ভূগর্ভের ভিতর প্রবিষ্ট হয়।

ক্ষেত্রের প্রস্থভাগে জুলী ও ভেলী রচনা করিতে হয় এবং ক্ষেত্রের দীর্ঘ-ভাগের দুই শেষাংশে বরাবর একটা করিয়া ঈষৎ প্রশস্ত জুলি রাখিতে হয়। পার্শ্বস্থিত জুলির সহিত ক্ষেত্রমধ্যস্থিত অপর যাবতীয় জুলির সংযোগে রাখিতে হইবে, কারণ চৌকার পার্শ্বস্থ প্রধান জুলির মধ্য দিয়া সেচিত বারি প্রবাহিত হইয়া ক্ষেত্রের মধ্যস্থিত জুলিতে প্রবেশ করে। চৌকা কুড়ি হস্তের অধিক প্রশস্ত হইলে প্রত্যেক কুড়ি হস্তের উপরে এক-একটা অতিরিক্ত জুলি আবশ্যক।

পটীর জন্ত জুলি বা ভেলি আবশ্যক হয় না; কারণ পটীগুলি নিজেই জুলিরূপে পরিগণিত হইতে পারে।

শশা, করলা, ঝিঙ্গে, উচ্ছে, কাঁকুড়, তরমুজ, লাউ প্রভৃতির বীজ-রোপণের জন্ত ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে এক হাত হইতে দুই হাত ব্যাস-বিশিষ্ট গর্তকে থালা বা মাদা কহে। থালা প্রস্তুত করিবার জন্ত প্রথমতঃ নির্দিষ্ট স্থান এক হাত হইতে দুই হাত গভীর করিয়া খনন করিতে হইবে। অতঃপর তাহার মধ্যস্থিত মাটিকে উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ সেই মাটির সহিত বিবেচনামত সার মিশাইতে হইবে। অনন্তর সেই গর্তের বেষ্টনে ৩৪ অঙ্গুলি উচ্চ করিয়া মাটির একটা আল দিবে। আলের মধ্যস্থিত মাটি অনেক গাছের থালার জন্ত এইরূপ বিশেষে প্রয়োজন।



# তৃতীয় অধ্যায়

— :: —

## ভাঁটি

যে নির্দিষ্ট স্থানে বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করা যায় অথবা যথায় চারাগুলিকে লালনপালন করা যায়, তাহাকে ভাঁটি কহে। জেলা বা প্রদেশবিশেষে ইহার নাম,—‘হাপর’ বা ‘বীজতলা’।

অনেক গাছের বীজ ক্ষেত্রে প্রসারিত করিলে অঙ্কুরিত হয় না, অথবা অঙ্কুরিত হইয়াও যথোপযুক্ত পরিচর্য্যার অভাবে মরিয়া যায়, এজন্য তাহাদিগকে ভাঁটিতে বপন করিতে হয়। বিস্তৃত স্থানে বীজ বপন করিয়া তাহার তত্বির করা এবং চারা সকলকে প্রতিপালন করা অসম্ভব। বীজ অঙ্কুরিত করা উদ্ভান-কলার একটা প্রধান ও কঠিন কার্য্য। বীজ অঙ্কুরিত করিতে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হয়, সুতরাং পরিমিত স্থানে তাহা সহজে হইয়া থাকে।

ক্ষেত্রমধ্যে ক্ষেত্রস্বামী বা তাঁহার প্রতিনিধি যে স্থানে থাকেন, তাহার সন্নিকটেই ভাঁটি প্রস্তুত করিলে বিশেষ সুবিধা হয় কারণ তাহা হইলে সর্বদা ভাঁটি পরিদর্শন করিবার সুবিধা হইয়া থাকে। শিশির, বৃষ্টি, রৌদ্র ও আলোক সমধিক পরিমাণে ভাঁটিতে লাগিতে দিলে, বীজের ও চারার অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে, কিন্তু ভাঁটি নিকটে থাকিলে তাহাকে আবশ্যকমত শিশির, বৃষ্টি ও রৌদ্র খাওয়াইতে পারা যায়।

ভাঁটির জন্ত সতর্কতার সহিত স্থান-নির্বাচন করিতে হইবে। স্থান-

নির্মাচনকালে কয়েকটি বিষয় বিবেচ্য আছে। যে স্থানে ভাঁটি রচিত হইবে, তাহা যেন নিম্নতল না হয়, অথবা তাহার সন্নিকটে জঙ্গল, জঞ্জাল-স্থূপ কিম্বা ইষ্টক বা রাবিশের রাশি না থাকে। ভাঁটির জমি নাবাল হইলে যে কেবল তথায় বর্ষায় জল ঝড়ায় তাহা নহে, জমীর প্রকৃতিও আঞ্জি হইয়া যায়। চারাগাছের পক্ষে সিক্ত বা রসা-জমী একেবারেই স্পৃহনীয় নহে। অতঃপর ভাঁটির নিকটে জঞ্জাল বা জঙ্গল থাকিলে তন্মধ্যস্থিত পোকা মাকড়ে চারাগাছ খাইয়া ফেলে অথবা কাটিয়া দেয়। ছায়াজাত গাছ রুগ্ন, ক্ষীণ, বিবর্ণ ও কুক্ষিভগ্ন হয়। আবার সূর্যালোক ও বাতাসই গাছের প্রাণ, সুতরাং ইহাদিগের অভাবে গাছ যে রুগ্ন হইবে তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি? এজন্ত উন্মুক্ত, বায়ুসঞ্চারিত ও পরিস্কৃত স্থানে ভাঁটি ও চারাবাড়ী প্রস্তুত করিতে হইবে।

উল্লিখিত অত্যাধিক বিষয়গুলি মনে রাখিয়া যথাযোগ্য স্থান নির্দেশ করিতে হইবে। ভাঁটি দীর্ঘে যত বড় হয় তাহাতে ক্ষতি নাই, তবে বিশ হাতের অধিক না হইলেই ভাল হয়, কিন্তু প্রস্থে দুই বা আড়াই হাতের অধিক হওয়া উচিত নহে।

ভাঁটি স্থাপনার্থ পরিমিত ভূমিখণ্ডের চতুষ্কোণে এক একটা খোঁটা পুতিয়া দড়ির সাহায্যে চতুর্দিকে রেখা টানিতে হইবে। তদনন্তর রেখার মধ্যবর্তী ভূমির ৮৯ অঙ্গুলি মাটি কাটিয়া ও তুলিয়া ফেলিয়া তাহার মধ্যে বামা বা খোয়া বিস্তৃত করিয়া দিলে ভাল হয়। অতঃপর সেই প্রসারিত বামা বা খোয়াকে কোন কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা পিটিয়া সমতল করা হইলে, তাহার উপর ৫৬ বা ৭৮ অঙ্গুলি বুঁরা সার-মাটি দিতে হইবে। পার্শ্বস্থিত মাটি ধসিয়া না পড়ে এজন্ত তাহার চারিপার্শ্ব উত্তমরূপে পিটিয়া দেওয়া আবশ্যক। ভাঁটির অন্তর্কর্ত্তী মাটির উপরভাগও কিঞ্চিৎ লঘুভাবে চাপিয়া দিলে ভাল হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভাঁটিতে বীজ বপন ও চারা-পালন করিতে হয়। পোয়ালি বা চারা অবস্থা হইতে যত্ন পূর্বক লালন-পালন না করিলে ভবিষ্যতে তাহারা বিপুল চেষ্টা ও যত্ন সত্ত্বেও আশাহীন ফল প্রদান করে না। এই কারণে ভাঁটির মাটি খুব সারবান ও লঘু হওয়া উচিত। উত্তম দো-আঁশ মাটি ও পাতাসার বা পুরাতন গোবরসার দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

রোদ্র, ঝুটি, আলোক ও বাতাসের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্ত ভাঁটির উপরে কোন আবরণের বন্দোবস্ত করিতে হয়। ভাঁটি অনাবৃত রাখিলে অতিরিক্ত আলোকে ও রোদের উত্তাপে বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয় এবং অনেক সময়ে অঙ্কুরিত হয় ও না। অনাবৃত স্থানে বীজ বপন করিবার পরে ঝুটি হইলে মাটি দৃঢ় হইয়া চাপিয়া যায়, ফলতঃ কোমল অঙ্কুর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিতে পারে না, অথবা ঝুটিতে মাটি অতিরিক্ত ভিজিয়া বীজ নষ্ট করিয়া দেয়, সুতরাং তাহাতে আর বীজ অঙ্কুরিত হইবার আশা থাকে না। এই সকল কারণে ভাঁটিতে আবরণ থাকা আবশ্যক। আবরণের জন্ত হোগলা, দরমা বা উলুঘাসের ঝাঁপ প্রশস্ত। উক্ত আবরণ দো-চাল করিলেই ভাল হয়। ঝাঁপগুলি আবশ্যকমত সঞ্চালনের সুবিধার জন্ত ৩৪ হাতের অধিক দীর্ঘ করা উচিত নহে। ভাঁটি হইতে তাহার চালের পার্শ্বদিক ১১০ ফুট উচ্চ রাখিলেই চলিবে।

ভাঁটির চাল প্রাতে ও বৈকালে ক্ষণকালের জন্ত অপসারিত করিয়া দিলে চারাগাছের বিশেষ উপকার হয়। চারাগাছ একেবারে অধিক রোদ্র সহ্য করিতে পারে না, এজন্ত ক্রমে ক্রমে উহা সহ্য করাইতে হইবে। সহ্যকরণ পদ্ধতি (accustoming) শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। আবরিত উদ্ভিদের আবরণ সহসা উন্মোচিত হইলে কচি চারা ‘আম্লে’

বা ঝিমাইয়া যায়। ঝুটির সময় ভাঁটা ঢাকিয়া রাখা প্রয়োজন। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে রাত্রিকালে ভাঁটা খুলিয়া রাখিতে হয়।



## চতুর্থ অধ্যায়



### বীজ সংগ্রহ ও রক্ষা

এদেশে বীজসংগ্রহ বিষয়ে বিশেষ যত্ন দেখা যায় না। এই জন্ত স্বদেশজাত বীজমাত্রের উপর সাধারণের তাদৃশ শ্রদ্ধা নাই, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। অনেক দলে দেখা যায়, ক্ষেত্রের যাবতীয় অপকৃষ্ট ফল বোজের জন্ত রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে উৎকৃষ্ট তরিতরকারি উৎপন্ন করিতে হইলে সর্বোৎকৃষ্ট ফলই বীজের জন্ত রাখা উচিত। প্রতি বৎসর উৎকৃষ্ট তেজাল ফলবন্ত গাছের সর্বোৎকৃষ্ট ফল সুপক্ক করিয়া রাখিতে পারিলে উৎকৃষ্ট বীজ লাভ করা যায়। এতদ্বারা নিজের উপকার হয়, দেশেরও উপকার হয়।

ক্ষেত্রমধ্যে যে কয়টি ফল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, সুপুষ্ট ও নীরোগ, তাহাই বীজের জন্ত স্বতন্ত্র ভাবে চিহ্নিত করিয়া সেই সকল গাছের বিশেষভাবে তদ্বির করিলে নিশ্চয়ই তাহার ফল অপেক্ষাকৃত সুপুষ্ট হইবে। চিহ্নিত ফলগুলি সুপক্ক হইয়া উঠিলে গাছ হইতে ভাঙ্গিয়া আনিয়া তাহাদিগকে রোদে উত্তমরূপে শুষ্ক করিতে হয়। লাউ, কুমড়া প্রভৃতি বৃহৎজাতীয় ফল শুষ্ক হইতে অনেক বিলম্ব হয়, সুতরাং তাহাদিগকে কৰ্ত্তনপূর্বক বীজ

বাহির করিয়া উত্তমরূপে শুষ্ক করিতে হইবে। মেঘাচ্ছন্ন দিবসে কিম্বা অপরাহ্নে এ কার্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। মেঘ বা বাদল-শূন্য প্রত্যুষে সংগৃহীত বীজ বিধৌত করিতে হইবে। বীজ অধিকক্ষণ সিক্ত থাকিলে অক্ষুরিত হইবার সম্ভাবনা।

বীজগুলি উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে পরিষ্কার কাল বোতলের মধ্যে রাখিয়া ছিপি দ্বারা মুখ উত্তমরূপে অঁটিয়া দিতে হয়। সেই বীজসমেত বোতল কোন শুষ্ক গৃহমধ্যস্থিত সিন্দুক বা আলমারি মধ্যে রাখিতে হইবে। ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে বীজ খারাপ হইয়া যায়, স্নতরাং অনেক সময়ে অক্ষুরিত হয় না। মধ্যে মধ্যে রোদ্রে না দিলে বীজে ছাতা ধরিয়া থাকে। এস্থলে ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, উত্তম বীজ বোতলের মধ্যে অথবা উত্তম বোতলে বীজ রাখা উচিত নহে। রোদ্র হইতে বোতল ও বীজ গৃহের মধ্যে বা ছায়ায় আনিয়া, যখন এতদ্ব্যতীত ঠাণ্ডা হইবে, তখন আধার মধ্যে বীজ তুলিতে হয়। নতুবা উত্তম বোতলের বা বীজের উত্তাপ জলে পরিণত হইয়া বীজের অনিষ্ট সাধন করে। যাবৎ বপনের জন্ত আবশ্যক না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে বীজ সকলকে শুকাইতে দেওয়া ভিন্ন কদাচ তাহাদিগকে বাহির করা উচিত নহে। যে দিন সমধিক বর্ষা হইবে, সে দিন আদৌ বীজের বোতল বা সিন্দুক খোলা উচিত নহে। তবে নিত্যন্ত আবশ্যক হইলে গৃহের দ্বার-জানালাদি অবরুদ্ধ করিয়া বীজ বাহির করিয়া লইয়া, পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিতে হইবে।

দেশীর অপেক্ষা বিলাতী বীজ রক্ষা সম্বন্ধে এই নিয়ম অধিক পালনীয়। বিলাতী বীজে সামান্য বাতাস বা ঠাণ্ডা লাগিলে বীজ খারাপ হইয়া যায়।

লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গে প্রভৃতি কঠিন ত্বকবিশিষ্ট বীজ অল্পক্ষণের জন্ত উন্মুক্ত থাকিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু যে সকল বীজের আবরণ বা ত্বক কোমলও

শেষক তাহারা অল্পাধিক রসা বাতাসেই ক্ষীত হয়, সুতরাং তাদৃশ বীজ—যথা কপি শালগম্, গাজর, বীট প্রভৃতি সামান্ত সিক্ত বাতাসেই ক্ষীত হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য জৈদৃশ কোমলত্বক বীজসমূহকে বিশেষ সাবধানে রক্ষা করিতে হইবে।

— — — — —

## পঞ্চম অধ্যায়

—:)\*(:—

### বীজ-বপন

যে সকল চারা স্থানান্তরিত ( transplant ) করিতে হয় তাহাদিগের বীজ ভাটিতে কিছা গামলায় বপন করা উচিত। বপনের পক্ষে অপরাহ্ন কালই প্রশস্ত।

বীজ বপনের পূর্ব দিবস বীজ-তলা বা ভাটির মাটি আলগা ও বুয়া করিয়া রাখিতে হইবে। মাটি ভিজ্রা বা কর্দমবৎ থাকিলে আপাততঃ তাহাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। এতদবশ্য মাটি বিচলিত হইলে তাহাতে ‘কাঁচল’ ধরে, মাটিতে ঢেলা বাঁধে এবং সে সকল ঢেলা চূর্ণ হয় না। মাটির শুষ্কবস্থায় বীজতলা প্রস্তুত করিতে হয়। বীজতলার মাটি বুয়া ও অঁশাল হওয়া উচিত। এজন্য মাটি বুয়া করিয়া লইতে হয় এবং মাটির সহিত অল্পাধিক চূর্ণ পাতা-সার, গোবর বা ঘোড়ার নাদি মিশ্রিত করিয়া দিলে ভাল হয়। অতঃপর উহাতে অল্পাধিক জল বাঁধিয়া রাখিতে হয়। পরদিবস যো হইলে মাটি আর একবার উলট-পালট

করিয়া ধীরে ধীরে চাপিয়া দিয়া যথাসময়ে ভাঁটির আয়তনমত বা নিজের প্রয়োজন মত বীজ লইয়া তাহাতে ছড়াইয়া দিতে হইবে। বীজগুলি যাহাতে সমভাবে ও সুষৃঙ্খলে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অব্যবসায়ী বা অনভ্যাস ব্যক্তির দ্বারা বপনকার্য্য সুষৃঙ্খলে সম্পাদিত হওয়া কঠিন। অতর্কিতভাবে বীজ বপিত হইলে কোথাও বীজ ঘন হইয়া পড়ে, আবার কোথাও অতিশয় পাতলা ভাবে পড়িয়া যায়। ঘনভাবে পাত্তিত হইলে বীজ যখন অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, তখন চারাগুলি এতই ঘন হইয়া জন্মে যে তাহার ফলে চারাগুলি শীঘ্রই শীর্ণ, অবশেষে রুগ্ন হইয়া পড়ে এবং অনেক চারা তল্লিবদ্ধন করিয়া যায়।

অধিক এবং ভারি মাটি চাপা দিলে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিতে পারে না। সেই জন্য বীজের উপরে হালকা ও বুঝা মাটি চাপা দেওয়া উচিত। বীজের স্থূলতা অনুসারে অল্প বা অধিক মাটি চাপা দিতে হইবে অর্থাৎ এরূপ পরিমাণে উহার উপরে মাটি দিতে হইবে যে, বীজগুলি মাত্র ঢাকা পড়ে। বীজ বপন করিয়া অনেকে তাহাতে জলসেচন করেন, কিন্তু আমরা এ প্রথার অনুমোদন করি না। বীজগুলি যাবৎ না অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, তাবৎ তাহাতে জলসেচন করায় বিশেষ কোন ফল নাই, বরং তাহাতে মাটি বসিয়া গিয়া বীজ অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটায়। ভাঁটির মাটি যদি নিতান্ত শুষ্ক হয়, তাহা হইলে বরং বীজ রোপণ করিবার ৩৪ ঘণ্টা পূর্বে অল্প জল দিয়া মাটি সরস করিয়া লওয়া উচিত। নীরস মাটিতে বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয়।

প্রত্যেক জাতীয় বীজেরই অঙ্কুরিত হইবার একটা কাল নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু বীজ রোপণ করিবার পরে, অঙ্কুরিত হইবার কাল অতীত হইলে দুই একবার আবশ্যক মত জলসেচন করিয়া তাহার উদগমের কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত কিন্তু সেই সময়ের মধ্যেও যদি অঙ্কুরিত না হয়,

তবে সে বীজের আশা পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়বার বীজ বপন করিতে হইবে।

বীজে জলসেচন করা বিশেষ সাবধানতার কার্য্য। সূক্ষ্মছিদ্রবিশিষ্ট ঝাঁঝরা বা বোমার দ্বারা জলসেচন করিতে পারিলে জলের ভারে মাটি বা বীজ বিচলিত হয় না। জলপাত্র মাটির সংলগ্নপ্রায় করিয়া জলসেচন করিলে মাটি গর্তময় হয় এবং বীজও নড়িয়া যায়।

শীঘ্র শীঘ্র চারা উৎপাদনের জন্ত কোন কোন প্রকারের বীজের জন্ত বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। কোন কোন বীজকে বোতলের মধ্যে কর্পূরের জল পুরিয়া, তন্মধ্যে ক্ষণকাল রাখা হয়। আবার কোন কোন কঠিনত্বক বীজ সকল ঈষদ্রব্য জলে রক্ষিত হইলে ক্ষীত হইয়া উঠে। তখন সেই বীজ রোপিত হইলে শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। তরমুজ, ফুটি, লাউ, কুমড়া, ককরলা, চিচিঙ্গা প্রভৃতির বীজ আর্দ্র খড়ের মধ্যে চক্ষিশ ঘণ্টাকাল রাখিয়া পরে ক্ষেত্রে রোপণ করিলে শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। যে সকল বীজের জন্ত এইরূপ বিশেষ পাণ্ডের আবশ্যক তাহা যথা স্থানে বিবৃত হইবে।

কপি, শালগম, গাজর, বেগুন, লক্ষা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ ভাঁটিতে ছড়াইয়া দিয়া উল্লিখিত মতে খুরামাটি চাপা দিতে হয়। বীট, শশা, কুমড়া, লাউ প্রভৃতির বীজ অপেক্ষাকৃত বড় এবং ইহাদের এক-একটি বীজ স্বতন্ত্র-ভাবে মাটির মধ্যে পুতিয়া দিতে হইবে, কারণ এ সকল বীজের ত্বক কঠিন বলিয়া অঙ্কুরিত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। কিন্তু অর্দ্ধ হইতে এক ইঞ্চি মাটির ভিতর বীজ থাকিলে উপরের মাটি শুষ্ক হইলেও ভিতরে যথেষ্ট রস থাকে ফলতঃ শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়।

ভাঁটার বাহিরে অর্থাৎ ক্ষেত্রে যে সমুদয় বীজ বপন করা যায়, যতদিন তাহা না অঙ্কুরিত হয়, ততদিন উলুঘাস বা গমের বিচালি চাপা দিয়া



রাখিলে রোদে মাটি শুষ্ক হইতে পায় না এবং তাহাতে জলসেচন করিলে মাটি কঠিন বা বিচলিত হয় না, অথবা সেই জল টানিয়া গেলে মাটি ফাটিয়া যায় না। মাটি সরস না থাকিলে, কুমড়া লাউ, শশা, ঝিন্ধে, উচ্ছে, তরমুস প্রভৃতির রোপিত বীজে মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিতে হইবে। এই সকল বীজে মধ্যে মধ্যে জলসেচন না করিলে বীজ অঙ্কুরিত হইতে কেবল যে বিলম্ব হয় তাহা নহে, বীজের অন্তর্কর্ষিত রস মৃত্তিকায় শোষিত হইয়া অঙ্কুরের শক্তি হ্রাস করিয়া দেয় এবং অঙ্কুরিত হইলেও চারা সুপুষ্ট ও সবল হয় না।

কীট-দষ্ট, দাগী বা অপুষ্ট বা ফোকলা বীজ কোন মতে ব্যবহার করা উচিত নহে। সুপুষ্ট, সজীব ও পূর্ণ বীজ ব্যবহার করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য। কুণ্ঠিত বা শীর্ণ বীজ বপন করিলে কেবল যে একবারের ফসল নিরেশ হয় তাহা নহে, সেই বীজোৎপন্ন গাছে যে ফল হয় তাহা ত ভাল হয়ই না, অধিকন্তু সেইসকল ফসলের বীজহইতে ভবিষ্যতে স্বীয় বা নিকট-বর্তী ব্যক্তিদিগের ক্ষেত্রেও তদনুরূপ বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক ক্ষেত্রে বীজ থাকিলে অনেক স্থলে প্রতিবেশী দশ জনে তাহা লইয়া গিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করে ফলতঃ একজনের বীজ নিকৃষ্ট হইলে ক্রমে গ্রামান্তরে অধিক কি, দেশান্তরে গিয়া পড়িতে পারে, ফলে দেশময় সেই নিকৃষ্ট বীজই স্থায়ী হইয়া যায়।

সর্বদা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ পরিপুষ্ট, সুপক্ক, নীরোগ দানা ব্যবহারের চেষ্টা করিতে হইবে। নিম্নশ্রেণীর বীজ ব্যবহারে প্রারম্ভিক ব্যয়ের পরিমাণ লঘু হইতে পারে কিন্তু মজুরী, তদ্বির খরচ প্রভৃতির সমষ্টির সহিত ফসলের মূল্যের রেওয়া নিকাশ করিলে আমাদের অদূরদর্শিতার পরিণাম কি তাহা বেশ উপলব্ধি হয়।

## বপনের সময়

বীজ বপনের জন্ত নির্দিষ্ট কালের অপেক্ষা করিতে হইবে। অসময়ে বীজ বপন করিলে সমধিক পাট-তদ্বির করিতে হয় এবং তাহা সত্ত্বেও বীজ সকল স্ফটিকরূপে অঙ্কুরিত হয় না। যেগুলি অঙ্কুরিত হয়, সেগুলি আশা-মুরূপ পরিপুষ্ট হয় না, অনেক চারা মরিয়া যায়। সকল ফসলই ঋতুর অধীন। কতক বীজ গ্রীষ্মে, কতক বর্ষায় এবং কতক শীতে, বপন করিতে হয়। অসময়ে বীজ বপন করিলে অঙ্কুরে ব্যাঘাত হয়, অনেক বীজ আদৌ অঙ্কুরিত হয় না। তাহা ব্যতীত এতজ্ঞাত চারা তাদৃশ দীর্ঘ-জীবী, পরিপুষ্ট ও ফলপ্রদ হয় না। এই সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাসময়ে বীজ বুনবার জন্ত একদিকে ঘেরূপ তাড়াতাড়ি করা উচিত নহে, অন্যদিকে সেইরূপ সময় অতীত হইতে দেওয়াও উচিত নহে। সকল বিষয়েরই একটা নির্দিষ্ট সন্ময় আছে।

এ স্থলে সময় নিরূপণ জনিত ভেদার্থে জাতি শব্দ প্রযুক্ত হইল। একই মূল জাতি হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ,— একটা কুমড়া গাছ। সকল কুমড়ারই মূল বা পূর্বপুরুষ এক; কিন্তু তাহার বীজ সময়বিশেষে রোপিত হইলে তজ্জাত গাছে যে ফল জন্মিবে, তাহার বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিতে হইলে পূর্ব গাছের বীজ যে সময় অর্থাৎ যে ঋতুতে এবং ঋতুর যে সময় রোপিত হইয়াছিল, ঠিক সেই সময় বপন করিলে তাহার পূর্বার্জিত প্রকৃতি অনুসারে বীজ অঙ্কুরিত এবং চারা বর্দ্ধিত ও পুষ্পিত হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় বারের বীজ অপর সময়ে বপিত হইলে তাহা হইতে যে গাছ উৎপন্ন হয় তাহার বৃদ্ধি এবং ফলন-ফুলন অন্ত-রূপ হইয়া যায়। মানুষের চেষ্টায় এইরূপে একই ফসলের নানা জাতি

উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জন্ত আমরা দেখি, কোন কুমড়া গ্রীষ্মকালে, কোন কুমড়া বর্ষাকালে বা শীতকালে ফল প্রদান করে। ফুলকপি, বাঁধাকপি প্রভৃতি তরকারির মধ্যেও সাধারণতঃ তিনটি বিভাগ দেখা যায় যথা, আশু (early) মাধ্যমিক (intermediate), এবং নাবী বা নামলা (late)। প্রত্যেক ঋতুকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া উল্লিখিত তিনটি বিভাগের উদ্ভব হইয়াছে।

আমরা ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক ফসলের প্রকৃতি পরিবর্তিত করিতে পারি। আশু জাতীয় লাউ, কুমড়া, কপি, কড়াই প্রভৃতি ঋতুজীবী বা মরসুমী (annual) উদ্ভিদগণকে নাবী (late) পর্য্যায় পরিণত করিতে পারা যায় কিন্তু সে জন্ত আমাদের চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই, কারণ উহা স্বতন্ত্র বিষয়। যথাসময়ে বীজ বপন করিলে উক্ত বীজ তৎসাময়িক জল-বায়ু হইতে প্রভূত উপকার পায়, তজ্জাত চারাও নিজস্বভাবে নূরূপ প্রাকৃতিকতার সাহায্য পাইয়া যথাযোগ্য বৃদ্ধি পায় এবং ফলফুল প্রদানে সমর্থ হয়। সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে বা বিগতপ্রায় হইলে যে সকল বীজ বপিত হয় তাহারা তাদৃশ ফলদায়ক বা বৃদ্ধিশীল হয় না। এতদ্ব্যতীত এইরূপে অনর্থক সময় নষ্ট হইলে উদ্ভিদগণও বৃদ্ধির সময় পায় না। উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুসারে কোন উদ্ভিদ একমাস, আবার কোন উদ্ভিদ ২১০ মাস বা ততোধিক কাল সময় না পাইলে ফলগুণ্প্রদানের যোগ্য হয় না, ইতিমধ্যে ঋতুরও অবস্থা অনেক পরিবর্তিত হইয়া যায়, ফলতঃ উদ্ভিদ কোনও গতিকে ফল প্রদান করিয়া থাকে। ইহাকে অকালপক্কতা বলিলে কৃতি হয় না।

শীতকালের ফসলের বীজ ফাস্টন-চৈত্র মাসে বপন করিলে তজ্জাত গাছ ফলফুল প্রদান করা দূরে থাকুক, চারা গাছও উত্তরোত্তর উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বর্ধিত হইতে না পারিয়া মরিয়া যায়। সকল ফসল সম্বন্ধে

একথা বলিতে পারা যায়। এই জন্ত যথাসময়ে বীজ বপন করিতে হইবে।

### বীজের প্রকৃতি ভেদ

আকার এবং প্রকার ( variety ) ভেদে বীজের অনেক রকম আছে। স্থল স্থচ্যগ্রভাগসদৃশ বীজ হইতে তাল, নারিকেল পর্য্যন্ত যত প্রকার বীজ আছে তৎসমুদায়ের এক একটি দানা শ্রেণীবদ্ধভাবে কোন স্থানে সজ্জিত করিলে দেখা যায়, আকারের তারতম্যানুসারে কত প্রকারের বীজ বর্তমান। বৃহজ্জাতীয় গাছ হইলেই যে তাহার বীজ বৃহৎ হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই, কারণ আমরা দেখিতে পাই, অশ্বথ বা বট-বর্গীয় উদ্ভিদগণ মহাক্রম মধ্যে পরিগণিত, কিন্তু তাহাদিগের বীজ কত ক্ষুদ্র। সে অনুপাতে নারিকেল কত ছোট। কারণ একটি নারিকেল বৃক্ষ, একটি অশ্বথ বা বটের একটি শাখার তুল্য মাত্র। পৃথিবীতে যেরূপ অসংখ্য প্রকার উদ্ভিদ আছে, সেইরূপ অসংখ্য আকারের বীজও আছে। তামাক, পোস্ত, সর্ষপ প্রভৃতির বীজ কত ক্ষুদ্র, আবার সীম বা মটরের বীজ কত বড় !

অতঃপর বীজের খোসা বা আবরণের কোমলতা বা কঠিনতা অনুসারে বীজের রকমের সংখ্যা করা যায় না। অনেক বীজ সহজেই উগ্ঠ হয়, আবার অনেক বীজ অঙ্কুরিত হইতে ২।৪ মাস বা ততোধিক কাল সময় লাগে।

আবার ইহাও দেখা যায় যে, সকল বীজের প্রকৃতি সমান নহে। অনেক রকম বীজ ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই অঙ্কুরিত হয়, অনেক বীজ সমধিক

উত্তাপ না পাইলে চেতনা প্রাপ্ত হয় না, ফলতঃ সহজে অঙ্কুরিত হয় না। কপি, মুলা, মটর প্রভৃতি জৈবৎ সর্দিময় স্থানে পতিত হইলে ২।৩ দিন মধ্যেই অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু তাল, নারিকেল গুবাক, প্রভৃতির ‘কল্’ উদ্গত হইতে মাসাধিককাল সময় লাগে।

বীজের সহিত ঠাঁহাদিগের সম্বন্ধ আছে, তাঁহারা এই সকল ক্ষুদ্র তথা বিশেষ অবগত থাকেন ইহা বড়ই বাঞ্ছনীয়। বীজের প্রকৃতি অবগত থাকিলে বীজবপনাদি কার্য্য অতি সহজ হয়। একথা অনেকের নিকট শুনিতে পাই যে, অমুক বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই ইত্যাদি। বীজ অঙ্কুরিত না হইলে অনেকেই বীজের, তথা বীজব্যাসায়ী উপর দোষারোপ করেন, কিন্তু তাঁহারা একথা ভাবিয়া দেখেন না যে, বীজের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদিগের জ্ঞান কতটুকু, বীজবপনের প্রণালী এবং বপনাস্তর পরিচর্যা বিষয়েই বা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা কতটুকু! আমি দীর্ঘকাল এই কার্য্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া বুঝিতে পারিলাম না যে, সময়ে সময়ে বীজ কেন উদ্গ হয় না। কৃষি ও উদ্যানকার্য্যের উপযোগী যত প্রকার সুবিধা থাকা উচিত, তৎসমুদায়ই পাইয়াছি,—অর্থ, উপকরণ ও জন-সাহায্য—তাঁহাও যথেষ্ট পাইয়াছি, তথাপি সময় সময় বীজ অঙ্কুরিত করিতে পারা যায় নাই!

### বীজ অঙ্কুরিত হয় না কেন ?

বীজ অঙ্কুরিত না হইবার কয়েকটা বিশেষ কারণ আছে তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ কয়েকটা কারণের উল্লেখ করিব।

অপরিশুদ্ধ, অপক ও অশুদ্ধ বীজ সংরক্ষিত হইলে অল্পদিন মধ্যে

তাহাতে 'ছাতা' ধরে। উত্তপ্ত বীজ শিশি বা বোতল বা অল্প কোন পাত্রে সস্ত-সস্ত রাখিলে বীজের উত্তাপ আবদ্ধ পাত্র হইতে নির্গত হইতে না পারিয়া বাষ্পে পরিণত হয়, ফলতঃ বীজে 'ছাতা' ধরে, বীজ পচিয়া যায়। ছাতা-ধরা বীজে সঁাতানি গন্ধ হয়। ঐদৃশ ছাতা-ধরা বীজ অবশ্য-পরিহার্য্য।

বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রাবহায়ে বীজের পাত্র উদ্ভাটিত হইলে তন্মধ্যে সিক্ত বাতাস প্রবিষ্ট হইয়া বীজের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, বীজ অঙ্কুরিত হইবার চেষ্টা পায়, কিন্তু তাহাতে বাধা পাইয়া ক্রমে নিঃস্ব হইয়া পড়ে; ফলতঃ বীজগর্ভস্থ প্রকৃত বীজাণুর নিদ্রিত 'কল' বিনষ্ট হয় অর্থাৎ বীজের বহির্ভাগে দুষনীয় কোন চিহ্ন না থাকিলেও বীজ অঙ্কুরিত হয় না। এরূপ বীজ প্রায় পুতিগন্ধময় হইয়া থাকে। যতই উৎকৃষ্ট বীজ হউক, সে বীজও গৃহে থাকিবার পর অল্পকালো জীবনীশক্তি হীন হইতে পারে।

মাটির দোষেও বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। অনেক সময় নোনা মাটিতে বীজ অঙ্কুরিত হয় না, আবার অনেক সময় অঙ্কুরিত হইয়াও মাটির লবণাধিক্যবশতঃ কচি চারার গোড়া অগ্নাধিক ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ভূশায়ী হইয়া পড়ে, ক্রমে মরিয়া যায়। গোবর, ঠৈল প্রভৃতি উত্তাপজনক টাটকা সার ভূমিতে সংযোজিত হইবার পর মাটিতে উত্তাপ উদ্ভাবিত হয়। এরূপ সারপ্রদত্ত মাটিতে বীজ বপন করিলে তৎক্ষাত উত্তাপে বীজ মরিয়া যায়, ফলতঃ চারা জন্মে না।

অনন্তর ইহাও নিত্য ঘটনা যে, আর্দ্র মাটিতে বীজ বপন করিলে উত্তপ্ত হইবার পূর্বেই অতিরিক্ত রস হেতু মরিয়া যায়, অন্তদিকে অতিশয় নীরস মাটিতেও বীজ হইতে সহজে চারা উৎপন্ন হয় না। বীজের উপর সিক্ত ভারী, কিম্বা অধিক মাটি চাপা পড়িলে অঙ্কুরের ব্যাঘাত হয়। গামলা, বাস্ক বা ভূমি হউক, যেখানে বীজ বপন করিতে হইবে, তথাকার মাটি

শুঁড়া ও লঘু হওয়া যেমন প্রয়োজন, সরস ও ঝুরা হওয়া তেমনি আবশ্যিক। মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ করণান্তর তাহার সহিত পাতা-সার বা অঙ্কু বিগলিত গোবর-চূর্ণ মিশ্রিত করিলে মাটি হালকা ও ঝুরা হয়। অতঃপর বীজবপনের ২৩ ঘণ্টা পূর্বে মাটিতে উত্তমরূপে জলসেচন করিয়া রাখিলে সেই জল তাহাতে শোষিত হইয়া যাইবে। অতঃপর সেই মাটি উলটপালট করিলে বীজ বপনের যোগ্য মাটি প্রস্তুত হয়। বলা বাহুল্য, মাটি যেন কাদাটে না হয়—সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদি কাদাটে হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাতে আরও কিছু শুষ্ক মাটি মিশাইয়া দিতে হইবে।

উল্লিখিত উপায় সকল অবলম্বিত হইলেও কোন কোন স্থলে বীজ অঙ্কুরিত হয় না। অনেকেই বীজ বপন করিবার পরেই তাহাতে জল সেচন করেন, তাহার ফলে মাটি দৃঢ়রূপে চাপিয়া যায়, ২৪ দিন মধ্যে মাটির উপরিভাগ ফাটিয়া যায় এবং সেই সকল ফাটলের ভিতর দিয়া রোদ ও বাতাস প্রবেশের পথ পাইয়া সমগ্র মাটিকে শক্ত করিয়া দেয়, মাটির রস মরিয়া যায়, ফলতঃ বীজের অঙ্কুরোদগমে বাধা পড়ে। আবার ইহাও দেখা যায়, প্রতিদিন জলসেচনের ফলে বীজে সর্দি সঞ্চিত হয়, তন্নিবন্ধন বীজ পচিয়া যাইবারও সম্ভাবনা। প্রকৃতপক্ষে বীজবপনের পর জলসেচনের প্রয়োজন হয় না। ক্ষুদ্র ও কোমল বীজ সম্বন্ধে ইহা ঐক্যবসত্য। যে সকল বীজ দীর্ঘকাল পরে অঙ্কুরিত হয় তাহারা গামলায় বা বাস্কে বপিত হইয়া থাকিলে মধ্যে মধ্যে তাহাতে জলসেচন প্রয়োজন। অন্নাগ্ন তরিতরকারি বা ফুলের বীজ অঙ্কুরিত হইতে সাধারণতঃ ২৩ দিন, সময় লাগে। এরূপ স্থলে বীজবপনের পর জলসেচন করা কর্তব্য নহে। মাটিতে যে রস থাকে অঙ্কুরোদগমের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। বীজ বপিত হইবার পর হইতে অঙ্কুরোদগম-কাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পাছে

মাটিতে রসাতাব হয়, এই জন্য বপনের পূর্বে মাটিতে অল্পাধিক পরিমাণে জলসেচনের ব্যবস্থা আছে।

মাটির রস ও ভূমির উত্তাপে ন্যূনাধিক্য না হয় এবং বপিত স্থানের মাটি না বিদীর্ণ হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। উত্তাপ ও রসের সমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বপনকার্য শেষ হইলে আধারের উপর একখণ্ড সমতল তক্তা বা একখানি কাগজ প্রসারণ পূর্বক তাহার উপর দ্রুত অথচ ধীরভাবে হস্ত সঞ্চালন করিতে হয় এবং তাহা হইলে মাটির ক্ষীতি দূর হয়, বীজ ও মাটি পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যায়।

বপনসংক্রান্ত সকল কার্য সমাধা করিবার পরেও সাধারণতঃ একটি কার্য বাকী থাকিয়া যায়, কিন্তু যে পর্যন্ত তাহা শেষ না হয়, সে পর্যন্ত বপনের তাবৎ কার্যই বাকী বলিয়া মনে হয়। যে কোনও কাজ হউক, তাহা সর্বান্বন্দররূপে সম্পন্ন না হওয়া এবং কার্যের সমস্তই বাকী থাকা—একই কথা। কোন কাজ অঙ্গহীনভাবে সমাধা করা উচিত নহে। যে কাজের সাড়ে পনের বা পৌনে ষোল আনা নিম্পন্ন হইয়াছে, তাহার আধ বা সিকি আনা বাকী থাকিলে আমার মনে হয় কাজটার সমস্তটাই বাকী, অধিক কি কাজে যেন হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। এক্ষণে যে কাজটী বাকী আছে তাহা সম্পন্ন করিলেই বীজবপনের কার্য শেষ হইল। বপন সংক্রান্ত যে ক্ষুদ্র কার্যটী বাকী আছে তাহা বীজবপিত স্থানে আবরণ দান। উক্ত আবরণ বা আন্তরণ ইংরাজিতে mulching নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এতদ্বর্থে দানাদার গোবর-সার বা পাতি-সারের মোটা গুঁড়া দ্বারা বপিত বীজ ঢাকিয়া দিতে হয়। এতদ্বারা মাটির মধ্যে যে রস থাকে তাহা শীঘ্র শুষ্কহইতে পায় না, বরং সেই রস অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া উপরিভাগের মাটি সরস রাখে, যৌত্রের উত্তাপে মাটি অধিক উত্তপ্ত হয় না, মাটি বিদারিত হইতে পায় না।



আন্তরণের আরও উপকারিতা আছে। বীজ বপনের পর কিষ্টা বীজ অঙ্কুরিত হইবার পরে বীজপাত্রে বা বীজতলায় জলসেচন করিতে হইলে জলের পতনে মাটি বিচলিত হয় না, উপরিভাগে জল সঞ্চিত হইতেও পারে না, ফলতঃ মাটি দৃঢ় হইতে পায় না। এই সকল কারণে বীজ বপনের পর বীজ-পাত্র বা বীজতলার উপরিভাগে বীজের আকারানুসারে এক যব হইতে ২৩ যব পুরু করিয়া আন্তরণের উপকরণ প্রসারিত করিয়া দিলে ভাল হয়।

## চার

সব্জীর বীজ অঙ্কুরিত হইতে সাধারণতঃ ২ দিন হইতে ৮।১০ দিন সময় লাগে। ক্ষুদ্র এবং লঘুত্বকাবিশিষ্ট বীজ ২।৪ দিবসের মধ্যে অঙ্কুরিত হয় কিন্তু লাউ, কুমড়া প্রভৃতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে ৬।৭ দিন হইতে ৮।১০ দিন সময় লাগে। ভূমিতে রোপিত বড় বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিলেই তাহার সন্নিহিত তৃণাদি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। ভাঁটিতে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিলে নবজাত চারাগুলিকে প্রথমতঃ প্রাতঃকালে ও সাংকালে বাতাস লাগাইতে হয় এবং চারাগুলি দিন দিন যত বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই তাহাদিগকে রৌদ্রাদি সহ্য করাইতে হইবে। এই প্রথাকে Seasoning বা Accustoming কহে। রৌদ্র, বাতাস ও আলোক সংস্পর্শিত না হইলে কচি গাছের কাণ্ডাদি পরিপুষ্ট, সবল ও দৃঢ় হয় না। যে মূহুর্ত্তে বীজ ভেদ করিয়া চারা জন্মে, সেইক্ষণ হইতেই তাহার রৌদ্র আলোক ও বাতাস আবশ্যক হয়।

বীজতলায় চারা ঘনভাবে জন্মিলে অগ্নাধিক চারা সাবধানতার সহিত

তুলিয়া লইয়া খালি জায়গায় পুতিয়া দেওয়া উচিত, নতুবা অনেক চারা ঘনভাবে একত্র থাকিলে মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

চারা যখন নিতান্ত ক্ষুদ্র থাকে তখন তাহাদিগকে প্রচণ্ড রৌদ্র হইতে রক্ষা করিবার জন্ত মধ্যাহ্ন হইতে অপরাহ্ন ৪।৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখা উচিত। বীজে যেরূপ অতি সাবধানে জলসেচন করিতে হয়, চারা গাছেও সেইরূপ না করিলে জলের আঘাতে ও ভারে কোমল চারা ভাঙ্গিয়া যায় কিম্বা হেলিয়া পড়ে। ঝাঁজরা বা বোমা ভাঁটীর সংলগ্ন করিয়া জল দিলে আর সে আশঙ্কা থাকে না। জল সেচনের অব্যবহিত পরেই গাছ ঢাকা দিলে তাহাতে জল বসিয়া থাকে এবং সেজন্যও অনেক চারা মরিয়া যায়। অতএব চারার অঙ্গের জল যতক্ষণ না শুকাইয়া যায়, ততক্ষণ ভাঁটী খুলিয়া রাখিতে হয়। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে নবোদগত চারাদিগকে আবরিত করিবার প্রয়োজন নাই।

চারায় জলসেচন করিবার পর মাটি ঈষৎ শুষ্ক হইলে ভাঁটীতে নীড়ান করা আবশ্যক। ২।৩ বার জলসেচনের পর একদিন নীড়ান করিলেই যথেষ্ট। মাটি দৃঢ়ভাবে বসিয়া গেলে জলসেচনে চারার বিশেষ উপকার হয় না, কারণ তখন আর জল মৃত্তিকাত্ত্বস্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। উপরিভাগের মাটি ভিজিয়া গেলেও ভিতরের মাটি সিক্ত হয় না, অগত্যা চারাগাছের রসাতাব হইয়া থাকে। ক্রমে কোমল চারাগুলি বিমর্ষ হইয়া নেতাইয়া পড়ে। ভূপৃষ্ঠের মাটি সুরা থাকিলে কোন গাছই সহজেই ত্রিয়মান হয় না। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উদ্ভিদকে যথাযোগ্য জল সরবরাহ না করিলে উহাদিগের জীবিত্ব হয় না, ফলন-ফুলনও আশঙ্করূপ হয় না।

মাটি লোণা হইলে চারাগাছের গোড়া ভাঙ্গিয়া যায়, চারা সকল পড়িয়া যায়। যখন চারাগুলি এইরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে দেখা যাইবে,

তখন ভাঁটীর চতুর্দিকে ২১৩ অঙ্গুলি পরিমিত উচ্চ আল বা বাঁধ নির্মাণ করিয়া সেই আল-বেষ্টিত স্থানটী উত্তমরূপে জলপ্লাবিত করিয়া দিবে উপরিভাগের লবণ ভূগর্ভে নামিয়া যাইবে। ভূগর্ভের লবণ উপরিভাগে আসিয়া চারার গোড়া ক্ষত করে। ভাঁটী তৈয়ার করিবার সময়ে তাহার নিম্নে খোয়া বা বামা দিবার ব্যবস্থা করা গিয়াছে, তাহার ইহাও একটা কারণ। সমধিক জল দ্বারা মাটি ভিজাইয়া দিলে অতিরিক্ত জলের অংশ নিম্নদেশে চলিয়া যায় এবং সেই সঙ্গে মৃত্তিকাস্থিত লবণাংশকে নিম্নে লইয়া যায়। ইহা বিশেষ স্মরণ রাখা উচিত যে, যে মাটিতে লবণাংশ আছে তাহা শুষ্ক হইলেই উপরিভাগে লবণ ভাসিয়া উঠে, কিন্তু উল্লিখিত প্রণালীতে জল বাঁধিয়া রাখিতে পারিলে লবণাংশ নিম্নে চলিয়া যায়। কোমল চারার মূলদেশ দীর্ঘকাল জলপ্লাবিত থাকিলে চারা মরিয়া যায়। উভয় দিকের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ জৈদূশ স্থানে খৈল বা গোবরের তরল সার দিতে পারিলে ভাল হয়।

কপি, শালগম, বেগুন প্রভৃতির চারা জমিতে স্থায়ীভাবে রোপিত হইবার পূর্বে ২১৩ বার নাড়িয়া পুতিতে হয়। এই সকল চারায় যাবৎ ৪৫টি পাতা উদ্গত না হয়, তাবৎকাল তাহাদিগকে স্থানান্তর (transplant) করা উচিত নহে। প্রথমবার চারা স্থানান্তরকরণের সময় ২১৩ অঙ্গুলি ব্যবধানে, এবং দ্বিতীয়বার ৫১৬ অঙ্গুলি ব্যবধানে রোপণ করিতে হইবে। ভাঁটীর চারা সচরাচর দুইবার এবং কখন কখন তিনবার স্থানান্তর করিবার পর স্থায়ীভাবে রোপণ করিতে হয়। চারা উত্তোলনকালে এরূপ সাবধানতা আবশ্যক যে, চারার কোন অঙ্গে বিশেষতঃ মূলাংশে কোনরূপে আঘাত না লাগে। হাপোর বা ভাঁটী হইতে চারা উত্তোলনের পক্ষে দীর্ঘফলক নীড়ান ব্যবহারই প্রশস্ত। হাপোর প্রভৃতি হইতে ঘনভাবে উক্ত চারাদিগকে উঠাইবার জন্ত নীড়ান বা খুরপী ব্যবহার না করিয়া

কাঠ শলাকার সাহায্য লইলে ভাল হয়। কারণ প্রথমোক্ত যন্ত্র ব্যবহারে অনেক গাছের স্কুমার মূল ও কাণ্ড কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া যায়, শেষোক্ত প্রকার শলাকা ব্যবহারে সে আশঙ্কা থাকে না।

নানা জাতীয় আলু, মূলজাতীয় আর্টিচোক, ওল, বিভিন্ন জাতীয় কচু প্রভৃতি কতকগুলির মূলকে সচরাচর লোকে বীজ বা ‘মুকী’ কহে, এবং এই ‘মুকী’ হইতেই তাহাদিগের চারা উৎপন্ন করিতে হয়। এতদ-সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা প্রস্তাবান্তরে আলোচিত হইল।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### ক্ষেত্রে চারা রোপণ

একদিকে ভাটীতে যেমন চারা প্রতিপালিত হইতে থাকে, অতীতকালে ইতিমধ্যে জমী কুন্দালিত করিয়া এবং লাঙ্গল ও মই পরিচালনা দ্বারা মাটি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। অল্প-পরিসর-স্থানে লাঙ্গল বা মই পরিচালিত হওয়া সম্ভব নহে, সুতরাং ঐদৃশ স্থানে কোদাল দ্বারাই মাটিকে চূর্ণ করিয়া লওয়া ভিন্ন উপায় নাই। যাহা হউক, মাটি তৈয়ারীর সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে সার মিশাইয়া রাখিতে হয়। ক্ষেত্রে চারা রোপনের ২১ দিন পূর্বে শেষবারের মত মাটিকে একবার উত্তমরূপে উলট-পালট ও সমতল করিয়া ভেলি ও জুলি প্রস্তুত করিতে হইবে। এই সকল কার্য যথাসময়ে ঠিক করা থাকিলে পরে অনেক দিকে সুবিধা হয়।

অপরূপে ক্ষেত্রে চারা বসাইতে হয়, কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে

কিষা মাটিতে যো না হইলে চারা রোপণ আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া পরিষ্কার দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। ইহাতে যদি চারা রোপণ করিতে ২১ দিন বিলম্ব হয় তাহাতে ক্ষতি নাই। ষথানিয়মে চারাগুলি ক্ষেত্রে রোপিত হইলে তাহাতে উত্তমরূপে জলসেচন করিতে হইবে। পন্থ দিন হইতে ৪।৫ দিন দিবাভাগে নবরোপিত চারাগুলিকে কদলী-পেটিকা কচুপাতা বা কলাগাছের বাইল দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে, নতুন স্থানান্তরিত চারাগুলি ঝিমাইয়া পড়িবে। গাছগুলি ষখন সরলভাবে দাঁড়াইতে পারিবে তখন বৃষ্টিতে হইবে যে, গাছের শিকড় মাটিতে সংলগ্ন হইয়াছে। এক্ষণ হইতে আর তাহাদিগকে ঢাকা দিবার আবশ্যকতা নাই। রুগ্ন, ক্ষীণ বা মৃতপ্রায় চারা আদৌ ক্ষেত্রে রোপণ করা উচিত নহে। অনেক স্থলে ক্ষেত্রে চারা রোপণের সময় গাছের গোড়ায় সাত দিবার নিয়ম আছে কিন্তু এক্ষণে যে সার দিতে হইবে তাহা যেন পুরাতন ও ঝুরা হয়, নতুবা নূতন সারের সহিত জল সংযুক্ত হইলে মাটির মধ্যে উত্তাপ জন্মিয়া চারাগাছের বিশেষ অনিষ্ট করে। এতদ্ব্যতীত নূতন সার প্রয়োগ করিলে ক্ষেত্রে বিস্তর কীটের উপদ্রব হয় এবং সেই সকল কীট ক্রমান্বয়ে বংশবৃদ্ধি করিয়া সমুদায় ক্ষেত্রের গাছগুলিকে এরূপ নির্দয়ভাবে আক্রমণ করে যে, তাহাদিগের রক্ষা পাইবার আর আশা থাকে না। সারের সহিত রন্ধনশালার বা চিমণীর ভূষা মিশ্রিত করিয়া দিলে পোকা-মাকড়ের তত ভয় থাকে না, তাহা ব্যতীত ভূষার দ্বারা সারের কার্য্যও হইয়া থাকে।

---

## সপ্তম অধ্যায়

### সব্জীবাগের শত্রু ও মিত্র

এস্থলে ফসলের শত্রুই আমাদের শত্রু। আমরা কত যত্ন, কত পরিশ্রম, কত অর্থব্যয় করিয়া চাষ-আবাদ করি, কিন্তু অসংখ্য কীটপতঙ্গ তাহা নষ্ট করিতে যেন বদ্ধপরিকর। এই সকল রক্তবীজের বংশকে ক্ষেত্র হইতে বিদায় করিতে না পারিলে সুশৃঙ্খলে চাষ-আবাদ করা অসম্ভব। ব্যাধির উপশম করিবার চেষ্টা অপেক্ষা তাহা নিবারণের উপায় অবলম্বন করা সৰ্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ, কিন্তু ব্যাধি উপস্থিত হইলে তাহারও প্রতিবিধান করা আবশ্যিক। সচরাচর যে সকল উদ্ভিদ-শত্রু আমাদের উদ্ভিদ করিয়া থাকে, এস্থলে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। নানাবিধ কীটপতঙ্গ ক্ষেত্রের বিষম শত্রু। উহার একবারে রাশি রাশি ডিঘ প্রসব করে এবং সেই সকল ডিঘ যদি বিনষ্ট করা না যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাত প্রত্যেক কীট যথাসময়ে ডিঘ প্রসব করিলে কত পোকা জন্মে। এইরূপ দুই তিন বংশকে বিনষ্ট না করিলে সব্জীর আবাদ উঠিয়া গিয়া সে ক্ষেত্র ক্রমে কীটেরই আবাদে পরিণত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং, ক্ষেত্রমধ্যে ইহাদের একটিকেও স্থান দেওয়া কোন মতে উচিত নহে। মৃত্তিকা-মধ্যে বা গাছের কাণ্ডে বা পাতার নিম্নে ডিম বা পোকা দেখিবামাত্র তাহা-দিগকে ক্ষেত্র হইতে দূরে ফেলিয়া দিয়া আসা উচিত, বিনষ্ট করিতে পারিলে ভালই হয়। সেই সঙ্গে কীটদষ্ট গাছটিকেও উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়া দিলে ভাল হয়, কারণ তাহার কোনও অংশে একটা মাত্র ডিঘ বা কীট থাকিলে ক্রমে তাহা হইতে নূতন কীট-বংশের উদ্ভব হইবার

সম্ভাবনা। একটা ডিঙ্কও যদি ভূমিতে স্থান পায়, তাহা হইলে সেই ডিঙ্ক ফুটয়া ক্ষেত্রময় ব্যাপিয়া পড়িবে। ইহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত অনেকে অনেক ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আমরা যে সকল উপায়ে অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়াছি, এস্থলে তাহারই উল্লেখ করিব।

যে সকল গাছ কীটাক্রান্ত হইয়াছে তৎসমুদায়কে সমূলে উৎপাটিত করিতে পারিলে উত্তম হয় কিন্তু তাহাতে অস্থবিধা বোধ করিলে ক্ষত অংশকে সাবানের জলে উত্তমরূপে বারম্বার বিধৌত করিয়া দিতে হয়। মাটির ভিতরে কীটগণ আশ্রয় লইয়া থাকিলে তথায় লবণ, সুল, কর্পূর কিম্বা ছাঁকার জল অথবা তামাক পাতার জল দিলে উপকার পাওয়া যায় এবং ভবিষ্যতে নিবারণের জন্ত গাছের ক্ষত স্থানে ও তাহার চারি পার্শ্বে গন্ধক, তামাক, কর্পূর প্রভৃতির গুঁড়া দিলেও চলিতে পারে। ছাই এবং হরিদ্রাচূর্ণ, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি পিপালিকা-নিবারক। জলের সহিত অতি সামান্য পরিমাণে হিং ও সর্ষপ-খেল মিশাইয়া ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া দিলে উইপোকা নষ্ট হয় এবং তথায় আর জন্মে না। গাছের পক্ষে হিং অনিষ্টকারী, সুতরাং উহা যেন গাছে না স্পর্শিত হয় কিম্বা যদিও উহা ব্যবহার করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে অধিক জলের সহিত অতি সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে।

মাটির মধ্যে কোন স্থানে ইন্দুর বা গন্ধস্থিকের বাসা থাকিলে তাহাতে প্রচুর পরিমাণে গরম জল ঢালিয়া দিলে অথবা গন্ধকের ধোঁয়া দিলে তাহারা পলায়ন করে, কিন্তু এতদপেক্ষা বিষমোষধি—তাহাদিগের বাসস্থান নষ্ট করিয়া দেওয়া।

রাত্রিকালে নানাজাতীয় কীট পতঙ্গ আসিয়া গাছের কচি পাতা, ফল প্রভৃতি ভক্ষণ করে, গাছের গোড়া কাটিয়া দেয়, ফলতঃ অনেক সময়

আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। পতঙ্গদিগকে দিনের বেলায় অল্পাধিক দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ধৃত করিতে পারা যায় না। রাত্রিতেই ইহাদিগের উপদ্রব বাড়ে। সব্জীবাগের মধ্যে যে সকল গর্ত্ত থাকে কিম্বা যথায় আবর্জনারাশি সঞ্চিত থাকে সেই সকল স্থানেই উহারা বাস করে। সকল ছিদ্রকে জল প্লাবিত করিয়া দিলে মাটির ভিতর হইতে উহারা উপরে আসে, তখন উহাদিগকে ধরিয়া যাহা কর্তব্য তাহা করা উচিত। ফড়িং, উইচিংড়ী প্রভৃতি পতঙ্গজাতীয় শত্রুদিগকে ধরিবার আর একটি উপায় এই যে, রাত্রিকালে বাগানের মধ্যে স্থানে স্থানে উজ্জ্বল আলোক (hurricane lamp) কিংবা মশাল জ্বালাইয়া ক্ষণকাল রাখিয়া দিলে অনেক দূর হইতেও উহারা সবেগে আসিয়া সেই আলোকের উপরে পড়ে অনেক আপনা হইতেই জলন্ত শিখায় পড়িয়া প্রাণ হারায়। যাহারা বাঁচিয়া যায় তাহাদিগকে ধরিয়া পূর্বোক্ত মত ব্যবস্থা করিবে। এই সকল গর্ত্তের মধ্যে অত্যুষ্ণ জল বা তীব্র চুণের জল ঢালিয়া দিলেও উহারা মরিয়া যায় কিম্বা আড্ডা ছাড়িয়া পলায়ন করে।

কীটের উপদ্রব হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উহাদিগকে প্রতিনিয়ত অন্বেষণ করিয়া ধরিতে হয়। যে সকল গাছের পাতা কৌকড়াইয়া গিয়াছে অথবা ছিদ্রময় হইয়াছে, তাহার নিকটে খুঁজিলেই প্রায় ইহাদিগকে পাওয়া যায়। তাহা ব্যতীত, যে সকল পাতায় উহারা ডিঙ্গ প্রসব করে, সেই সকল পাতা সংগ্রহ করিয়া ভূগর্ভ মধ্যে পুতিয়া ফেলা উচিত কিম্বা জ্বালাইয়া দিলেও হয়। দিবাভাগে নানা জাতীয় প্রজাপতি ক্ষেত্রে আসিয়া গাছে ডিঙ্গ প্রসব করিয়া যায়, ক্রমে সেই সকল ডিঙ্গ হইতে কীট উৎপন্ন হয়, সুতরাং ক্ষেত্রে প্রজাপতি দেখিলেই ধৃত করা উচিত।



Large white cabbage butterfly জাতীয় যে কীট, তাহা প্রায় দুই ইঞ্চি দীর্ঘ এবং তাহার বর্ণ সবুজ। এক এক পত্রে বা গাছে ২০ শত কীট জমা হইয়া কাণ্ড পত্রাদি ভক্ষণ করে। ইহাদিগকে ধৃত করাই প্রকৃষ্ট উপায়। দুই দিনের অবহেলায় ইহারা সম্বৎসরের পরিশ্রম ব্যর্থ করিয়া দেয়। ক্ষেত্রে এই সকল কীট-পতঙ্গের উপদ্রব হইলেও উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বনীয়।

শুগাল অতি দুষ্ট ও অনিষ্টকারী। রাত্রিকালে ইহারা দলে দলে আসিয়া ক্ষেত্রের ফসল নষ্ট করে। ইহাদিগকে তাড়াইতে হইলে ক্ষেত্রে দুই একটি কুকুর রাখা আবশ্যক। উক্ত কুকুরদিগকে দিবাভাগে বাধিয়া রাখিতে এবং সায়ংকালে ছাড়িয়া দিতে হয়। এরূপ করিলে রাত্রিকালে উহারা আর তথায় আইসে না।

সময়ে সময়ে ক্ষেত্রমধ্যে খরগশ আসিয়া তরিতরকারী নষ্ট করে। ইহারা বড় ভীক্ৰমভাব। ক্ষেত্রের চারিদিকে কাঁটা-গাছ, ধুন্ধু বা পাটের কাঠি পুতিয়া দিলে অথবা ক্ষেত্রমধ্যে রাত্রিতে আলোক রাখিলে উহারা ভয়ে তথায় আইসে না। কয়েক বৎসর পূর্বে মুরশিদাবাদে 'রইসবাগ' নামক বাগানে বড়ই খরগশের উপদ্রব হওয়ায় উক্ত উপায়াবলম্বনে বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছিল।

গো, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি পশুগণও বাগান-বাগিচার নিত্য শত্রু। ইহাদিগকে কোন মতে ক্ষেত্রমধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে। ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবারাজাই ইহাদিগকে ধোঁয়াড়ে প্রেরণ করা উচিত।

'নানাবিধ কীট-পতঙ্গাদির উপদ্রব হইতে গাছপালা রক্ষা করিতে হইলে বাগান বা ক্ষেত্রের মধ্যে কোন প্রকার জঞ্জাল বা আগাছা, বন-জঙ্গল থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। এই সকল নিভৃত স্থানেই ইহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া নিরাপদে বাস করে, ঋতুবিশেষে ফসল

বিশেষকে আক্রমণ করে। রাত্রিকালে ইহারা আপনাপন বাসায় গিয়া আশ্রয় লয় এবং দিবাভাগে গাছের পাতা ফুল প্রভৃতি ভক্ষণ করে। পার্শ্ববর্তী জঙ্গল বিনাশ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলে না। দিবাভাগে তাহারা দূর হইতেও আসিয়া ক্ষেত্রস্থিত গাছপালায় ডিঙ্ক প্রসব করিয়া যায়। ক্রমে সেই সকল ডিঙ্ক প্রস্ফুটিত হইয়া রাশি রাশি কীট উৎপন্ন হয়। সচরাচর ডিঙ্ক পত্রের নিম্নতলে দেখিতে পাওয়া যায়। ২।১৮টা পাতায় হিঙ্গ বা আকুঞ্চন দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ক্ষেত্রে কীট জন্মিয়াছে। তখন যাহা কর্তব্য তাহা বলিয়াছি; কিন্তু ইহাদিগের মূল—প্রজাপতি, ফড়িং প্রভৃতি উড্ডনশীল জীবদিগকে ধ্বংশ করাই প্রশস্ত। এতদ্বন্দ্বেষ্টে রাত্রিকালে,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর, ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে শুষ্ক আগাছা বা জঞ্জাল জ্বালাইয়া দিলে বহু পতঙ্গ আসিয়া সেই অগ্নিকুণ্ডে বাঁপ দেয়। ২।১৮ দিন উপযূঁপরি এইরূপ করিলে তাহারা সমূলে বিনষ্ট হয়। বেহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এই সকল কীট পতঙ্গ ‘কীড়ি’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অন্য উপায় এই যে, বাগান বা ক্ষেত্রের মধ্যে রাত্রিকালে একটা জলপূর্ণ পাত্র বা বৃহৎ গামলা রাখিয়া তাহার উপরে বা পার্শ্বে একটি প্রদীপ বা অল্প কোন আলো রাখিয়া দিলে বহুসংখ্যক পতঙ্গ আসিয়া গামলায় পড়িয়া মরিয়া যায়।

বাগ-বাগিচার সর্বাপেক্ষা বিষম শত্রু,—জন-মজুর ও মালীগণ। অনুনয়-বিনয়ে ইহারা গ্রাহ করে না, অর্থদণ্ড করিলে অধিকতর চুরি করে, এবং কন্মচ্যুত করিলে গ্রাহ না করিয়া অল্প স্থানে গিয়া কাজে নিযুক্ত হয়। যে ব্যক্তি চুরি করে তাহাকে শাস্তি দিলেও অবশিষ্ট লোকের কিছুমাত্র শিক্ষা হয় না। সুতরাং এই পাষণ্ডদিগকে শাসন করিতে হইলে চৌর্য্যাপরাধে কিছুতেই ক্ষমা না করিয়া খানায় চালান

হেওয়ায় কোন দোষ বা অখ্যাতি নাই। প্রথমতঃ,—ইহারা চুরী করিয়া বীজ বিক্রয় করে, অতঃপর ফসল ব্যবহারোযোগী হইলে তাহাও বিক্রয় করে এবং গৃহে লইয়া যায়। এইরূপে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত চুরি করিয়া যাহারা প্রভুর সর্বনাশ করে, তাহাদিগের প্রতি কঠোর হওয়ায় দোষ নাই।

কুকুর, বিড়াল, কাক, ভেক প্রভৃতি কয়েকটা জন্তুর দ্বারা বাগানে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, সুতরাং তাহাদিগকে না তাড়াইয়া বরং প্রশ্রয় দেওয়া উচিত। ক্ষেত্রে কুকুর থাকিলে তথায় কোন অপরিচিত লোক বা চোর কিম্বা শৃগাল বা খরগশ আসিতে পারে না। বিড়াল থাকিলে ইন্দুরের উপদ্রব কম হয়। শালিক ও কাক থাকিলে তাহারা অনেক পোকা মাকড় ধরিয়া খাইয়া ফেলে। ভেকগণও অনেক পিপীলিকা ও কীট ধরিয়া ভক্ষণকরতঃ ক্ষেত্রস্বামীর প্রভূত উপকার করিয়া থাকে।

## অষ্টম অধ্যায়

### সব্জীর প্রয়োজনীয়তা

এদেশে শীতকালে কিছুদিন পূর্বে ব্যবহার্য্য উপাদেয় তরকারী ছিল না। লাউ, কুমড়া, খুঁইল, বিজে, বার্তাকু, নানাবিধ শাক প্রভৃতি আমাদিগের দেশজ তরকারী, কিন্তু বিগত ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যে অনেক প্রকার বিলাতী তরকারী—নানাজাতীয় কপি, শালজম, গাজর, বীট প্রভৃতি প্রবর্তিত হওয়ায় আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য ব্যক্তনাদির অনেক পরিবর্তন

হইয়াছে, অনেক প্রকার তরকারী ভক্ষণ করিয়া আমরা ভৃগু হইয়া থাকি। প্রতিদিন একই রকম তরকারী মুখরোচক নহে, অধিকন্তু স্বাস্থ্যদায়কও নহে। কিন্তু ইদানীং এই সকল তরকারীর নূতন নূতন রকমেরও আবির্ভাব হইতেছে। আমরা যত প্রকার তরকারী ব্যবহার করিতে জানি, যত প্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া থাকি, ভারতের কোনও জাতি সেরূপ পারে না। কপি প্রভৃতি পাশ্চাত্য সবজী বুটে, কিন্তু সে সকল দেশের অধিবাসীগণ এই সকল তরকারী হইতে আমাদের মত এত অধিক প্রকারের, এবং এমন উপাদেয়, ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে জানে না। রন্ধনকার্যে বঙ্গমহিলা চিরদিনই সিদ্ধহস্তা, এই জন্তই আমাদের দেশে বহুবিধ তরকারী ও ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। আমাদের অস্তঃপুর মহিলাগণ ইচ্ছা করিলে ব্যঞ্জনের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিতে পারেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এক্ষণে রমণীগণ রন্ধন কার্যে যে শিক্ষণীয় কার্য তাহা মনে করেন না, এই জন্ত সে দিকে তাঁহাদিগের ইদানীং ঔদাস্য দেখা যায়। ক্রমে সেই পরম প্রয়োজনীয় নিত্য কলা বাঙ্গালা দেশ পরিত্যাগ করিবে, ফলতঃ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে। অপরাপর দেশে আমাদের রন্ধন প্রণালী প্রচলিত থাকিলে কিংবা প্রবর্তিত হইলে, এতাদৃশ বৃহৎ গার্হস্থ্য কলার একবারে তিরোধান হইবার আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু আমাদের রন্ধন-প্রণালী আমাদের বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির মধ্যেই আবদ্ধ আছে, অপর জাতি গ্রহণ করে নাই, সুতরাং বাঙ্গালা হইতে ইহা বিলুপ্ত হইলে পৃথিবী হইতে ইহা অন্তর্হিত হইবে—ইহা নিশ্চিত।

রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি ষত নীতি আছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে ঈদরনীতি যত প্রয়োজনীয় ও সমাজের পরিপুষ্টজনক এমন আর কিছুই নহে। যে দেশে এত প্রকার ব্যঞ্জন-প্রস্তুত-প্রণালী দীর্ঘকাল হইতে চলিয়া

আসিতেছে; সেখানে ব্যঞ্জনের প্রকার হ্রাস পায়, উপাদেয়তা বিকৃত হয়. ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, জাতীয়তার পক্ষেও ঘৃণার কথা ।

উল্লিখিত নানাপ্রকার বিলাতী তরকারী এদেশে এখনও বাহুল্যরূপে প্রচলিত হয় নাই । দূরস্থ পল্লীগ্রামে এখনও সে সকল সব্জী বিলাসীর ভোগ্যরূপে বিবেচিত হয়, এখনও অনেক স্থানে এ সকল তরকারীর আবাদ পর্য্যন্ত প্রবর্তিত হয় নাই, স্থানীয় কৃষক ও সব্জী ব্যবসায়ীগণ আবাদের প্রণালীও জানে না । উত্তম খাদ্য বা পরিধেয় যাহাতে সর্ব-সাধারণের ভোগ্য হয়, তদ্বিষয়ক চেষ্টা মনুষ্য মাত্রেরই থাকা উচিত । তরকারী ও ব্যঞ্জনের প্রকারাধিক্যের সহিত কুৎসিপাসায় ঘেরূপ নিগূঢ় সম্বন্ধ ব্যঞ্জনের উপাদেয়তা সেইরূপ ক্ষুদ্রবৃদ্ধির ও আবাদ-লালসা-তৃষ্ণির সেইরূপ সহায়ক । হিন্দু-ভারতবাসী স্বভাবতঃ মৎস্যজীবী নহে, অধিকাংশই নিরামিষাশী, তথাপি আমরা সকলেই যে খাঁটি নিরামিষাশী, তাহা নহে সাধারণ বাঙ্গালী মৎস্য-প্রিয়, সেই সঙ্গে তরকারী-প্রিয় । মৎস্য না হইলে যে আমাদের চলে না তাহাও নহে, কারণ আমাদের মধ্যে বহু ব্যক্তিই একবারে নিরামিষাশী । যাহা হউক আমরা মৎস্য-প্রিয় হইলেও, নানা প্রকার ব্যঞ্জনের মধ্যে মৎস্যের ব্যঞ্জনও আমাদের নিকট আদরের সামগ্রী । নোটের উপর আমরা ক্ষেত্রজাত তরিতরকারীর উপর যতটা নির্ভর করি, মৎস্যের উপর তেমন নির্ভর করি না । বিগত ১০।১৫ বৎসর মধ্যে মৎস্যের মূল্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে সর্বসাধারণের পক্ষে, অধিক কি, মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের পক্ষেও যথাযথ পরিমাণে মৎস্য-ভক্ষণ ক্রমে হ্রাস পাইতেছে । মৎস্য-পালন ও মৎস্য ব্যবসায় ধীরদিগেরই পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি এবং তাহাদিগের পক্ষেই উৎকার আবাদ ও ব্যবসায় সম্ভবপর, কিন্তু সব্জী উৎপন্ন করা সকলের পক্ষেই সম্ভব ও সাধ্যায়ত্ত । গৃহস্থ-

মহিলা ও বালকবালিকাগণ বিশ্রামকালেও দু-দশটা গাছ পালন করিয়া অস্বাভিক তরকারী উৎপাদন করিতে, ফলতঃ তদ্বারা সংসারের সাশ্রয় করিতে সমর্থ হইত।

ইদানীং যাবতীয় তরিতরকারী এত মহার্য হইয়াছে যে, গৃহস্থ লোকের পক্ষে তাহা ক্রয় করিয়া ব্যবহারে নিয়োজিত করা অসম্ভবপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এই নিত্যযুদ্ধিশীল অভাবের অভিযোগ রাজ-দ্বারে উপস্থাপিত করিলে কোনই ফল হইবে না। যাহাতে দেশে অধিক ও উত্তম তরকারী উৎপন্ন হইতে পারে, সে বিষয়ে আমাদেরকেই যত্নবান হইতে হইবে। যাহার আয়ত্তে যতটুকু ভূমি আছে, তাহাই কার্যে নিয়োজিত করিলে সকলের নিজ নিজ অভাব সম্পূর্ণরূপে না হউক, কতক পরিমাণে দূর হইবে—ইহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারা যায়।

কৃষিকার্য্য শিক্ষার বিষয়। অনেকে মনে করেন ২১০টা তরিতরকারী উৎপন্ন করা অতি সহজ কার্য্য, কিন্তু তাহা নহে। ইহার মধ্যে শিক্ষণীয় অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে। বীজ পুতিলে গাছ জন্মে, তাহাতে ফল-ফুল উৎপন্ন হয়,—এ সবই সত্য, কিন্তু তাহা অন্ধকারে ঢিল নিক্ষেপ মাত্র, কারণ এক্ষণে বীজ বপনের পরিণাম অনিশ্চিত। হয়ত সে গাছ ফলন্ত হইতে পারে, হয়ত তাহাতে পর্য্যাপ্ত ফল উৎপন্ন হইতে পারে। একদিকে ঘেরূপ স্বপ্নাতীত সাফল্য লাভের সম্ভাবনা, অন্যদিকে সকল শ্রম, সকল ব্যয়, সকল আশার বিনিময়ে নৈরাশ্র লাভও আশ্চর্য্যের কথা নহে। এইরূপ অনিশ্চিততার উপর নির্ভর করিয়া কোন কাজ করা উচিত নহে। কেবল যে গাছটির আবাদ-প্রণালীর প্রক্রিয়া জানিলেই বিচক্ষণ হইতে পারা যায় তাহা নহে। এ সম্বন্ধে মূল হুত্র বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করা উচিত, মাটির উৎকর্ষতা বিধানের জ্ঞান যে সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত তাহা সমধিক লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। কেবল সার-প্রদান, বা

জলসেচনই পরিচর্যার চূড়ান্ত নহে। ইহাদিগের মূল উদ্দেশ্য, ক্রিয়া প্রভৃতি অব্যাহত হওয়া আবশ্যক- তবেই কৃষিকার্যে সাফল্যলাভ করিতে পারা যায়।

সবজী উৎপাদনের আরও একটি দিক আছে। নানাবিধ সবজী উৎপাদন দ্বারা আমাদের উদরপূর্তি ও রসনাতৃপ্তি হয় তাহা পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছি। সবজী আবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক্ষণে অল্প দিক দিয়া বিচার করিব। এ কথাও পূর্বে বলিয়াছি যে, নিত্য ব্যবহার্য্য তরকারীসমূহ যাহাতে সহজলভ্য হয়, সকলেই যাহাতে নানাবিধ তরকারী ব্যবহার করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে ইহার আবাদ বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। পল্লীমধ্যে এক গৃহস্থের বাড়ীতে কোন তরকারী উৎপন্ন হইলে প্রতিবেশীগণেরও তাহা ভোগে আসে। এ দেশে কেহ কোন জিনিস একাকী ভোজন করিতে জানে না। ক্ষেত্রে হটক বা অগ্নিনায় হটক, যাহা কিছু শাক পাতা, ফল মূল উৎপন্ন হয়, তাহা পড়্‌সীকে না দিয়া কেহ খায় না, ইহা আমাদের সনাতন নিয়ম। পল্লীর মধ্যে সকলের বাড়ীতে অল্পাধিক তরিতরকারী উৎপন্ন হইলে পরস্পরের আদান-প্রদানে সকলেই নানাবিধ তরকারী ভক্ষণ করিতে পায়—ইহা কম আত্মাদের কথা নহে, কম লাভেরও কথা নহে।

কতকগুলি তরকারী অল্প উদরস্থ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, আবার কতকগুলি, শরীরের পুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্যে রন্ধনাদিতে নিয়োজিত হয়। কেবলই যে, শাক-পাতা দ্বারা উদরপূর্ণ করিতে হইবে তাহা নহে, উপাদেয় ও পুষ্টিকর তরকারীও ব্যবহার করিতে হইবে। গোল আলু, রাজা আলু সর্করকন্দ প্রভৃতি পুষ্টিকর সবজী, সুতরাং এ সকলের আবাদ যাহাতে প্রচুর পরিমাণে বিস্তৃত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। এই সকল তরকারীর আরও বিশেষত্ব এই যে, ভূমি হইতে উদ্ভোলিত হইবার পরেও দীর্ঘকাল ধরে থাকিতে পারে সুতরাং কসলের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও

নানাজাতীয় আলু, মাগকচু, বীট, শালগম প্রভৃতি তরকারী ভবিষ্যতের কয়েক মাস পর্য্যন্ত ব্যবহারে নিয়োজিত হইতে পারে। পল্লীগ্রামের অনেক গৃহস্থ মরসুমের সময় আলু ক্রয় করিয়া রাখেন, ফলে বারমাসই ব্যবহার করিতে সমর্থ হন। যথাসময়ে রক্ষণীয় তরকারী সঞ্চয় করিয়া রাখিলে সে সকল দ্রব্য অসময়ে ক্রয় করিতে যত অর্থ ব্যয় হয়, তাহাপেক্ষা অনেক কম খরচ হইয়া থাকে, কারণ মরসুমে ফসলের আধিক্যবশতঃ বাজারে তাহার মূল্য কম থাকে। যাহারা মরসুমকালে জৈদৃশ তরকারী অধিক পরিমাণে ক্রয় করিয়া যত্নসহকারে রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারা ‘ছনা’ লাভ করেন, ১ম,—মূল্যের স্থলভতা হেতু এক দফা আর্থিক লাভ; ২য়,—অসময়ে ব্যবহার।

অনন্তর লাভের দিক দিয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, তরকারীর আবাদ সমূহ লোভনীয়, কারণ একেই ত এক এক বিধা জমির ধাত্ত বা গোধুম বা ডাল কলাই অপেক্ষা সেই পরিমিত স্থানে নানা-বিধ তরকারি জন্মিলে অপেক্ষাকৃত অধিক লাভ হয়। এই জন্ত কৃষক অপেক্ষা সবজী উৎপাদনকারী মালীগণ অধিক অর্থ উপার্জন করে। মালীরা অল্প জমিতে আবাদ করে, কৃষক তাহাপেক্ষা অনেক অধিক জমি আবাদ করে, কিন্তু মালী সেই অল্প জমিতে আবাদ করিয়া স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করে, আর চাষী সারা বৎসর রৌদ্ররশ্মিতে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াও ছই বেলা আহারের সংস্থান করিতে পারে না।

এতদ্বারা এমন কথা বলা যায় না যে, কৃষকগণ লাঙ্গল-বলদ বিক্রয় করিয়া সবজীর কারবারে প্রবৃত্ত হউক। কৃষক ও উদ্যানক,—উভয়ের ভূমি ও মাটি স্বতন্ত্র, পরিচর্যা প্রণালী বিভিন্ন। এই জন্য কৃষকের কার্য্য কৃষকের পক্ষে যেরূপ শোভনীয় ও সুবিধাজনক, মালীর কার্য্য মালীর পক্ষে সেইরূপ উপযোগী ও অবহাছকূল। মালী ও কৃষক স্বতন্ত্র বৃত্তিধারা।



মালী পরিশ্রমী, সারা বৎসর সে জমির পরিচর্যা করে, বারমাস তাহা হইতে সমযোগ্যোগী ফসলোৎপাদনের জন্য পরিশ্রম করে, ফলতঃ বার-মাসই তাহার উপার্জন, কিন্তু কৃষক ফসলের সময় অল্লাধিক কাজ করিবার সুবিধা পায়, কারণ তাহার যেটুকু জমি তাহা আবাদে নিয়োজিত হইলে অপর কাজ করিবার সময় থাকিলেও স্থান কোথায় ? পূর্বেই বলিয়াছি অল্প জমিতেই মালীর যথেষ্ট কাজ হয়। তাহা ব্যতীত মালী নানাবিধ তরিতরকারীর আবাদ করে বলিয়া এক সবজীর সময় অতীত হইতে-না-হইতে অন্য সবজীর আবাদের সময় উপস্থিত হয়, সুতরাং তাহার কাজের অভাব হয় না, জমি পতিত থাকিতে পায় না।

মালীগণ মাটি হইতে ফসল উৎপন্ন না করিয়া সার হইতে তাহা করিতে চেষ্টা পায়। মালীর জমি অল্প, কাজেই সে তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে সার দিতে পারে, জলসেচন করিতে পারে। কৃষকের জমি অধিক কিন্তু তাহাতে যথাবিধি সার দিবার সঙ্গতি তাহার নাই। কৃষকের ‘মাটি’ প্রায়ই মাঠে ময়দানে বা গ্রামের বাহিরে, অনেক স্থলে অনেক দূরে। এইজন্যও কৃষকগণও সমাধিক ও যথাযোগ্য সার ক্ষেত্রে দিতে পারে না। মাঠ-ময়দানের জমি সচরাচর বর্ষায় জলমগ্ন হয় কারণ তাহার নাবাল জমি, সুতরাং বারমাস সবজী আবাদের পক্ষে সুবিধাজনক নহে।

আজকাল দেশের চারিদিকে কৃষি-বিস্তারের কথা যেরূপ আলোচিত হইতেছে, তাহাতে মনে হয় শিক্ষিত ও ভদ্রলোকদিগকে যদি কৃষিকার্য করিতে হয় তাহা হইলে সবজী বা ফল ফুলের আবাদ,—এক কথাঃ গার্হস্থ্য উদ্যান-কার্য্যই তাঁহাদিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক, স্বাস্থ্যকর ও আরামদায়ক।

## নবম অধ্যায়

### বাঁধা কপি ( Cabbage )

এদেশে ক্রমেই ইহার আবাদ বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্বে চাষীগণের ক্ষেত্রে এবং ধনীদিগের উদ্যানে ইহার আবাদ হইত, কিন্তু এক্ষণে অনেক গৃহস্থই ইহার আবাদ করেন। চাষীগণ ব্যতীত অপর লোকের তাহা তাদৃশ আশানুরূপ হয় না। ধনী ও গৃহস্থ লোকের বাগানে কেন যে স্বেচ্ছাক্রমে ফসল হয় না তাহা সামান্য অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। সম্ভী চাষীদিগের অমানুষিক পরিশ্রম ও যত্নই যে তাহাদিগের সাফল্যলাভের কারণ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ইহাদিগের জমির ঘেরূপ পাট হইয়া থাকে, অপর লোকের জমিতে তাহা হয় না। কৃষকগণ জমিতে গভীর চাষ দেয়, প্রচুর সার দেয়, জমি কোপায় এবং ছেঁচ দেয়। সখের বাগানে মালী-মজুরে যাহা করে, ক্ষেত্রস্বামীকে তাহার উপরেই নির্ভর করিতে হয়। উভয়ের ফসলের তারতম্যের ইহাই মূলভূত কারণ।

জীরেণ-লব্ধ জমিতে বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি প্রভৃতি মুখরোচক মূল্যবান বিবিধ উৎকৃষ্ট তরকারির আবাদ করা উচিত। বারমাস যে জমিতে কোন-না-কোন তরকারি বা ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা স্বভাবতঃই ক্ষীণতেজ হইয়া থাকে। বহু পরিশ্রমে এবং সদ্য সদ্য বহু সার প্রদানেও তাদৃশ ভূমিকে আপাততঃ কার্যাকরী করিতে পারা যায় না। এইজন্য যে সকল ক্ষেতে কপি প্রভৃতি মূল্যবান ফসলের আবাদ করিতে হয়, সে সকল জমিতে বারমাস ফসল উৎপন্ন করা উচিত নহে।

বিষাপ্রতি জমিতে কত গাড়া বা কত মণ সার দিতে হইবে তাহার

নির্দেশ করিয়া দিতে পারা যায় না। তবে সচরাচর মাটির অবস্থানুসারে বিধাপ্রতি ৫।৬ হইতে ১০।১২ গাড়ী গোবর দিতে পারা যায়। বেলে ও এঁটেল মাটিতে সমধিক সার দেওয়া উচিত। যে জমিতে কপি জন্মে, তাহাতে অপর কোন ফসলের আবাদ করা উচিত নহে। কপির জন্ম ভাদ্র মাসের মধ্যে জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়, এজন্ম জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের মধ্যে ক্ষেত্র কোপাইয়া ক্ষেত্রের আয়তন বিস্তৃত হইলে বারষ্মার লাঙ্গল ও মই দিতে হইবে, নতুবা বারষ্মার কুন্দালিত করা উচিত। যত বার লাঙ্গল দেওয়া হইবে, ততবার উত্তমরূপে মই দেওয়া আবশ্যক। প্রথম কোপান্ দিবার পরেই ক্ষেত্রে সার ছড়াইয়া দিতে হয়। সার দিবার পরে যত অধিকবার জমীতে লাঙ্গল ও মই দেওয়া হইবে ততই মাটির সহিত সার ঘনভাবে মিশিয়া যাইবে এবং মাটি আলগা ও খুরা হইবে। প্রথমবার হলচালনার সময় হইতে যাবৎ ক্ষেত্রে চারা রোপিত না হয়, তাবৎকাল মধ্যে মধ্যে একবার লাঙ্গল ও মই দিলে তৃণজঙ্গলাদি বিনষ্ট হয় এবং তৎসমুদয় পচিয়া গিয়া মাটির সহিত মিশিয়া যায়, ফলতঃ ভূমি আরও উর্বর হয়।

এ সময়ে বর্ষার প্রারম্ভাবশতঃ অনেকে ভাঁটির পরিবর্তে গাম্বলা, বাস্ক কিম্বা টবে বীজ বপন করিয়া চারা উৎপন্ন করেন। যাহাতেই বীজ বপন করা হউক, পাত্র বা আধার যেন অপরিষ্কার না হয় এবং পাত্রের তলায় যেন দুই-চারিটা ছিদ্র থাকে। টব বা গাম্বলার মধ্যে এক স্তর খোলা বা পাটকেল প্রসারিত করতঃ হাল্কা ও সারযুক্ত মাটি দ্বারা উহা পূর্ণ করিবার পর বীজ বপন করিতে হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজের জন্ম বাগানের ভাল মাটির সহিত চূর্ণীত পুরাতন পাতালার বা গোবর-সার মিশাইয়া যে মাটি প্রস্তুত হয় তাহাই প্রশস্ত। এঁটেল, চট্‌চটে বা ভারি মাটিতে বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয়, অনেক স্থলে সূচাক্রমে বীজ অঙ্কুরিত হয় না।

নাবী ( late ) জাতির বীজ ভাদ্র মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত বপন করা যাইতে পারে ।

বাঁধাকপি আশু ( early ), মাধ্যমিক ( intermediate ) ও নাবী ( late )—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । বাঁধাকপির অন্ত্র এক উত্তম জাতি আছে—তাহাকে সেভয় কপি (savoy cabbage) কহে । সচরাচর ইহার পাতাগুলি কোঁকড়ান থাকে । এই জাতীয় কপি সচরাচর বাজারে বিক্রয়ার্থ আসে না এবং সাধারণ চাষীগণও ইহার আবাদ অধিক করে না । কিন্তু ইহা যে বাগানে স্থান পাইবার যোগ্য, সে বিষয়ে সংশয় নাই ।

**বীজ বপন ।**—বাল্ল বা গাম্‌লায় যথানিয়মে বীজ বপন করিয়া বীজের উপরে পাতলাভাবে হালুকা সারাল মাটি চাপা দিয়া হস্ত দ্বারা ধীরে ধীরে চাপিয়া দিতে হইবে । তদনন্তর বীজ-পাত্র দিনের বেলায় অন্ধকার গৃহমধ্যে এবং আকাশ পরিষ্কার থাকিলে সন্ধ্যার পরে ক্ষেত্রে বা বারান্দায় কিম্বা ঘরের দালানে রাখিয়া দিতে হয় । যাবৎ বীজ অঙ্কুরিত না হয়, তাবৎ এইরূপ করিবে এবং অঙ্কুরিত হইলে ক্রমশঃ তাহাদিগকে আলোক ও রৌদ্র সহ্য করাইতে হইবে । সমভাবে আলোক না পাইলে চারাগুলি আলোকের দিকে স্বভাবতঃই হেলিতে চেষ্টা করে এবং বক্রভাবে ধারণ করে । এজন্য বারান্দা বা ঘরের দালানে বীজের গাম্‌লা থাকিলে তাহাকে প্রতিদিন একপে ঘুরাইয়া দিতে হইবে যে, বহির্ভাগের চারাগুলি ভিতরের দিকে এবং ভিতর দিকের চারাগুলি বাহিরের দিকে আসে । এইরূপ প্রতিনিয়ত করিতে পারিলে, চারাগুলি আর বক্রভাবে ধারণ করিতে পারে না ।

**চারা স্থানান্তর করণ ।**—চারাগুলির ৩৪টি পত্র উদগত হইলে সাবধানে গাম্‌লা হইতে উৎপাটিত করিয়া ভাঁটিতে ৩৪ অঙ্গুলি ব্যবধানে রোপণ করতঃ নবরোপিত চারাগুলিকে সাবধানে ও উত্তমরূপে জলসেচন

করিতে হইবে। স্থল ছিদ্রযুক্ত ঝাঁজরা ( watering can ) দ্বারা জল-সেচনই প্রশস্ত। জলসেচনকালে জলের বেগে বা আঘাতে কোমল চারা ভাঙ্গিয়া না যায় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। সাবধানতা সত্ত্বেও অনেক চারা ভুশায়ী হইয়া পড়ে। ঈদৃশ শায়ত চারাগুলিকে, জল সেচনের ক্ষণ-কাল পরে, একটি সরু কাষ্ঠশলাকা দ্বারা দাঁড় করাইয়া দিতে হইবে। ভূমি সংলগ্ন চারাদিগকে এইরূপে দাঁড় করাইয়া না দিলে ইহারা নিজ শক্তিবলে দণ্ডায়মান হইতে পারে না, ফলতঃ মরিয়া যায়। বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকিলে সমস্ত রাত্রি ভাঁটির আবরণ বা ঝাঁপ খুলিয়া রাখিতে হইবে এবং পরদিন প্রাতে ৭।৮ ঘটিকার সময় ঢাকিয়া দিতে হইবে। রোপণের পর ২।৩ দিন এইরূপে পালন করিলে চারাগুলির স্থানান্তরজনিত ক্লেশ দূর হইবে। অনন্তর ২।৩ দিন মধ্যে গাছগুলি সবল হইয়া উঠিলে দিবাভাগে ক্রমশঃ অধিকক্ষণ করিয়া অনাবৃতাবস্থায় রাখিতে হইবে। চারা-গুলির ৫।৭টি পাতা জন্মিলে অল্প ভাঁটিতে দ্বিতীয়বার স্থানান্তরিত করিতে হইবে। এইবার স্থানান্তর করিবার সময় চারাদিগকে পূর্বাপেক্ষা অধিক স্থান দিতে হইবে। প্রাতঃবার স্থানান্তর করিবার সময় চারগুলিকে পূর্বা-পেক্ষা জ্বৎ গভীররূপে রোপণ করিতে হইবে এবং দেখিবে—যেন শিকড় প্রসারিত থাকে এবং না ছিঁড়িয়া যায়। সাত-আটটি পাতা জন্মিলেই চারাগুলিকে ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে রোপণ করিতে হইবে। প্রতিবারই স্থানান্তরকালে উৎকৃষ্ট অর্থাৎ পরিপুষ্ট ও তেজাল চারাগুলি বাছিয়া ভাঁটিতে রোপণ করা উচিত, তৎসঙ্গে শীর্ণ ও নিস্তেজ চারাগুলিকে স্বতন্ত্র স্থানে রোপণ করিয়া যথানিয়মে পালন করিতে হইবে এবং তাহাতে একবার তরল-সার দিলে ভাল হয়। উক্ত উপায় অবলম্বিত হইলে দুর্বল চারাগুলি ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও তেজাল হয়।

আশু এবং ছোট জাতীয় কপির জন্য এক-হাত বা পাঁচ-পোয়া অন্তর ভাসা

বা অগভীর জুলি কাটিয়া সেই জুলির মধ্যে ঐ-মত-স্থান ব্যবধানে এক-একটি চারা যথানিয়মে রোপণ করিতে হয়। নামলা ও বৃহজ্জাতির চারাদিগকে পোণে-ছই-হাত অন্তর জুলির মধ্যে দেড় হাত অন্তর বসাইতে হয়। চারা রোপণের পূর্বে জুলির মধ্যে পরিমিত স্থান ব্যবধানে গর্ত খোদিত করিয়া তন্মধ্যে ২।৩ মুষ্টি উত্তম বিগলিত গোবর বা ভেড়ী-সার, সর্বপ, কার্পাস বা রেড়ীর খৈল গর্তের মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। চারা রোপিত হইলে তাহাতে জলসেচন করিবে। পরদিবস প্রাতে স্থানীয় সুবিধা মত কোনরূপে ঢাকিয়া দেওয়া উচিত। এতদর্থে কদলীপত্র, বাসনা অথবা পেটা—সাধারণতঃ সর্বত্র সহজলভ্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়। চারাগুলি ২।৩ দিন মধ্যে সহজ অবস্থা লাভ করিলে আব-রণ খুলিয়া দিতে হইবে। চারাগুলি মাটিতে উত্তমরূপে সংলগ্ন হইলে ১০।১২ দিন পরে পার্শ্বস্থিত মাটি কাটিয়া গাছের গোড়ায় দিবে এবং ভেলি বা দাঁড়া তুলিয়া দিয়া, ১০।১২ হইতে ২০।২৫ দিন অন্তর একবার জল সেচন দ্বারা জমী ভিজাইয়া দিবে। কতদিন অন্তর ক্ষেত্রে জলসেচন করা উচিত মাটির অবস্থা বুঝিয়া ঠিক করিতে হইবে। বেলে বা কাঁকুরে মাটিতে কিশা পাহাড়ী জমিতে অধিক দিন রস থাকে না, সুতরাং জমিতে ঘন ঘন জল-সেচন করা উচিত। রসা ও এঁটেল মাটিতে এবং নাবাল জমিতে ঘন ঘন সেচন না করিয়া মাটির অবস্থা বুঝিয়া জলসেচন করা উচিত। জলের বেগে গোড়া হইতেও মাটি সরিয়া যায়, কিন্তু তাহা নিবারণ করিতে হইবে এবং প্রয়োজন বুঝিলে গাছের গোড়ায় পুনরায় মাটি দিতে হইবে। গাছের কাণ্ড অনাবৃত থাকিলে সূর্যের সাক্ষাৎ উত্তাপে গাছ দুর্বল হইয়া পড়ে এবং নিম্নদেশের পাতা সকল ঝরিয়া যায়।

একণে ক্ষেত্রে জলসেচন ও জমি কোপাইয়া পরিষ্কার করা ভিন্ন অল্প বিশেষ কাজ নাই। অধিক ভেজাল সার দিলে বাঁধাকপি ফাটিয়া যায়।

সময়ে সময়ে কপিক্ষেত্রে নানাবিধ কীট-পতঙ্গাদির উপদ্রব হয়। তাহাদিগকে হস্ত দ্বারা বাছিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। বিগত ১৯০১ খৃষ্টাব্দে রাজনগরে কপিক্ষেত্রে বড়ই পোকার উপদ্রব হইয়াছিল। পোকাগুলি ৩৪ অঙ্গুলি দীর্ঘ হইত। ইহাদিগের গাত্রে ১০।১২টি খাঁজ থাকে। ইহাদিগের ৮টি পা ও ৬-টি ছল বা অবলম্বনের জন্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পা আছে। গাত্রের স্থানে স্থানে কাল দাগ আছে। উক্ত পোকার নাম Large white cabbage butterfly—উহার প্রজাপতি জাতীয় অর্থাৎ এই কীট ভবিষ্যতে বড় হইয়া প্রজাপতির রূপ ধারণ করে। ইণ্ডিয়া-গবর্ণমেন্টের কীটতত্ত্ববিৎ বলেন যে, ক্ষেত্রে প্রজাপতি,—বিশেষতঃ দ্বীপজাতীয় প্রজাপতি দেখিলেই ধৃত করিলে তাহারা আর ক্ষেত্রমধ্যে ডিঙ প্রসব করিতে পারে না। কীট ধরিয়া বিনাশ করিতে তিনি পরামর্শ দেন। এই উপায়ই বিশেষ কার্য্যকরী, অধিকন্তু কীটদষ্ট গাছও তুলিয়া ফেলিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়।

শীঘ্র ফসল উৎপন্ন করিবার জন্ত অনেকে ভরা বর্ষাতেই সকল বীজ একবারে বপন করেন কিন্তু সে সময় বর্ষার আতিশয্যাহেতু অনেক বীজ ও চারা নষ্ট হয় এবং ফসলও তাদৃশ আশাজনক হয় না। এজন্ত সমুদায় বীজ ঋতুর প্রারম্ভেই না বুনিয়া ক্রমে ক্রমে বুনিলে লাভ আছে। এ সময়ের বারিপাতে ক্ষতি হয় স্তত্রায় যত বিলম্ব করিয়া বীজ কেলিতে পারা যায় ততই কপি জাতির পক্ষে শুভকর। রৌদ্র ও শিশির কপির পক্ষে বিশেষ উপকারী। ভাদ্রমাসে যে সমুদয় বীজ বপন করা যায় তাহাদিগের ফসল সুন্দর হইয়া থাকে।

অনেকে মনে করেন যে বাঁধাকপির পাতা না বাঁধিয়া দিলে উহা 'বাঁধে' না অথবা উহা ঠাস্ বা দৃঢ় হয় না। প্রকৃতপক্ষে তাহা ভুল। যতই গাছ বড় হইতে থাকে, ততই উহা স্বতঃই বাঁধিতে থাকে। উত্তমরূপে

আবাদ করিলে এক একটি কপি পনের সের হইতে আধ মণ পর্য্যন্ত ওজনে ভারী হইয়া থাকে। মোটামুটি ১৥০ হাত অন্তর জুলির মধ্যে ১৥০ হাত ব্যবধানে গাছ বসাইলে প্রতি বিঘা ভূমিতে ২৮০৪টি এবং ২ হাত জুলির মধ্যে ২ হাত ব্যবধানে গাছ বসাইলে ২৭০০ গাছ বসিতে পারে। ছই প্রকারের সমষ্টির মাঝামাঝি একটা ব্যবধান ধরিয়া লইলেও প্রতি বিঘা ভূমিতে ২০০০ হাজারের অধিক কপি উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যেক কপি ১/০ হিসাবে বিক্রয় করিলে, বিঘা প্রতি ১২৫৮ টাকা মূল্যের কপি উৎপন্ন হইতে পারে। ইহা হইতে ৭৫৮ খরচ হিসাবে বাদ দিলেও, বিঘা প্রতি ২০০৮ লাভ থাকিতে পারে। ফসলের আকার, দৃঢ়তা, কোমলতা ও আন্বাদ অনুসারে মূল্যের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে।

## ফুলকপি ( Cauliflower )

ফুলকপি বিলাতী সর্জী কিন্তু তাহার কয়েকটি জাতি এদেশে স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হইয়া দেশী ফুলকপি নামে অভিহিত হইয়াছে। বেহার, উত্তর-পশ্চিম বা যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে যে ফুলকপির বীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তৎসমুদায় ‘দেশী’ নামে আখ্যাত।

দেশী ও বিলাতী—ছই জাতীয় ফুলকপিই আজকাল এদেশে বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু দেশী পাটনাই হইতে বিলাতী ফুলকপি যে সর্বোত্তমভাবে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে কোন বিধা নাই। দেশী জাতি আকারে যে বিলাতী অপেক্ষা ছোট হইয়া থাকে তাহা নহে, কিন্তু শেষোক্ত প্রকারের ফুলের বর্ণ যেমন শুভ্র, আহারকালে তেমনি কোমল ও সুস্বাদু-বিশিষ্ট। দেশী জাতি ইহার বিপরীত, অর্থাৎ তাহার ফলের বর্ণ অন্ধাধিক



মলিন হয়, ভোজনকালে তাদৃশ কোমলতা অনুভূত হয় না, অধিকন্তু গন্ধ অতি অপ্রিয় ও তীব্র। নানাবিধ মসলা দিয়া রন্ধন করিলে উহার আভ্রাণ তত জানিতে পারা যায় না, কিন্তু ফুলকপি ভাতে কিম্বা সিদ্ধ ভোজন করিলে তাহা স্পষ্ট বোধিতে পারা যায়। চেষ্টা করিলে যে ইহার দোষ কালন করিতে পারা যায় না তাহা নহে। প্রকৃষ্ট প্রণালীতে আবাদ করিয়া যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহারই বীজ লইয়া পুনরায় আবাদ করিলে উহার জাতিগত উৎকর্ষতা রক্ষা হইতে পারে। দেশের বর্তমান দ্রব্যের উন্নতি সাধনের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বিলাতী সামগ্রী প্রবর্তন করা আমাদের প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই কারণেই আমাদের সকল শিল্প-পণ্যাদি অধঃপাতে গিয়াছে ও যাইতেছে।

শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহ হইতে ভাদ্রমাসের শেষ সপ্তাহ পর্য্যন্ত ফুলকপির বীজ বপনের সময়। বেহার, যুক্তপ্রদেশে উড়িষ্যা অঞ্চলে বাল্লালা দেশ অপেক্ষা অগ্রে বীজ বপন করা যাইতে পারে। কিন্তু ভরা শীতের ফুলকপিই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। আশু জাতীয় কপির বীজ সর্বাগ্রে বপনীয়। তৎপরে মাধ্যমিক, এবং অবশেষে নাবী জাতীয় বীজ বপন করিতে হইবে। বর্ষা থাকিতে যে সকল বীজ বপনীয়, তাহা গামলা বা বাক্সে বপণ করিতে হইবে। নামুলা বা নাবী (late) কপির বীজ বপণ করিবার সময় বর্ষা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসে, সুতরাং তখন ভাটিতে বীজ বপন করিলে ক্ষতি নাই। বীজ ও চারাপালন সম্বন্ধে বাঁধাকপির নিয়ম অবলম্বন করিলেই চলিবে।

আষাঢ় মাস হইতে জমিতে বারম্বার চাষ দিয়া বিধা প্রতি ১০।১২ গাড়ী গোবর, এবং ক্ষেতে চারা পুতিবার সময়ে প্রতি চারার গর্ভে তিন-চারি মুষ্টি গোয়াল-ঘরের পুরাতন আবর্জনা কিম্বা ঠাণ্ডা খৈলসার কিম্বা মিশ্র সার দিতে হয়। ছোট এবং আশু জাতীয় কপির জন্ম ২৥০ ফুট

অন্তর জুলির মধ্যে ১।০-হাত ব্যবধানে চারা বসাইতে হয়। বৃহজ্জাতীয় কপির পক্ষে ২-হাত অন্তর জুলির মধ্যে ১।০-হাত ব্যবধান রাখা উচিত।

চারাগুলি যেমন বড় হইতে থাকিবে, তেমনি তাহাদিগের গোড়ায় মাটি তুলিয়া সরাসরি ভেলি বা দাঁড়া করিয়া দেওয়া উচিত এবং ক্ষেত্রে নিয়মিতরূপে ১০।১২ দিন অন্তর একবার হেঁচ, এবং মাটিতে যো হইলে, জমি কোপাইয়া দেওয়া আবশ্যিক। জমি কোপাইবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন মাটি উল্টাইয়া পড়ে। পরে মাটি চূর্ণ করিয়া দিতে হইবে।

গাছে ফুল দেখা দিলে, সেই গাছ হইতেই নিম্নভাগের ২।১টি পাতা ভাঙ্গিয়া ফুল ঢাকিয়া দিলে ভাল হয়। একপ না করিলে রোদ্রে ফুলের কোমলতা নষ্ট হয়, আশ্বাদের বিপর্যয় ঘটে এবং বর্ণ ও হরিদ্রাত হইবার সম্ভাবনা। ফুল প্রস্ফুটিত হইবার আগেই অর্থাৎ ঘন ও দৃঢ় থাকিতেই, ব্যবহারোপযোগী হয়, কিন্তু ফুল খুলিয়া গেলে স্বাদ ও বাস কমিয়া যায়।

গাছে ফুল দেখা দিলে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় খেলের বা অস্থি-চূর্ণের তরলসার দুই-একবার দিতে পারিলে ফুল বৃহদাকারের হইয়া থাকে।

অনেক রকম কীট চারা-গাছের অনিষ্ট করে, সুতরাং গাছে যখন পোকের আবির্ভাব হয়, তখন গাছের পাতায় ছাই ছড়াইয়া দিতে পারিলে ভাল হয় অথবা জলের সহিত ফিনাইল (Phenyle) মিশ্রিত করিয়া গাছের উপর ছড়াইয়া দিলেও বিশেষ উপকার দর্শে। স্তম্ভ কীটগ্রস্ত পত্র বা গাছ ক্ষেত্র হইতে দূর করিতে হয়।

হিমপ্রধান ও পার্শ্বত্যা প্রদেশে ফাল্গুনের শেষভাগ হইতে বৈশাখের শেষ পর্যন্ত বীজ বপনের সময়। আবাদ ও পরিচর্যা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত পদ্ধতি ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ নিয়ম নাই, কেবল সময়ের অগ্রপশ্চাৎ মাত্র।

## ওলকপি (khol khol or khol rabi)

ওলকপি গাছে যে স্থল, শাসাল, ক্ষীত কাণ্ড জন্মে তাহাই ভোজ্য। ইহার ভোজ্যাংশ মৃত্তিকার উপরিভাগে থাকে, সুতরাং অধিক দিন ক্ষেত্রে থাকিলে কঠিন ও ছিবড়া-বিশিষ্ট হইয়া যায় এবং তখন উহা মানুষের খাওয়ার অযোগ্য হইয়া পড়ে।

যে প্রণালীতে বাঁধাকপির আবাদ করিতে হয়, ইহার জন্তও সেই সকল নিয়মই প্রশস্ত। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বাঁধাকপির প্রণালীতে চারা উৎপন্ন ও পালন করিয়া কার্তিক মাসে চৌকায় এক ফুট ব্যবধানে ওলকপির চারা রোপণ করিতে হইবে। শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত করিবার জন্ত গাছের গোড়ায় মধ্যে মধ্যে তরল-সার দিলে অল্পদিন মধ্যেই কপিগুলি বড় হয় এবং আহারোপযোগী হয়। ক্ষেত্রে অধিক দিন না রাখিয়া, বালকদিগের খেলিবার গোলা বা মাঝারি বেলের আকার প্রাপ্ত হইলেই আহারোপযোগী হইয়া থাকে, ক্ষেত্রে রোপণ করিবার দিন হইতে ছয় সপ্তাহ মধ্যেই ওলকপি আহারোপযোগী হয়। ওলকপি পুষ্টিকর তরকারি। দীর্ঘকাল ক্ষেত্রে রাখিয়া বৃহদাকার করিবার চেষ্টা করিলে গাঁট কঠিন হইয়া যায় ফলতঃ তাহা অখাদ্য মধ্যে পরিগণিত হয়।

সচরাচর তিন বর্ণের ওলকপি দেখা যায়,—সবুজ, সাদা ও বেগুনী। কিছুদিন পূর্বে হোয়াইট ভিয়েনা ( White Vienna ) পর্পল জায়ান্ট ( Purple Giant ) হোয়াইট জায়ান্ট লেট ( White giant late ) এবং গলিয়াথ ( Goliath )—এই কয় জাতি আবাদযোগ্যরূপে পরিগণিত ছিল কিন্তু ইদানীং আরও কয়েকটি জাতির আবির্ভাব হইয়াছে, তৎসমুদায়ই আবাদযোগ্য।

## শালজম ( Turnip )

শালজম কন্দ-জাতীয় উপাদেয় তরকারী। হালকা-দোআঁশ মৃত্তিকায় উত্তম জন্মে। ভাদ্র মাসে যথানিয়মে জমি প্রস্তুত করিয়া সেই সঙ্গে কাঠা প্রতি ৭৮ সের হিসাবে খৈল দিয়া মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাল করিতে হইবে। পরে যথানিয়মে পটি তৈয়ার করিয়া বীজ বপন করিবে।

ভাদ্র মাসের শেষভাগ হইতে কার্তিক মাসের প্রথমার্দ্ধ কালের মধ্যে গামলা, বাস্ক বা ভাঁটাতে ইহার বীজ বপন করিতে হয়। চারা কিছু বড় হইলে অপর ভাঁটাতে ৩৪ অঙ্গুলি অন্তর রোপণ করিয়া যথানিয়মে পালন করিতে হইবে। অতঃপর এই সকল চারায় ৭৮টি পাতা উদ্গত হইলে পটিতে ২২-অঙ্গুলি হইতে ১৫ অঙ্গুলি ব্যবধানে এক-একটি চারা রোপণ করিতে হইবে। চারা উৎপাটনকালে শিকড় যেন ছিঁড়িয়া না যায়, অধিক কি, কিঞ্চিন্নাত্রও আঘাত প্রাপ্ত না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। মাটির অবস্থা বুঝিয়া সপ্তাহে একবার উত্তমরূপে ছেঁচ দিয়া চৌকাগুলি ভিজাইয়া দিবে এবং সেই জল মাটিতে শোষিত হইলে এবং পরে মাটিতে ঘো হইলে নিড়ান দ্বারা মাটি খুঁড়িয়া চূর্ণ করিয়া দিবে। পটি সর্বদা পার-স্কার থাকা আবশ্যক।

কন্দের আকারের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কোমলত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত, কারণ অধিক দিবস রোদে থাকিলে কন্দের শস্তুর স্বাদ ও কোমলতা নষ্ট হইয়া যায়। কন্দগুলি পার্শ্বস্থিত মাটির দ্বারা আবৃত থাকিলে তাদৃশ কঠিন হইতে পায় না। শ্রাবণ মাস হইতে কার্তিক মাস পর্য্যন্ত ১৫২০ দিবস অন্তর বীজ বপন করিলে আশ্বিন মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত শালজম পাওয়া যাইতে পারে। সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিলে উক্ত মাসাধিক কাল গৃহ মধ্যে থাকিতে পারে। সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইলে

ক্ষেত্র হইতে কন্দগুলি উঠাইয়া জলে উত্তমরূপে ধৌত করতঃ কয়েক ঘণ্টা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া সাদ্ধিহীন স্থানে বালুকা মধ্যে রাখিলে অনেক দিন থাকিতে পারে। প্রত্যেক কন্দকে ৪।৫ বা ৭।৮ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া রৌদ্রে উত্তমরূপে শুকাইয়া রাখিয়া দিলেও ৪।৫ মাস বা ততোধিককাল সঞ্চিত থাকিতে পারে। আবশ্যকমত সেই শুষ্ক খণ্ডগুলিকে জলসিক্ত করণান্তর রন্ধন করিলে উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়। নানাবিধ মসলা সংযোগে শালজমের উত্তম আচার প্রস্তুত হইতে পারে।

শালজমের অত্যন্তম জাতির নাম,—রটা-বেগা (Rata-baga)। উহার স্বাদ সুমিষ্ট। ইয়ুরোপে গৃহপালিত পশুদিগের আহারের জন্ত শালজম ও রটা-বেগার যথেষ্ট আবাদ হইয়া থাকে। পয়স্বিনী গাভীগণ শালজম বা রটা-বেগাসম্বিত ‘জাব’ পাইলে অধিকতর দুধ প্রদান করে, এবং যে দুগ্ধ প্রদান করে তাহা গাঢ়, সুস্বাদু ও সুমিষ্ট হয়।

বাক্সালা দেশে শালজম শব্দ শালগামে পরিণত হইয়াছে কিন্তু এতদুভয় শব্দই প্রাচীন সাহিত্য মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাক্সালায় উহা শালগম নামে অভিহিত হওয়ায় অনেক হিন্দু বিধবা রমণী ইহা ভক্ষণ করেন না। শালগ্রাম শিলার নামানুরূপ শব্দ—শালগম। এই জন্তই বোধ হয় তাঁহারা ‘শালগম’ ভক্ষণ করেন না। কিন্তু ইহার প্রকৃত নাম যে শালজম তাহা তাঁহাদিগের অবগত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

### গাজর ( Carrot )

এদেশে শালজমের স্থায় দেশী ও বিলাতী—এই দুই জাতীয় গাজরের আবাদ হইয়া থাকে। দেশীয় গাজরের আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং তাহার মূল কৃষ্ণাভ-লাল হয়। দেশী গাজর মনুষ্যের আহারোপযোগী।

নহে। সাধারণতঃ তাহা গো. অথ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদিগের আহারের জন্ত ব্যবহৃত হয়। গাজরের জাব পাইলে পশুগণ বলিষ্ঠ হয়। গৃহ-পালিত গবাদি পশুদিগকে স্থলকায় করিবার জন্ত ইয়রোপ ও আমেরিকায় উহাদিগকে গাজর খাওয়ান হইয়া থাকে। গাভীদিগকে গাজর খাওয়াইলে কেবল যে উহার বলিষ্ঠ ও স্থলকায় হয় তাহা নহে, উহারা যে দুগ্ধ প্রদান করে, সে দুগ্ধজাত রাখন অতি উপাদেয় হয়।

মনুষ্যের ব্যবহারের জন্ত গাজর উৎপন্ন করিতে হইলে বিলাতী বীজ ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। প্রথমোক্ত গাজর, সবজী-গাজর বা Garden carrot, এবং শেষোক্ত গাজর ক্ষেতী-গাজর বা Field carrot নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

**সবজী পাতঙ্গর :—**গাজর কন্দজাতীয় সবজী। ইহার জন্ত সাধারণ দোআঁশ মাটি এবং গভীর চাঁঘের আবশ্যক। দাঁড়া কোদাল দ্বারা জমি কোপাইয়া মাটি চূর্ণ করতঃ মাটির সঙ্গে সার মিশ্রিত করিলে মাটি খুরা ও সারাল হয়। পাতা-সার এবং নূতন খুরা গোবর সার দিলে মাটি লঘু ও ফাঁপা হইয়া থাকে। মাটি তৈয়ার হইলে পটী বাঁধিয়া তন্মধ্যে বীজ বপন করিবে। বপনীয় বীজের সহিত অল্পাধিক খুরা মাটি বা সার মিশ্রিত করিলে দানা সকল বিস্তৃত হইয়া পতিত হয় অল্পখা সর্বত্র সমভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়ে না, ফলতঃ চারা সকল ঘনভাবে জন্মে। গাজরের বীজ অঙ্কুরিত হইতে অনেক বিলম্ব হয় কিন্তু অনেকে এই কারণ অবগত না থাকায় বীজ বপনের পর কয়েক দিবস মধ্যে উহার অঙ্কুর দেখা না দিলে, তৎপ্রতি অবহেলা করিয়া থাকেন। বীজ বপনকাল হইতে অঙ্কুরিত হইবার জন্ত ১০-১৫ দিন অপেক্ষা করা উচিত। শীঘ্র অঙ্কুরিত হইবার জন্ত গাজর বীজ ১০-১২ ঘণ্টা কাল কাপড়ের পুটুলির মধ্যে বাঁধিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিতে

হয়। প্রত্যুষে ভিজাইয়া রাখিলে সায়ংকালে বপন করিতে পারা যায়। উক্ত উপায় অবলম্বিত হইলে ৩৪ দিবসের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হয়। মাটি শুষ্ক হইয়া গেলে বীজ অঙ্কুরিত হইতে অধিকতর কালবিলম্ব হয়, কিম্বা মাটি কঠিন হইয়া যাওয়ায় আদৌ অঙ্কুরিত হইতে সমর্থ হয় না। পটিতে বীজ ছড়াইয়া দিয়া মাটি চাপা দিতে হয় এবং যাবৎ না অঙ্কুরিত হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত দিবাভাগে দরমা বা খড়ের ঝাঁপ দিয়া পটি ঢাকিয়া রাখা উচিত।

আশ্বিন মাসের শেষভাগ হইতে পূরা কার্তিক মাস বীজ বপনের প্রশস্ত সময়। কাঠা পরিমিত পটিতে মাটি অল্পসারে ১ গাড়ী বা ২ গাড়ী গোবর সার অথবা ৭৮ সের খৈল চূর্ণ দিলেই চলিতে পারে। বীজ অঙ্কুরিত হইলে, যে সকল স্থানে ঘনরূপে চারা জন্মে সেখান হইতে অল্পাধিক চারা উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে হইবে। গাজরের চারা স্থানান্তরিত করিবার প্রথা নাই। গাজরের পটিতে সমধিক পরিমাণে জলসেচন করিতে হইবে এবং পটিতে যো হইলে নীড়ান কিম্বা কাষ্ঠ শলাকা দ্বারা মাটি খুঁড়িয়া দিতে হইবে। বলা বাহুল্য,—মাটি সর্বদা স্ফীত থাকা উচিত।

**ক্ষেতী-পাউফল।**—ইহা কৃষির অন্তর্গত ফসল, মৃতরাং কৃষি-মতে ইহার আবাদ করিতে হয়। কার্তিক মাসে গভীর কর্ষণ দ্বারা মাটি প্রস্তুত করিতে হইবে। গো-শালার আবর্জনা ও ছাই সাররূপে ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া দিলে ভাল হয়। জমি প্রস্তুত হইলে বীজ ছড়াইয়া হালকা বিদে সাহায্যে ক্ষেতের মাটি বিচলিত করণান্তর চৌকী বা মই দ্বারা মাটি চাপিয়া দিতে হইবে। ইহার আবাদের আর কিছু বিশেষ পাট নাই।

Aphis dauci নামক এক জাতীয় কীট আছে। তাহারা গাজরের

পরম শত্রু, কিন্তু ইহাদিগের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত মাটির সহিত বুল মিশাইয়া দিলে উপকার হয়। বুলের তীব্রতায় কীটগণ মাটিতে থাকিতে পারে না, উপরন্তু বুলের সংশ্রবে মাটি সারবান হইয়া ফসলের বিশেষ উপকার করে।

আকার, বর্ণ, গুণ ও স্বাদ অনুসারে গাজরের অনেক প্রকারভেদ হইয়াছে। কোন জাতীয় গাজরের আকার প্রকার লম্বা জাতীয় মূলার ভ্রায়, কোনটা লাল, কোনটা হরিদ্রাবর্ণের ইত্যাদি। সকল জাতিই পরিপুষ্ট হইবার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন যে জাতি পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে, তখনই তাহারা সংগৃহীত হইবার উপযোগী হয়। ভবিষ্যতের জন্ত সঞ্চয় করিতে হইলে অতি যত্ন-সহকারে গাজরগুলিকে ভূমি হইতে উঠাইয়া তাহাদিগের শিরোভাগের ১ বা ২ অঙ্গুলি পরিমাণ ছেদন পূর্বক বাদ দিয়া ২১০ দিন বায়ুমণ্ডলিত ছায়াবিশিষ্ট স্থানে রাখিয়া দিতে হয়। তদনন্তর শুষ্ক বালি বা বুয়া মাটির মধ্যে রাখিয়া দিলে ভবিষ্যতে প্রয়োজনমত বাহির করিয়া ব্যবহার করিতে পারা যায়। শালজন্মের ভ্রায় খণ্ড খণ্ড করতঃ শুকাইয়া, রাখিলে পরে ব্যবহার করা চলিতে পারে।

### বীট ( Beet )

বীটের হিন্দী নাম চকুন্দর। কলিকাতা অঞ্চলে অনেকে ইহাকে বীটপাঙ্গু নামে অভিহিত করেন। ইহাদিগের কন্দ মৃত্তিকাতান্ত্রে প্রোথিত থাকে এবং তাহাই তরকারিরূপে ব্যবহৃত হয়। বীটের বর্ণ ঘোর রক্তিম এবং স্বাদ অতিশয় মিষ্ট। জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া দেশে বীট



হইতে চিনি প্রস্তুত হয় এবং সেই চিনি ইদানীং পৃথিবীর নানাদেয়ে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে।

দো-আশ হালকা মাটিতে বীট উত্তম জন্মে। বীটের মূল একহাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। ইহার আবাদের জন্ত গভীর কর্ষণ প্রয়োজন। অস্থি-চূর্ণ ও রেড়ীর খৈল ইহার পক্ষে উত্তম সার। বীট অল্প পরিসরব্যাপী সজী, ক্ষুতরাং তাহার জন্ত চোকা অপেক্ষা পটীই ব্যবস্থা। মাটিতে অস্থিসার সংযোজিত করিতে হইলে আষাঢ় মাসের মধ্যেই পটির মধ্যে তাহা প্রসারিত করিয়া যথানিয়মে মাটির সহিত মিশাইয়া রাখিতে হইবে, ফলতঃ ভাদ্র মাস মধ্যে অস্থি বিগলিত হইয়া ফসলের আহরণোপযোগী হইয়া উঠিবে। বীজ অথবা চারা রোপণের সময় মাটিতে অস্থিচূর্ণ দিলে ফসলের বিশেষ উপকার দর্শে না। ভূমিতে চারা রোপণের এক সপ্তাহ পূর্বে চূর্ণ খৈল-সার দিলে ভাল হয়। এক কাঠা পরিমাণ পটীতে ১৪ সের বিগলিত অস্থিচূর্ণ এবং দশসের রেড়ী বা সর্ষপ খৈল যথেষ্ট।

ভাদ্রমাসে বীজ বপন করিতে হয়। যদি সে সময়ে বর্ষাধিক্য দেখা যায়, অথবা যদি শ্রাবণ মাসে বীজ বপন করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ভাঁটির পরিবর্তে গাম্‌লাতেই বীজ বপন করা উচিত। গাম্‌লা-তেই হউক বা ভাঁটিতেই হউক, মাটি হস্ত দ্বারা চাপিয়া লইয়া দুই অঙ্গুলি ব্যবধানে আধ ইঞ্চি মৃত্তিকার ভিতরে বীজ পুতিতে হইবে। চারা গুলি চারি অঙ্গুলি পরিমাণ বড় হইলে পটীতে যত্নসহকারে আধহাত ব্যবধানে বসাইতে হয়। চারা তুলিবার সময় এরূপ সতর্কতা আবশ্যক যে, উহার শিকড় কিছুতেই না আঘাত পায়। পটীতে চারাগুলির গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রোপণ করিতে হইবে। সপ্তাহে একবার করিয়া পটীতে জল দিবে, মধ্যে মধ্যে নীড়ান দ্বারা মাটি আলগা করিরা তৃণমুক্ত করিয়া দিবে। লবণ ইহার বিশেষ সার। মধ্যে মধ্যে লবণের জল দিলে

বীটের বিশেষ উপকার হয়। ফসলের মধ্যমাবস্থায় কন্দমূলে পনর ভাগ মাটির সহিত এক ভাগ লবণ মিশাইয়া দিলেও চলিতে পারে। কন্দ,—মাটির উপরে জাগিয়া উঠিলে অর্থাৎ উপরে দেখা গেলে মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হয়, নতুবা কন্দ শক্ত, ছিব্‌ড়া বিশিষ্ট ও বিষাদ হয়।

ক্ষেত্র হইতে বীট উঠাইতে কন্দে যেন কোনরূপ আঘাত না লাগে এরূপ সাবধানে বীট উত্তোলন করিতে হয় নতুবা স্বাদের ব্যতিক্রম হয়।

শীতপ্রধান পার্শ্বত্যা প্রদেশে চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠমাস পর্য্যন্ত বীজ বপনের সময়।

## ব্রকোলি ( Broccoli )

ফুলকপির সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য থাকায় অনেকে ইহাকে ফুলকপির অন্ততম জাতি মধ্যে গণনা করেন। ফুলকপির ত্রায় ব্রকোলিও স্বভাবজাত বাধাকপি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রকোলি পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইতে ফুলকপি অপেক্ষা অধিক সময় লইয়া থাকে। সমতল দেশে আবাদ হইতে প্রায় দেখা যায় না, কারণ ফুলকপিতেই যথেষ্ট হয়। ব্রকোলি শীত প্রধান দেশের উপযোগী ফসল।

ফুলকপির জন্ত যেরূপ জমী ও সারের প্রয়োজন ব্রকোলির পক্ষেও অবিকল তাহাই। ভাদ্রমাসে গাম্‌লায় চারা উৎপন্ন করিয়া যথানিয়মে ভাঁটীতে স্থানান্তরিত করিবে। অনন্তর চারাগুলি ৮১০ টা পাতাবিশিষ্ট হইলে আশ্বিন মাসের শেষভাগ হইতে কার্তিক মাসের মধ্যেই ক্ষেত্রে স্থায়ীরূপে বসাইয়া দিবে এবং ফুলকপির ত্রায় পরিচর্যা করিবে। গাছের মাথায় ফুল দেখা দিলে সেই গাছের ছই একটা পাতা ভাজিয়া তাহার

উপরে চাপা দিবে, নতুবা রোদে ফুল বিবর্ণ হইয়া যায়, ফলতঃ স্বাদ ও কোমলতার ব্যতিক্রম ঘটে।

### ব্রসেল্‌স ( Brussels Sprouts )

ব্রসেলের অন্ততম দেশী নাম,—গাছ-কপি। ব্রসেল্‌ বাঁধাকপির জাতি হইলেও, বাঁধাকপি হইতে ইহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। বাঁধাকপির একটি ‘মাথা’ হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রসেলের গাছ দুই বা আড়াই হাত দীর্ঘ হয় এবং তাহার কাণ্ডের গাত্রে প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থিতে বেলের স্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁধাকপি জন্মিয়া থাকে। উল্লিখিত কপিগুলি অবিকল ক্ষুদ্রক্ষুদ্র বাঁধাকপির স্থায়। যত্নপূর্বক আবাদ করিলে সমতল দেশে জন্মিতে পারে। শীতের শেষভাগে ইহা জন্মিয়া থাকে এবং সে সময়ে বাঁধাকপি বাজারে যথেষ্ট পাওয়া যায়। তৎপরে ইহাও দেখা যায় যে, শীতের শেষভাগের কপির মত সুস্বাদু হয় বা। যদি ভরা শীতে ব্রজসেল্‌ উৎপন্ন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সুবিধা আছে। সাধারণতঃ, ইহা শীতপ্রধান দেশের আবহাওয়ার উপযোগী তরকারি। দারজিলিং, মগুরী, শিলং, ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে সহজেই আবাদ করিতে পারা যায়।

ভাদ্রমাসের প্রারম্ভেই ভাঁটীতে বীজ বপন করিতে হইবে এবং যথানিয়মে লালনপালন করিয়া চারাগুলি ৭৮ অঙ্গুলি বড় হইলে ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। তিন-পোয়া-হাত অন্তর শ্রেণীতে ১৮ ইঞ্চি অর্থাৎ একহাত ব্যবধানে এক একটা চারা বসাইতে হয়। ব্রসেলের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে সার না দিলে উহা ভালরূপ জন্মে না সুতরাং অত্যন্ত কপির জন্মি অপেক্ষা ইহার জন্মিতে কিঞ্চিৎ অধিক সার দেওয়া আবশ্যক। এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রে ‘পাটান’ বা ছেঁচ দিবে এবং

ভূমি কোপাইয়া ঘাস-মুখা বাছিয়া ফেলিতে হইবে। গাছের গোড়ায় আল বা দাঁড়া তুলিয়া দিতে হইবে। গাছের শুষ্ক পাতাগুলি মধ্যে মধ্যে কাটিয়া দেওয়া আবশ্যক।

শীত-প্রধান পার্শ্বত্যদেশে ফাল্গুন লইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত বীজবপনের সময়। দেশ, কাল ও পরিচর্য্যার তারতম্যানুসারে প্রতি গাছে ২০ হইতে শতাধিক কপি জন্মে।

### লেটিউস্ ( Lettuce )

হিন্দুস্থানী ভাষার ইহা কাছ নামে পরিচিত। অনেকে ইহাকে সালাদ নামে অভিহিত করেন। সাহারাণপুর বোটানিকেল গার্ডেনের ভূতপূর্ব সুপারিটেণ্ডেন্ট মিঃ গোলান সাহেব অনুমান করেন যে, হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্তে *Lactuca scariola* নামে যে উদ্ভিদ আছে, কাছ তাহারই জাতিবিশেষ।

লেটুসের আকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীধাকপির ত্রায়। ইহাতে উত্তম সালাদ নামক সাহেবী চাট্‌নী প্রস্তুত হয়। দেশীয় গৃহস্থালীতে উহা দ্বারা নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন হইয়া থাকে এবং তাহা উপাদেয় হয়।

ক্যাবেজ ( Cabbage ) ও কস ( Cos )—এই দুই জাতিতে লেটুস বিভক্ত। ক্যাবেজ জাতি চ্যাপ্টা হয়, আর কস জাতি নারিকেলী কপির ত্রায় উর্দ্ধদিকে লম্বা ও সরু হয়। এতদুভয় জাতির আবাদ সম্বন্ধে কোন বিভিন্ন নিয়ম নাই। একই প্রণালীতে দুই প্রকার লেটুসের আবাদ হয়।

শ্রাবণ মাসের শেষভাগ হইতে আশ্বিন মাসের প্রথম ৭৮ দিবস অবধি বীজ বপনের উত্তম সময়। বীজ অঙ্কুরিত হইতে ৮১০ দিন সময় লাগে,

কখন কখন ২০।২২ দিনও সময় লাগে। হাল্কা মাটিতে বীজ বপন করিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। চারা অকুরিত হইয়া অণ্ডী পাতাবিশিষ্ট হইলে পটিতে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। পটির মাটি খুব সারবান হওয়া উচিত। পটির মধ্যে ৯-ইঞ্চি আঁতরে সারি মধ্যে উক্ত পরিমিত স্থান ব্যবধানে এক-একটি চারা পুতিতে হইবে। পটিতে সপ্তাহে একবার উত্তমরূপে জলসেচন করিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে মাটি খুলিয়া তৃণাদি মুক্ত করিয়া দিবে। গাছগুলিতে ১০।১২টি পাতা জন্মিলে কলা-গাছের পেটি বা ছোট্টা বা অল্প রকম গুল্লি দ্বারা পাতাগুলি একত্র করিয়া বাঁধিয়া দিবে, নতুবা পাতা সকল খুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। লেটুসের মধ্যাংশ খুলিয়া গেলে পাতা সবুজ বর্ণ ধারণ করে ও শক্ত হয়। পাতা যত শুভ্র রাখিতে পারা যায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। লেটুসের গাত্রে পশ্চিমে রৌদ্র না লাগিতে পারে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। স্বভাবতঃ ইহার পাতা অতিশয় কোমল, এজন্য সামান্য রৌদ্রোত্তাপেই ইহার অনিষ্ট হইয়া থাকে। অনেক স্থলে বিচালী দ্বারা গাছগুলিকে ঢাকিয়া রাখা হয়। ইহাতে গাছের মধ্যাংশের বর্ণ শুভ্র থাকে এবং কচি পাতাগুলিও শীঘ্র নষ্ট হইতে পারে না।

কাছুর বীজ এদেশে অতি সহজে জন্মিয়া থাকে এবং সেই বীজ হইতে চারাও সহজে উৎপন্ন হয়। গাছ রাখিয়া দিলে তাহাও ক্রমশঃ প্রায় দুই হাত উচ্চ হইয়া উঠে এবং সর্ষপের স্থায় শীঘ্র জন্মিয়া শীর্ষে ফুল ধারণ করে, অবশেষে বীজ ধারণ করে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বীজ জন্মে। সচরাচর বীজ বপনের দিন হইতে ৪০।৫০ দিন মধ্যে লেটুস ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে।

## দশম অধ্যায়

### মূলজ উদ্ভিদের চারা উৎপাদন

মূল রোপণ করিয়া অনেক উদ্ভিদের চারা উৎপন্ন করিতে হয়, আবার অনেক উদ্ভিদের অন্তর্ভৌমিক কাণ্ড কিম্বা গেঁড় পুতিলে চারা জন্মে। এতদ্ব্যতীত অনেক উদ্ভিদের ঋণ শাখা বা ফেঁকড়ি রোপণ দ্বারাও চারা জন্মাইতে পারা যায়।

গোল-আলু, রাঙ্গা-আলু, শকরকন্দ, কচু, মানকচু, ওল, আর্জক, আমাদা প্রভৃতি সব্জীবাগে আবাদযোগ্য আনাজের মূল, গেঁড়, চোক ও মুখী বীজরূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহারা বীজ-আলু, বীজ-কচু বা কচুর-মুখী ইত্যাদি নামে অভিহিত। ইহাদিগের অবাদের জন্য বীজ বপন করিয়া আবাদ করায় স্বেবিধা হয় না, কারণ ইহাদিগের মধ্যে অনেকের স্থান-বিশেষে, আদৌ বীজ জন্মে না। গোল-আলুর বীজ জন্মিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু সে বীজ বপনপূর্বক আবাদ করিয়া সফলকাম হইতে হইলে ২১০ বৎসরকাল অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু বীজ-আলু রোপণ করিলে কয়েক মাস মধ্যেই ফসল পাওয়া যায়। মুখী, চোক গেঁড়, বা মূল,—এ সকলই উদ্ভিদের কাণ্ডাংশ মাত্র, ইহারা ভূগর্ভস্থ কাণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহারা শিকড়ের অংশও ন'হ। শিকড় বা শিকড়ের অংশ হইতে স্বতন্ত্র গাছ জন্মে না, কারণ শিকড়ে পত্রমুকুল বা চোক (leaf-bud) থাকে না। আলু, কচু প্রভৃতির গাছে একাধিক চোক থাকে, অবসর পাইলে সেই চোক মুখরিত হইয়া ক্রমে উদ্ভিদের আকার ধারণ করে। বটবৃক্ষের কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখার গাত্র হইতে বুরি লম্বিত হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে। উক্ত বুরিগুলি শিকড় ভিন্ন অংশ কিছু নহে। শিকড় বলিয়া

উহা হইতে চারা কিম্বা পত্র জন্মে না, কিন্তু বটবৃক্ষের শাখা কাটিয়া রোপণ করিলে স্বতন্ত্র চারা উৎপন্ন হয়। লাউ, কুমড়া, শসা প্রভৃতি অনেক উদ্ভিদের কাণ্ডস্থিত গ্রন্থি বা গাঁট হইতে বুরি উদ্গত হয় এবং সে বুরি ভূমি স্পর্শ করিতে পাইলে শিকড়ের স্থায় ভূগর্ভ হইতে রস আহরণ করিয়া মূল-উদ্ভিদে প্রেরণ করে। সেই বুরিগুলিকে লতিকা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রোপণ করিলে কোন কাজই হয় না, কিন্তু ২১১টা গ্রন্থিসমেত খণ্ড-লতিকা রোপণ করিলে স্বতন্ত্র গাছ উৎপন্ন হয়। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার একবার একটা লাউগাছ হইতে (মূল গাছটী বজায় রাখিয়া) ৫৬টা স্বতন্ত্র গাছ উৎপন্ন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক গাছই যথেষ্ট ফল প্রদান করিয়াছিল। ইহাদিগকে লতা-কলম বলিলে ক্ষতি নাই।

আলু কিম্বা মানকচুর শিকড় রোপণ করিলে চারা জন্মে না, কিন্তু আলু বা মানকচুর চোক স্বতন্ত্রভাবে রোপণ করিলে তাহা মুকুলিত ও অঙ্কুরিত হয়। সুতরাং জানিয়া রাখিতে হইবে যে, আন্তর্ভৌমিক কাণ্ড উদ্ভিদের অংশ-মাত্র,—শিকড় বা শিকড়ের অংশ নহে।

অবাদের জন্ত উল্লিখিত উদ্ভিদসমূহের যে সকল তথাকথিত মূল রক্ষিত হয় যথাসময়ে অথবা অনুকূল অবস্থা পাইলে রক্ষিত স্থলেই তাহারা অঙ্কুরিত হয়। এই জন্ত তাহাদিগকে এরূপ সাবধানে রাখিতে হয় যে, অকারণে বা অকালে তাহারা অঙ্কুরিত হইতে না পারে।

উল্লিখিত উদ্ভিদ সমূহের কন্দ ভূমি হইতে সংগৃহীত হইবার পর অল্প-দিন মধ্যেই মুখরিত হইবার বা মুখাইবার প্রয়াস পায় বলিয়া তাহাদিগকে অতি সাবধানে রক্ষা করিতে হয়। ইহারা চৈতন্যবিশিষ্ট বলিয়া মুকুলিত হইবার কাল সমাগত হইলেই স্বতঃই জাগরিত হয় কিন্তু যতদিন না সে বসুযোগ অবসর আইসে, ততদিন তাহারা নিদ্রাভিভূতভাবে পড়িয়া

থাকে। কেবল যে ঋতু পরিবর্তনের ফলে ইহারা জাগরিত হয় তাহা নহে, কৃত্রিম উপায়জনিত ঋতুসঙ্কেত পাইলেও তাহারা সংজ্ঞা লাভ করে, জাগিয়া উঠে, অবশেষে মুকুলিত ও অঙ্কুরিত হয়।

গৃহের গুদামে বা যে কোন স্থানে বীজসকল সংগৃহীতাবস্থায় থাকুক, স্নযোগ পাইলেই, কিম্বা কাল সমাগত হইলেই, যখন তাহারা মুখরিত হইয়া থাকে, তখন আবাদের জন্য তাহাদিগকে নিরঙ্কুরাবস্থায় রোপণ না করিয়া পূর্কালে মুক্কাইয়া লইয়া রোপণ করা সুবিধাজনক। এই কারণে রোপণের পূর্বে ইহাদিগকে গৃহের মধ্যে কিম্বা রক্ষিত স্থানে অঙ্কুরিত করিয়া লওয়াই প্রশস্ত।

ইহাদিগের অবয়ব রসে পূর্ণ, সুতরাং জীব উত্তাপ পাইলেই মুখী সকল মুখরিত হয়। উত্তাপ অর্থে,—বায়ুমাণ্ডলিক উত্তাপ ও ভৌতিক উত্তাপ,—উভয়বিধ উত্তাপ বুঝিতে হইবে। বায়ুমণ্ডলের উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত শরীরের আভ্যন্তরীণ উত্তাপের অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। পৃথিবীতে এমন কোন পদার্থ দেখা যায় না যাহা বহির্দৈশের উত্তাপের অনুবর্তী নহে। কঠিন ইম্পাত, কাচ, লৌহ ও প্রস্তর হইতে বীজ ও উদ্ভিদ মাত্রেই বায়ুমণ্ডলের উত্তাপের অধীন, ফলতঃ শীতকালে সঙ্কুচিত এবং গ্রীষ্মকালে ফীত হয়। যাহাদিগের অবয়ব স্থিতিস্থাপক তাহারা ফীতিসহ সুতরাং একদিকে গ্রীষ্মকালে ঘেরূপ তাহারা উত্তাপের ফলে ফীত হয়, অন্যদিকে শীতকালে উত্তাপের অল্পতানিবেদন সঙ্কুচিত হয়। উক্ত দুই অবস্থাতেই যাহারা বিদীর্ণ হয় না, তাহারা সজীব পদার্থ—জীব ও উদ্ভিদ। কিন্তু প্রস্তর, কাচ প্রভৃতি নিতান্ত কঠিন জড় সকল শীত বা গ্রীষ্মের প্রকোপে বিদীর্ণ হয়, ইহারা স্থিতিস্থাপক নহে। লৌহাদি ধাতু সকলেরও কথঞ্চিত কমনীয়তা আছে বলিয়া শীতোত্তাপ সহ্য করিতে সক্ষম কিন্তু আকুঞ্চনবিফারণ গুণ-বিবর্জিত নহে।



গৃহমধ্যে অল্পক্ষণ স্থানে থাকিলে মূল সঙ্কুচিত বা নিম্নিত থাকে। এক্ষণে ইহাদিগকে সর্দিহীন অল্পক্ষণ স্থানে রাখিতে হয়। শীতকাল নিকটবর্তী হইলে ইহারা আরও নিৰ্জীব হইয়া পড়ে কিন্তু যে-ই বসন্তমলয়ের আবির্ভাব হয়, অমনি তাহাদিগের জড়তা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহারা জাগিয়া উঠে, মুখরিত হইবার চেষ্টা পায় এবং মুকুলিত হয়। গৃহমধ্যে স্তম্ভাকারে কিম্বা ঘনীভূতাবস্থায় থাকিলেও ইহারা অসময়ে মুকুলিত হইয়া থাকে।

চাষ-আবাদে, বিশেষতঃ উদ্ভানকার্যে, সকল সময় প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিস্ত থাকিলে চলে না। রোপণের সময় সমাগতপ্রায় হইলে এবং রোপণের ২৩ সপ্তাহ পূর্বে মূল, গেঁড়, মুকৌ বা চোকগুলিকে কোনও স্থানে স্তম্ভাকারে রাখিয়া সেই স্তম্ভ খণ্ডবিচালিরাশি দ্বারা উত্তমরূপে আবরিত করিয়া রাখিতে হইবে। বাস বা চাণারিতে ইহাদিগকে স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া উপরে এবং থাক বা স্তবক পরস্পর মধ্যে খণ্ড বিচালী দিয়া রাখিতে পারিলে আরও ভাল হয়। বিচালীর অভাবে স্তরের উপরে চট বা থলে প্রসারিত করিয়া রাখিলেও চলিতে পারে। এইরূপে ৭৮ দিন হইতে ১০১২ দিন থাকিলেই তৎসমুদায় হইতে চোক ফুটিয়া উঠে। স্তম্ভের মূলগুলি উত্তমরূপে মুকুলিত বা মুখরিত হইয়া উঠিলে যথানিয়মে তাহাদিগকে ভূমিতে রোপণ করিতে হইবে। অমুকুলিত অবস্থায় ভূমিতে রোপণ করিলে ইহাদের অঙ্কুরণে কালবিলম্ব হয়, অনেক সময় পচিয়া যায়।



## লীক ( Leek )

পেঁয়াজ বা লম্বুণের সহিত লীকের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ইহার যে স্থূল কাণ্ড তাহাই ব্যঞ্জনাদিতে মসলারূপে ব্যবহৃত হয়। লীকের পত্র ও কাণ্ডে পেঁয়াজের ত্রায় গন্ধ আছে।

ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে টবে বা আবৃত ভাঁটিতে বীজ বপন করিতে হয়। চারা উদ্গত হইয়া তিন-চারিটা পাতাবিশিষ্ট হইলে, ক্ষেত্রে চারা রোপণ করিবে। রোপণের নিয়ম এই যে, পটিতে ১৫ ইঞ্চি অন্তর ৫ ইঞ্চি চওড়া ও ১ ইঞ্চি গভীর এক একটা নালা রচনা করিতে হইবে। অনন্তর সেই নালা মধ্যে অল্প গোয়াল বাড়ীর পুরাতন সার দিয়া ৬ ইঞ্চি অন্তর এক একটা চারা রোপণের পর, একমাস বা দেড়মাস কাল কেবল মধ্যে মধ্যে জলসেচন ও নীড়ানি করিবে। অতঃপর যখন দেখা যাইবে যে, গাছের কাণ্ড ভূপৃষ্ঠ হইতে ৭।৫ অঙ্গুলি পরিমাণ উচ্চ হইয়াছে তখন সেই সারাল মাটি দ্বারা পূর্ণ করিয়া গাছের সমুদায় কাণ্ডটা ঢাকিয়া দেওয়া উচিত। গাছের গোড়ায় মাটি যত আলগা থাকিবে, ততই সেই কাণ্ড ক্ষীত ও স্থূল হইবে। এক্ষণে জল সেচন ও গোড়া পরিকার রাখা ভিন্ন অগ্র কোন পাট নাই। যত্ন করিয়া রাখিতে পারিলে যাবৎ না বর্ষা সমাগত হয় তাবৎকাল উহা ক্ষেত্রে নিরাপদে থাকিতে পারে এবং প্রয়োজনমত তুলিয়া আনিয়া তাহাদিগকে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

## পলাণ্ডু বা পেঁয়াজ ( Onion )

তরকারিরূপে পলাণ্ডুর নিজস্ব কিছু নাই, গন্ধের বিশেষত্বহেতু মসলারূপে ইহার বর্ধে ব্যবহার আছে। হিন্দুদিগের মধ্যে ইহার ব্যবহার অতি বিরল। অপরূপ প্রায় সকল জাতির মধ্যে পেঁয়াজ প্রায় সকল ব্যঞ্জনের উপাদান। আদিক-নিয়ামিষ নির্বিশেষে যে কোন ব্যঞ্জনে পেঁয়াজ নিয়ো-

জিত হয়, তাহা উপাদেয় হয়, স্তরিত হয়—মুখরোচক হয়। ইউরোপীয়-  
দিগের মধ্যে সালাদরূপেও ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। পলাণ্ডু উত্তেজক  
সব্জী উপরন্তু মসলা মধ্যে পরিগণিত।

আঁশবিশিষ্ট হালুকা মাটিই পেঁয়াজের পক্ষে প্রশস্ত। পেঁয়াজ মূল-  
জাতীয় উদ্ভিদ, স্তরিত ইহার আবাদের জন্য মাটি যত বুয়া ও লঘু করিতে  
পারা যায় ততই মূল বৃদ্ধির পক্ষে সুবিধা হয়।

এ দেশে সাধারণতঃ দুই প্রকার পেঁয়াজ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ছাঁচি ও  
পাটনাই। ছাঁচি পেঁয়াজের আকার স্বভাবতঃ ছোট, গন্ধ অগ্নাধিক তীব্র,  
কিন্তু ইহার ফলন অধিক হয়। পাটনাই পেঁয়াজ, বেহার অঞ্চলে প্রচুর  
জন্মে। ইহার আকার বড়, গন্ধ অপেক্ষাকৃত মৃদু, স্বাদ মধুর এবং বর্ণ  
খেতের সহিত লালের মিশ্রণ। 'এই দুই জাতি ব্যতীত আজকাল নানা  
জাতীয় বিলাতী পেঁয়াজও দেশে রোপিত হইয়া থাকে।

যে প্রকার পেঁয়াজেরই আবাদ হউক, মাটি বিশেষ লঘু, উর্বরা ও সারবান্  
হওয়া আবশ্যক। বিস্তৃত আবাদের জন্য ভূমি কোপাইয়া, পরে লাঙ্গল ও  
মই দ্বারা মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ করিতে হইবে এবং মৃত্তিকাস্থিত ইষ্টকাদি  
পৃথক করিয়া সমধিক পরিমাণে গোয়াল বাড়ীর পুরাতন আবর্জনা ও  
উদ্ভিজ্জ ফার মাটির সহিত মিশাইতে হইবে। তৎপরে পটি মধ্যে যথা-  
নিয়মে চারা রোপণ করিতে হইবে। বিস্তৃত বা সঙ্কীর্ণ আবাদ হউক, পটি  
মধ্যে ইহার আবাদই সুবিধাজনক। এইজন্য জমীকে অগ্নাধিক পটিতে  
বিভক্ত করিয়া লইতে হইবে।

বীজ হইতে যে সকল চারা উৎপন্ন করা যায় তাহার ফসল অপেক্ষাকৃত  
বিলম্বে হয় এবং তাহার ফলনও প্রথম বৎসর কম হয়। পূর্ক বৎসরের  
পেঁয়াজ বীজরূপে ব্যবহৃত হইলে ফলন অধিক হয় এবং পেঁয়াজের আকার  
বড় হয় কিন্তু এতদ্ব্যতীত আবাদ করিতে হইলে বীজ-পেঁয়াজের বাবতে ব্যয়

অধিক হয়। যাহা হউক, বীজের চারা অতিশয় ক্ষুদ্র হইয়া থাকে, সেই জন্ত প্রথম বৎসরে যে পেঁয়াজ উৎপন্ন হয় তাহা তাদৃশ বড় হয় না। পুরাতন অর্থাৎ পূর্ব বৎসরের পেঁয়াজ রোপণ করিলে মূল সকল বড় হয়, ফসল অধিক হয়।

সাধারণতঃ পেঁয়াজের চারা উৎপন্ন করিবার জন্ত বীজ অথবা পেঁয়াজ নিয়োজিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিগত ১৩০৭ সালে গ্রন্থকার দ্বারবজের অন্তর্গত রাজনগরে অবস্থানকালে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পেঁয়াজের নিম্নাংশস্থিত চাক্টি (disc) (যাহা কুটনকালে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া যায়) আদত, অথবা ২৩ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া হাপোর দিলে যথারীতি চারা জন্মিয়া থাকে। উক্ত প্রণালী অবলম্বনের সুবিধা এই যে, বীজ বা চারার জন্ত আদত পেঁয়াজ রোপণ করিতে হয় না। আরও সুবিধা এই যে, বীজ অঙ্কুরিত করিবার জন্ত অনেক প্রয়াস পাইতে হয়, কিন্তু পেঁয়াজের চাক্টি রোপণ করিলে অনেকটা ঝঞ্ঝট কমে। দ্বিতীয়তঃ চারা উৎপন্ন করিবার জন্ত যে পেঁয়াজ খরিদ করিতে হয় সে খরচটাও বাঁচিয়া যায়। বাড়ীতে খরচের জন্ত যে পেঁয়াজ ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগের নিম্নাংশের চাক্টি ফেলিয়া না দিয়া জমিতে হাপোর বা 'পাত' দিয়া রাখিলে যথাসময়ে যথানিয়মে ক্ষেতের পটী বা চৌকায় রোপণ করিলেই চলে। এতদ্ব্যতীত শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে পেঁয়াজের গোড়া সংগ্রহ করতঃ কাষ্ঠান্নিজাত ভস্মমধ্যে ক্রণকাল অর্থাৎ ২১ ঘণ্টাকাল রাখিবার পর কোন আবৃত স্থানে পাতলাভাবে ছড়াইয়া শুষ্ক লঘু মাটি বা বালি দ্বারা চাপা দিতে হইবে। অঙ্কুরোদগত হইলে মধ্যে মধ্যে জলসেচন করা কর্তব্য। ৮১০ দিন পরেই অঙ্কুরসকল নয়নগোচর হইতে থাকে। কয়েক মাস এইরূপে পালন করিয়া চারা সমূহকে ক্ষেত্রের যথাস্থানে রোপণ করিতে হইবে। উল্লিখিত প্রণালীতে চারা উৎপন্ন করিতে হইলে অধিক কালবিলম্ব করা উচিত

নহে ; কারণ বিলম্ব করিলে আবাদ করিতে অধিক দিন সময় পাওয়া যায় না, ফলতঃ পেঁয়াজ বড় হইতে পায় না, ফলনও অধিক হয় না।

যাহা হউক, আশ্বিন মাসে বীত পাত দিতে হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারাগুলি ২০টা কলিযুক্ত বা পত্রবিশিষ্ট হইলে পটা মধ্যে তাহা-দিগকে পেঁয়াজের জাতিগত আকারানুসারে ৪৫ ইঞ্চি হইতে ৬৭ ইঞ্চি ব্যবধানে রোপণ করিবে। মৃত্তিকায় রসের অবস্থা বুঝিয়া সপ্তাহে একবার বা দুইবার জলসেচন করিতে হইবে, মধ্যে মধ্যে খুঁপি দ্বারা মাটি উদ্ধাইয়া দিবে এবং গাছের গোড়ায় মাটি উচ্চ করিয়া দিবে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছ শুক হইতে থাকিলে পেঁয়াজগুলিকে উঠাইয়া লইতে হয়। যেখানে কেবল গৃহস্থালী ব্যবহারের জন্ত ইহার আবাদ হয়, সেস্থলে ইতঃপূর্ক হইতেই গাছ উঠাইতে পারা যায়।

মুরসিদাবাদ ও হারভাকায় থাকিতে বিলাতী বহু জাতীয় পেঁয়াজের অবোদ করা গিয়াছিল। বিলাতী পেঁয়াজের এক একটা গাছে এক একটা মাত্র মূল হয়, কিন্তু সে সকল মূলের আকার খুব বড় হয়। অন্যান্য বিলাতী জাতির মধ্যে Silver skin জাতির মূলের প্রত্যেকটা প্রায় আধ-সের ওজনের হইয়া থাকে। ইদানীং অনেক জাতীয় বিলাতী পেঁয়াজের বীজ এদেশে বীজব্যবসায়ীগণ আমদানী করেন।

গাছ সমেত মূলগুলি ভূমি হইতে উঠাইয়া রৌদ্রে একদিন উত্তমরূপে শুক করতঃ কোন শুক গৃহে বালির মধ্যে পুতিয়া রাখিলে পেঁয়াজ অনেক দিবস অজা বা সম্ভাব্য থাকে।

এক বিঘা-জমিতে প্রায় ১০০ মণ পেঁয়াজ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং প্রতি মণের মূল্য পাঁচ টাকা হইলে উক্ত এক শত মণ ফসলের মূল্য ১২৫০ টাকা হয়। ইহার চার-বছর পঞ্চাশ টাকা ও খরচ হয়, তাহা হইলে ৭৫ টাকা লাভ থাকে।

## শঙ্কন বা গদিনা ( Shallot )

মূল হইতে ইহার চারা জন্মে। মূলের ও পাতার গন্ধ পেঁয়াজের জায়  
কিন্তু অপেক্ষাকৃত মৃদু। তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। আশ্বিন মাসের শেষ  
ভাগে ভূমিতে বসাইতে হয় কিন্তু শৈত্য প্রদেশের ফাঙ্কন হইতে বৈশাখ  
মাস অবধি মূল পুতিবার সময়। পেঁয়াজ বা লঘুণের জায় ইহার আবাদ  
প্রণালী। ছোট ছোট পটি বা চোকায় ছয় ইঞ্চি ব্যবধানে মূল পুতিতে  
হয়। পৌষ মাস হইতে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য  
খাদ্যবিভাগে সালাদে ইহা নিয়োজিত হয়।

## লঘুণ ( Garlic )

সচরাচর আমরা ইহাকে রঘুণ নামে অভিহিত করিয়া থাকি, কিন্তু  
প্রকৃতপক্ষে ইহার নাম,—লঘুণ।

পলাশু ও লঘুণের আবাদ-প্রণালী প্রায় এক প্রকার। ইহার জন্ম  
মাটি উচ্চ ও হালকা হওয়া আবশ্যক। আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে অর্থাৎ  
বর্ষাকাল একবার উত্তীর্ণ হইলে ভূমিতে লঘুণ রোপণ করিতে হয়। পটির  
মধ্যে ৬-ইঞ্চি অন্তর শ্রেণী রচনা করিয়া তন্মধ্যে ৬-ইঞ্চি ব্যবধানে এক-একটি  
লঘুণের মূল পুতিয়া দিবে। পুতিবার সময় যেন মনে থাকে যে, উহার  
উপরিভাগ মৃত্তিকার উপরিভাগে কিঞ্চিন্মাত্র ভাসিয়া থাকে। যাবৎ অঙ্কু-  
রিত না হয় তাবৎ উহাতে জলসেচন করিবার কোন আবশ্যক হয় না।  
পাতা বাহির হইলে, মাটিতে রসের অবস্থা বুঝিয়া সপ্তাহে একবার  
বা দুইবার জলসেচন করিতে হইবে। সর্বদা গোড়ার মাটি নিড়ানী  
দ্বারা আলগা রাখিবে। ফাল্গুন মাসে গাছ সকল বিবর্ণ হইতে থাকে,  
তখন উহাতে আর জলসেচন করা বিধি নহে। ক্রমে ক্রমে সবুজ গাছ

শুকাইয়া আসিলে যত্নসহকারে উঠাইয়া রোদে ছই তিন দিন শুষ্ক করিবে।  
তদনন্তর পেঁয়াজের ছায় গৃহে রাখিয়া দিবে কিঞ্চি বিক্রয় করিবে।

## একাদশ অধ্যায়

### মটর বা কড়াই-শুঁটী (Pea)

কৃষকগণের ক্ষেতে সাধারণতঃ যে মটরের আবাদ হইয়া থাকে, তাহাতে দ্বিমল প্রস্তুত হয় এবং প্রাকৃত ভাষায় সে সকল মটরের সাধারণ নাম,—কড়াই বা কলাই। ইহা সমতল দেশ সকলের শীতকালের তরকারি। মটর অতি পুষ্টিকর খাদ্য। সমতল দেশে ইহা কার্তিক মাসে এবং হিমপ্রধান দেশে মাঘ-ফাল্গুনে বপনীয়। সব্জী-ক্ষেত্রে বা বাগানে যে সমুদয় উৎকৃষ্ট জাতীয় মটর জন্মে তাহাই তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। পূর্বে প্রকারের মটরের আবাদের কথা ‘কৃষিক্ষেত্রে বিবৃত হইয়াছে স্মরণঃ এহলে তৎসম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনার প্রয়োজন নাই। বিলাতী যত প্রকার মটর এদেশে আমদানী হইয়া থাকে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটা আমাদিগের বিশেষ পরীক্ষিত এবং তাহাদিগের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। ইহাদিগের আকার যেমন বৃহৎ, স্বাদও তেমনই মধুর। নিম্নলিখিত মটরের শুঁটি মধ্যে ৮৯টী হইতে ১০১১টী দানা থাকে।

(১) ব্লু-ইম্পিরিয়াল, (২) চ্যাম্পিয়ন অব-ইংলণ্ড, (৩) আমেরিকান ওয়াগার, (৪) ইম্প্রভড-রিংলিডার, (৫) ডোম্বার্ক-আলি  
(৬) ম্যাজটোন প্রকৃতি বয়েক জাতীয় মটর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইদানীং আরও অনেক প্রকার মটর উৎপন্ন হইয়াছে এবং বিদেশী বীজ উৎপাদক বা বীজ ব্যবসায়ীগণ কতকগুলি মটরকে নিজস্ব করিয়া লইয়া স্বতন্ত্র নামে অভিহিত করেন। বীজ ব্যবসায়ীদিগের তালিকায় তাহা স্ৰষ্টব্য।

ভাদ্র মাসের শেষ ভাগে যথানিয়মে ভূমি করিয়া ও মাটির ঢেলা ভাঙ্গিয়া জমি তৈয়ার করিতে হইবে। পরে, বর্ষা উত্তীর্ণ হইলেই কার্তিকের প্রথম হইতে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ভাগ মধ্যে বীজ বপন করিতে হইবে। বীজ বপনের পূর্বে চৌকার উত্তর-দক্ষিণে দড়ি ধরিয়া দেড় বা দুই হাত অন্তর ৪-ইঞ্চি গভীর জুলি করিবে। অনন্তর, সেই জুলি মধ্যে ৫১৬-অঙ্গুলি ব্যবধানে এক-একটি বীজ ফেলিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে। পরে ঘুরিয়া আসিয়া দেখিবে,—যদি কোন স্থানে ঘনভাবে বীজ পতিত হইয়া থাকে তাহা হইলে আবশ্যকমত দানা উঠাইয়া—যেস্থানে পাতলা ভাবে পড়িয়াছে—সেইখানে ফেলিয়া দিবে। বীজ পরস্পরের মধ্যে ৫১৬-অঙ্গুলির ব্যবধানই যথেষ্ট। অনন্তর জুলির পার্শ্বস্থিত মৃত্তিকা দ্বারা বীজ ঢাকিয়া ঈষৎ চাপিয়া দিবে। এক্ষণে যে স্থান কাটিয়া জুলি পূর্ণ করা গেল, তাহাকেই জুলি বলিয়া জানিতে হইবে। ভবিষ্যতে অর্থাৎ মটরের গাছ উদগত হইলে প্রত্যেক দুইটি জুলির উপরে কঞ্চি, পাট-কাটি কিম্বা ধুন্ধে-কাটি দ্বারা দো-চালাবৎ করিয়া দিতে হইবে। কাটিগুলি এমন-ভাবে রাখিতে হইবে যেন, জুলি লইতে হেলাভাবে উঠিয়া তাহাদিগের শেষাগ্রভাগ উপরে মিলিত হয়। লতিকা সকল যাহাতে অবলম্বন পায় তাহার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। লতিকা সকল বিজড়িত হইয়া পড়িলে ক্রিষা যথাযোগ্য অবলম্বন না পাইলে ফল ধারণে বিমুখ হয়।

বীজ বপন করিয়া উত্তমরূপে সার দিতে হয়। ইহার পক্ষে হুংস, কুকুট ও পারাবতের বিষ্ঠা বিশেষ উপকারী। যেখানে উল্লিখিত সারের



অভাব, তথায় গোয়ালঘরের আবর্জনা ও ছাই প্রশস্ত। চারা জন্মিলে আবশ্যকমত জলসেচন করিবে এবং সময়ে সময়ে মাটি খুঁড়িয়া দিবে। গাছ অতিশয় ঘন হইয়া জন্মিয়া থাকিলে, ঘনতা ভাঙ্গিয়া গাছ মধ্যাংশের আবশ্যক মততুলিয়া ফেলিয়া পাতলা করিয়া দিবে। চারা উদ্গত হইবার পর যাবৎ গাছে পুষ্প সমাগম না হয় তাবৎ কাল মধ্যে চারা সকলের পঁতিতে একবার বা দুইবার অস্থিচূর্ণ বা মাছের কাঁটা-ভিজান জল সেচন করিতে পারিল গাছগুলি বলিষ্ঠ ও তেজাল হয়, ফল বড় হয় এবং মিষ্ট হয়।

বীজ বপন করিবার পর যাবৎ অঙ্কুরিত না হয়, তাবৎকাল উহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করা আবশ্যক নতুবা পক্ষী বা মুষিকগণ মাটির ভিতর হইতে বীজ তুলিয়া খাইয়া যায়। বীজগুলিতে মেটে-সিন্দুর মাখাইয়া বপন করিলে কোন পোকা-মাকড় বা পক্ষীতে খাইয়া ফেলিতে পারে না। বীজে মেটে সিন্দুর মাখাইতে হইলে, মেটে সিন্দুরকে স্নাইট-অয়েলের সহিত গুলিতে হইবে। শুদনস্তর উহাতে বীজগুলি একবার উলট-পালট করিয়া লইলেই চলিবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কার্তিক মাসেই বীজ বপন করিতে হইবে। সকল বীজ কিন্তু একেবারে বপন না করিয়া পৌষ মাস পর্য্যন্ত ১৫।২০ দিবস অন্তর পর্য্যায়ক্রমে বপন করিলে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত ফসল পাওয়া যায়।

জাতিবিশেষের রোপণের কাল নির্দেশ অনুসারে মটর তিন ভাগে বা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা,—আগু (যাহারা অগ্রে ফল দান করে), অর্দ্ধাগু (যাহারা আগুর পরেই ফল প্রদান করে) এবং নামূল বা নাবী (যাহারা সর্বশেষে ফল প্রদান করে)। ঋতুর অবস্থানুসারে ইহার পালিত হইয়া স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্ত হইয়াছে, এই জন্য জাতিগত বিশেষত্ব অনুসারে ঋতুর অগ্রপষ্ঠাৎস্তে ইহাদিগকে রোপণ করিতে হইবে।

ওলগা-কড়াই নামে এক প্রকার কৌকড়ান ( Wrinkled ) মটর আছে। তাহার দানা ও খোসা—উভয়ই মিষ্ট। ওলগা শুটী খোসা সমেতই বাজনারদিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার আবাদে কোন জাফরি বা অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না, কারণ ওলগা লতিকাগুলি অধিক দীর্ঘ হয় না।

মটরগাছ, লতিকা-জাতীয় উদ্ভিদ। কোন কোন জাতির লতিকা ৩৪ হাত, কোন কোন জাতির ২৩ হাত, আবার কোন কোন জাতির লতিকা আধ হাত হইতে এক বা দেড় হাত দীর্ঘ হয়। জাতিগত বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, অবলম্বনের জন্ত বড় বা ছোট কাটির দ্বারা জাফরি করিয়া দিতে হয়। ছোট জাতির গাছ সম্মুখে, মধ্যমাকার জাতির গাছ মধ্য ভাগে এবং দীর্ঘ জাতির গাছ পশ্চাতে রাখিতে হয়। এই প্রণালীতে বীজ বুনিলে এক জাতির গাছ অপর জাতিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে না।

### টমেটো বা বিলাতী বেগুন ( Tomato )

চাষীগণ ইহাকে ‘তেমতি’ বা গোট-বেগুন কহে। ইয়ুরোপীয়গণের নিকট টমেটো অতি উপাদেয় তরকারী। বাঙ্গালীর ঘরে ইহার এখনও বিশেষ প্রতিপত্তি হয় নাই, তবে অনেকে ইহার সুন্দর ফল দেখিবার জন্ত স্ব স্ব বাগানে উৎপন্ন করিয়া থাকেন ইহা সুপক্ব হইলে অম্লাস্বাদ হইয়া থাকে। ইহার পাকা ফলে উত্তম চাটনি প্রস্তুত হয়। টমেটোর ফল গোলাকার এবং পরিপক্ব হইলে জাতি অনুসারে মনোহর সুবর্ণ বা হরিদ্রা বা লালবর্ণের হয়। অপরিপক্ব ফল বার্তাকুর ভায়ে ভাজিলে আহারে অম্লযুক্ত বেগুন ভাজা মন্দ লাগে না।

ভাদ্র মাসে ইহার বীজ বপন করিবার সময়। যথানিয়মে বীজ বপন করিয়া চারা উৎপন্ন করিবে এবং সেই চারাগুলি তিন চারি অঙ্গুলি উচ্চ হইলে সারবান্ জমিতে রোপণ করিতে হইবে। টমেটো ক্ষেত্রে ভেড়ীসার প্রশস্ত, তদভাবে গোয়ালবাড়ীর আবর্জনা। টমেটো গাছ অতিশয় কুতুক, অল্পদিনের মধ্যে অতিশয় শিকড়বিশিষ্ট হইয়া পড়ে, সুতরাং অল্প দিন মধ্যে ভূগর্ভ হইতে বহু সার আহরণ করিয়া লয়, এজন্য ইহার জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে সার দেওয়া উচিত।

টমেটো এতই বহুল পরিমাণে ফলিয়া থাকে যে, একটা দীর্ঘ পট থাকিলে একটা গৃহস্থের বিলক্ষণ চলিতে পারে কিন্তু বাহার খরচ অধিক তাঁহার পক্ষে চৌকায় টমেটো রোপণ করা উচিত। চৌকায় দুই হাত অন্তর গাছ বসাইতে হইবে। চারাগুলি মাটিতে সংলগ্ন হইলে এবং সমুচ্চ হইয়া উঠিলে গাছের ডগা কাটিয়া দিতে হয়। ডগা কাটিয়া দিলে মূল কাণ্ড হইতে শাখা-প্রশাখা উদ্গত হইয়া গাছ বিস্তৃত ও ঝাড়ান হইয়া পড়ে। দাঁড়া-গাছ অপেক্ষা ঝাড়ান বা প্রসারিত গাছে অধিক ফল ধারণ করে। এই জন্ত গাছের শিরাতাগ কাটিয়া দিতে হয় এবং তাহা হইলে উহা অচিরে শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট হইয়া পড়ে। টমেটো গাছ লতানিয়া নহে। ইহার শাখাপ্রশাখা নিতান্ত কোমল সুতরাং অধিক শাখা প্রশাখা নির্গত হইলে আর দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিতে না পারিয়া মৃত্তিকান্তিমুখী বা ভূমি সংলগ্ন হইয়া পড়ে। প্রত্যেক শাখা-প্রশাখা যত দীর্ঘ হইতে থাকে তত তাহাদিগকে দণ্ড বা যষ্টি দ্বারা বাধিয়া দিলে এক-একটা গাছ সুপ্রশস্ত হয় এবং ফলও প্রচুর জন্মে।

টমেটো গাছ টবে পালন করিলে যখন উহা ফল ধারণ করে তখন দেখিতে অতি সুন্দর হয়। টব অন্ততঃ ১২-ইঞ্চি হওয়া আবশ্যক। এত-ছদ্দেশে হাপোর হইতে চারা তুলিয়া যথানিয়মে টবে বসাইয়া পালন

করিতে হইবে এবং টবের উপরে বিস্তৃত জাকরি করিয়া দিতে হইবে। গাছ জাকরি হইতে উচ্চ হইয়া উঠিলে তাহার ডগা কাটয়া দেওয়া উচিত, কারণ তাহা হইলে মূলকাণ্ড হইতে শাখা-প্রশাখা উদ্ভূত হইয়া উপরিভাগ হইতে প্রসারিত হইয়া পড়িবে। প্রাচীর বা বেড়ার গাত্রে টমেটো গাছ নিয়ন্ত্রিত করিলে পার্শ্বদেশে অধিক স্থানের প্রয়োজন হয় না, তাহা ব্যতীত সেই সকল গাছ বেড়া বা প্রাচীর আবৃত করিয়া ফল ধারণ করিলে শোভার সামগ্রী হয়, ফল পাকিলে আরও মনোহর হয়। ইচ্ছা করিলে টমেটো গাছকে নানাপ্রকারে নিয়ন্ত্রিত করিতে পায়া যায়। এতদ্ভেদে যে চারা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা পরিপুষ্ট ও তেজাল হওয়া উচিত। চারাগুলি ৬ অঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ হইয়া উঠিলে নির্বাচিত গাছগুলিকে নির্দিষ্ট স্থানে ভূমিতে বা গামলায় সারাল মাটিতে রোপণ করিয়া পালন করিতে হইবে এবং গাছের মূলদেশে একটা, দুইটা বা তিনটা ৩৪ হাত দীর্ঘ অনতিস্থূল সরণ খুঁটি পুতিয়া সেই সকল খুঁটিতে এক-একটা কাণ্ডজাত শাখা বাঁধিয়া দিয়া সেই শাখাগুলিকে খুঁটিতে নিয়ন্ত্রিত করিলে মনোহর দেখায়। মূল কাণ্ডে অধিক শাখা-প্রশাখা জন্মিতে দেওয়া উচিত নহে।

যাহা ইউক, মধ্যে মধ্যে জলসেচন করা এবং জমি কোপাইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহার অত্র বিশেষ পাট নাই। গাছগুলি অতিরিক্ত তেজাল হইলে ফল বিদীর্ণ হইয়া যায়। তখন ক্ষেত্রে জল সেচনের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে কিম্বা গাছের কোন কোন স্থান ঈষৎ শারিত করিয়া দিলে চলিতে পারে।

টমেটো গাছের এক প্রকার রোগ আছে তাহাকে ওয়েদমা Edema রোগ কহে। রোগের লক্ষণ,—গাছের পাতা কুড়িয়া অর্থাৎ কৌকড়াইয়া যায়। চারা গাছে উক্ত রোগের আবির্ভাব হইলে তাহাকে মাটি হইতে

উঠাইয়া পরিষ্কারজলে গোড়ার সমুদায় মাটি উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, সাবানের জলে বা ঈষৎক্ষণ জলে ধৌতকরতঃ শিকড়গুলি অল্প ছাঁটিয়া দিতে হইবে। অতঃপর গাছের শাখাপ্রশাখাদিগকেও উত্তমরূপে উল্লিখিত প্রণালীতে ধৌত করিয়া এবং ডালপালা ছাঁটিয়া নূতন স্থানে রোপণ করা উচিত। ক্ষেত্রের মধ্যে বড় গাছে রোগ দেখা দিলে, তাহাকে একেবারে তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া ভাল।

মাছ মাংসের সহিত টমেটো সংযোজিত হইলে ব্যঞ্জনের স্বাদ অতি উপাদেয় হইয়া থাকে। টমেটো অতি স্থপাচক এবং মুখরোচক।

### গোল-আলু ( potato. )

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ক্ষেত হইতে ভাঙ্গাই ফসল উঠিয়া গেলে জমিতে উত্তমরূপে লাঙ্গল ও মই দিয়া খৈল সার, গোবর সার, ছাই প্রভৃতি দ্রব্য মিশাইয়া বারম্বার চাষ দিতে হয়। আলুর জমিতে যতই চাষ দিতে পারা যায়, ততই আবাদ লাভজনক হয়। হালকা বা বেলে মাটিতে ছাই সংযোজিত করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ঈদৃশ মাটির সহিত ছাই মিশ্রিত হইলে মাটির ঘনতা বা অঁট আরও শিথিল হইয়া যায়, মাটির জলধারণের শক্তি আরও হ্রাস পায়। এঁটেল বা কাঁচাল-ধরা মাটিতে ছাই সংযোজিত হইলে মাটি আল্গা ও ফাঁপা হইয়া থাকে ফলতঃ তাহার শোণ ও ধারকতা বৃদ্ধি পায়, তন্নিস্বকন উদ্ভিদেরও বিশেষ উপকার হয়।

অস্থিচূর্ণ আলুর পক্ষে বিশেষ উপকারী। এজন্ত বিধা প্রতি ২৩ মণ

অস্থিচূর্ণ সংযোজিত করিতে পারিলে ভাল হয় . বীজ বপনের অন্ততঃ ২।৩ মাস পূর্বে অস্থি চূর্ণ মাটির সহিত মিশাইয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয় কারণ উহা বিগলিত হইয়া মাটির সহিত মিশিতে না পারিলে গাছের কোন উপকারে আইসে না। বীজ বপনের সঙ্গে সঙ্গে অথবা বীজ বপনের ১০।১৫ দিন বা এক মাস পূর্বেও মাটিতে অস্থিচূর্ণ প্রদান করিলে, উহা বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের আহরণোপযোগী হইবার পূর্বেই আলুর বৃদ্ধিকাল প্রায় শেষ হইয়া যায়, সুতরাং এরূপ অবস্থায় সার প্রদানের কোন ফল হয় না। হাড়ের সূক্ষ্ম চূর্ণ ব্যবহার করিলে অপেক্ষাকৃত অল্পদিন মধ্যে উপকার পাওয়া যায়। খৈল বা গোবর-সার দিতে হইলেও বীজ বপনের সময়ে দেওয়া কোন মতে উচিত নহে, তাহা হইলে সার বিগলিত হইবার সঙ্গে বীজ আলুও উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং পচিয়া যায়। অধিকন্তু, বীজে অনেক পোকা আসিয়া সমুদায় বীজ ফলটা নষ্ট করিয়া ফেলে। এই জন্য অস্থিচূর্ণ দিতে হইলে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের মধ্যেই দিতে হইবে। ভাদ্র মাসের মধ্যে উক্ত সার ক্ষেত্রে প্রসারিত করতঃ জমি চষিয়া দিতে হইবে। মোট কথা,—মা ২ উত্তমরূপে চূর্ণ হইয়া মিশিয়া যাওয়া চাই।

কার্ত্তিক মাসের প্রথম ভাগে জমিতে আর একবার লাঙ্গল ও মই দিয়া মাটি সমতল করিতে হইবে। অতঃপর চৌকার প্রস্থ ভাগে, ছয় হাত অন্তর, ছয় অঙ্গুলি গভীর, জুলি রচনা করিতে হইবে এবং প্রতি দুই জুলির মধ্যবর্তী জমিতে প্রস্থভাগে ৪ হইতে ৬ তল গভীর জুলি খনন করিয়া উভয় পার্শ্বস্থ জুলির মধ্যে আদহাত হইতে পৌণে এক হাত অন্তর বীজ-আলু বসাইবে। খামার বা গৃহমধ্যে বীজ সুবরিত করিয়া জমিতে রোপণ করিলে অতি শীঘ্র 'কল' উদ্গত হয়। আলুক্ষেত্রে ১৫।২০ দিন অন্তর হেঁচ দিবে এবং ক্ষেত্রে যো পাইলে নীড়ান দ্বারা মাটি আলুগা করিয়া

দিবে, এবং কৃত্রাপি জল বা তৃণাদি জন্মিতে দিবে না। গাছের গোড়ায় মধ্যে মধ্যে মাটি তুলিয়া দিবে। ইহাকে ইংরাজিতে Earthing কহে।

পুরাতন অর্থাৎ পূর্ব বৎসরের আলু বীজের জন্ম ব্যবহৃত হয়। উক্তবীজ ক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত হইবার পর কয়েক মাস বিশ্রাম পাইয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে গৃহেই আলুর চোকগুলি মুখরিত হয়। কার্তিক মাসে বীজ-আলু পুতিবার উত্তম সময়। রোপণ করিবার পর এক সপ্তাহ হইতে দুই সপ্তাহ মধ্যে তাহা হইতে অঙ্কুর উদগত হয়। নূতন আলু রোপণ করিলে তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হইতে মাসাধিক কাল সময় লাগে, অনেক আলু তাৎকালিক মাটির রসালতা হেতু পচিয়া যাইবারও সম্ভাবনা। ঘরে বা ধামারে বীজ-আলু ‘মুকাইয়া’ উঠিলে ক্ষেত্রে রোপণ করিলে ভাল হয়। মুখাইবার জন্ম নীরোগ, স্থায়ী আলু বাছিয়া বিচালি-প্রসারিত স্থানে স্তপাকারে রাখিয়া স্তপের সর্বোপরি পুনরায় বিচালি দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। ধামা, চাক্কারি কিম্বা কেরোসিনের বাস্ম মধ্যে স্তরে স্তরে আলু ও খড় সজ্জিত করিয়া রাখিলেও ৮১৭ দিন মধ্যে বীজ আলু সকল ‘মুকাইয়া’ উঠে। বলা বাহুল্য যে, বীজ-আলুর রাশি মধ্যে দাগী বা পচা আলু একটাও না থাকে। এইরূপে ৮১০ দিন থাকিলে বীজ-আলু মুখাইয়া উঠিবে। তখন ক্ষেত্রে রোপণীয়।

খণ্ড খণ্ড আকারে বিভক্ত করিয়া বীজ-আলু রোপণের রীতি ও চলিত আছে। মধ্যমাকারের আলুকে খণ্ডিত না করিয়া পুরা-আলু রোপণ করা উচিত। এতদ্বারা বৃহদাকার বীজকে আকারানুসারে প্রত্যেককে ২৩ খণ্ডে বিভক্ত করিতে হয়। প্রত্যেক খণ্ডে অন্ততঃ ২টা উত্তম চোক থাকা উচিত। অতঃপর, সেই সকল খণ্ডাংশকে উদ্ভিজ্জ-ভস্মাক্রান্ত করিয়া ক্ষণকাল রাখিবার পর পূর্ববৎ স্তপাকারে ১০১২ দিন ঢাকিয়া রাখিলে সমুদায় খণ্ড মুখরিত হইয়া উঠে, তখন বখানিয়মে রোপণ করিতে হয়।

সাধারণতঃ চাবীগণ আবাদের অল্প অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ-আলু রোপণ করে। ঈদুশ বীজ হইতে যে সকল গাছ উৎপন্ন হয়, তৎসমুদায় তাদুশ তেজাল হয় না, তজ্জাত আলুও বড় হয় না, ফলতঃ তাদুশ লাভজনক হয় না, কিন্তু কৃষকের পক্ষে তাহা ক্ষতি-জনক না হইতে পারে, কারণ তাহা-দিগের আবাদ-খরচাও অকিঞ্চিৎকর।

বর্ষা অতীত হইলেও মাটি ভিজা থাকিতে বীজ রোপণের জন্য তাড়া-তাড়ি না করিয়া, বর্ষা উত্তীর্ণ হইবার পর ২০ সপ্তাহকাল অপেক্ষা করিয়া বীজ বপন করা শ্রেয়ঃ। ইতিমধ্যে আবাদের পূর্ববর্তী কাজ সকল শেষ করিয়া রাখা ভাল। কার্তিক মাসের প্রথম ভাগেই বর্ষা প্রায় শেষ হইয়া যায় এবং তখনই বাঙ্গলা দেশের রসা মাটিতে আলুরোপণের প্রশস্ত কাল। মাটি অতিশয় রসা থাকিলে কিম্বা বারিপাতেই সম্ভাবনা বুঝিলে ২০ সপ্তাহকাল বিলম্ব করিলে ক্ষতি নাই। উচ্চতর প্রদেশে অর্থাৎ বেহার বা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কার্তিক মাস মধ্যে বীজ-আলু অবশ্য রোপণীয়। পৌষ মাস হইতে গাছের গোড়া হইতে ২।৪টা আলু সংগ্রহ করিতে পারা যায় কিন্তু প্রয়োজন না থাকিলে তাহা না করাই ভাল। পৌষ মাসে বাজারে নূতন আলুর আবির্ভাব হয়, কিন্তু সে আলুর আকার তখন নিতান্ত ক্ষুদ্র থাকে, স্বাদও তাদুশ স্মৃতার হয় না। সৌখিনের নূতন-স্বের অনুরোধ সেই ক্ষুদ্র স্বাদবিহীন আলুর আদর হইতে পারে কিন্তু সাধারণের নিকট তাহা আদরণীয় নহে। যাবৎ গুণ্য সকল শুকাইয়া না যায় তাবৎকাল ফসল ক্ষেত্রে থাকিতে পাইলে আলু পরিপুষ্ট ও স্মৃতার হয় এবং জলীয় অংশ পরিপাক হইয়া সারবান্ হয়। পশ্চিমে বাতাস বহিতে থাকিলে আলুর গুণ্য সকল বিবর্ণ হইতে থাকে। ক্ষেত্রের সমুদায় গাছ একেবারে শুষ্ক হইয়া গেলে বঙ্গসহকারে আলু উঠাইতে হইবে এবং সংগৃ-হীত হইলে সমুদায় পচা বা দাগী আলু বাছিয়া ফেলিতে হইবে।



## . BOUILLE BORDELAISE\*

Sulphate of Copper	1 lb	( তুঁতে ) /॥•
Fresh slaked Lime	1 "	( টাটকা ) /॥•
Syrup	1 "	( চিনির রস ) /॥•
Water	5 Gallons.	( জল ) ৩• বোতল

উল্লিখিত মিশ্রণ দ্বারা ক্ষেত্রে পিচকারী করিলে কেবল যে পোকা নিবারিত হয় তাহা নহে, ক্ষুদ্র পিচকারী বা ঝাঁঝরা দ্বারা পনের দিবস অন্তর গাছে উহা সেচন করিলে আলুর আকার এবং ফসলের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। গাছের বৃদ্ধি সমাপ্ত হইলে পাতার উপরিভাগও নিম্ন ভাগ উক্ত মিশ্রণ দ্বারা উত্তমরূপে সিক্ত করিয়া দিতে হয়। প্রতি বিঘায় কিঞ্চিদধিক ২-গ্যালন মিশ্রণের আবশ্যক। আলু-ক্ষেত্রে উক্ত মিশ্রণ ব্যবহার করিলে আর একটি মহত্বপূর্ণ লাভ হয়, গাছগুলি অধিক দিবস জীবিত থাকে, তন্নিবন্ধন আলুর আকার পূর্ণ ও পরিপুষ্ট হয়। এখানে বিশেষ বক্তব্য এই যে, যে মিশ্রণের উল্লেখ করা গেল তাহার মধ্যে তুতে ও চুণের মাত্রা সামান্য অধিক হইলে বিশেষ অনিষ্ট হয়, অতএব অতি সাবধানে উক্ত মিশ্রণ প্রস্তুত করিতে হইবে।

অতি প্রাচীনকালে আলু, Battata নামে অভিহিত হইত এবং উক্ত শব্দ হইতেই আধুনিক Potato শব্দের উৎপত্তি। পেরু ও ভার্জিনিয়া দেশ—ইহার স্বাভাবিক উৎপত্তি স্থান।

নানকল্পে বিঘা প্রতি ৮০/০ মণ আলু উৎপন্ন হওয়া উচিত। সেই সময়ে আলুর মূল্য কম থাকে।

## বীন ( Bean )

বীন,—সিদ্ধীক বর্গীয় অধিক লতানে উদ্ভিদ। ইহার ফল সীমের  
 ত্রায়, কিন্তু প্রকৃতিগত পার্থক্যবিশিষ্ট। সীম ও বরবটীর ত্রায় ইহার সূঁটী  
 জন্মে এবং সেই সূঁটীর মধ্যে দানা থাকে। কচি অবস্থায় সমগ্র সূঁটী  
 বাজনা দিতে নিয়োজিত হয়, কিন্তু পাকিয়া গেলে সূঁটী হইতে দানা পৃথক  
 করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

সিদ্ধীক বর্গীয় তাবৎ ফসলের ত্রায় বীন অতি পুষ্টিকর তরকারি এবং  
 তাহার স্বাদও উপাদেয়। গ্রীষ্মাধিক সমতল দেশে শীতকালেই বীন  
 উৎপন্ন হয় কিন্তু হিমপ্রধান দেশে বসন্তকালে ইহার আবাদ হয়।

বীন লতিকাস্বভাব হইলেও ইহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—চওড়া সীম  
 ( Broad bean ), লতা-বীন ( Runner or Pole bean ) এবং গুল্ম  
 বা ঝোপ-বীন ( Bush or dwarf bean )।

প্রথম-বীন।—এই জাতীয় বীন-গাছ গুল্মসদৃশ, আধ-হাত হইতে  
 পৌনে-এক হাত উচ্চ হয় এবং ঝাড়াল হয়। ফলনে বেশী বিলম্ব হয় না।  
 জাতি অনুসারে বীজ বপনের পর ৩০ দিন হইতে ৪০।৫০ দিন মধ্যে ব্যব-  
 হারোপযোগী সূঁটী প্রদান করে। পটী বা চৌকায় দেড় হাত অন্তর  
 ভাসা জুলির মধ্যে আধ হাত ব্যবধানে দুই অঙ্গুলি মাটির মধ্যে এক-একটি  
 বীজ পুতিয়া দিতে হয়। ইহাপেক্ষা ঘন করিয়া বীজ পুতিলে ঘনতাবশতঃ  
 গুল্ম সকল চারি দিকে প্রসারিত হইতে পারে না, সূতরাং আশানুরূপ  
 ফলন্ত হয় না। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা ৫।৬ অঙ্গুলি উচ্চ হইয়া উঠিলে  
 উভয় শ্রেণীর মধ্যবর্তী স্থানের মাটি দ্বারা জুলি পূর্ণ করিয়া দিলে ভাল  
 হয়।

পূর্বাহ্নে ৬ ইঞ্চ গভীর এবং ৪।৫ ইঞ্চ চওড়া জুলি খনন করিয়া সেই  
 জুলি মধ্যে পুরাতন খুরা আবর্জনা প্রদান পূর্বক তন্মধ্যে বীজবপন করিতে

হইবে। এতদ্ব্যতীত অবলম্বিত হইলে গাছ সকল তেজাল, ঝাড়াল ও ফলন্ত হয়।

**কান্টো বা পোল্ল বীন।**—পূর্বেই বলিয়াছি, ইহারা লতা-নিয়া কিন্তু ফেঁকড়ি সকল ৪।৫ হাতের অধিক দীর্ঘ হয় না। ইহাদিগের জন্ত ৩ ফুট অন্তর খালায়, ৫।৬ হাত দীর্ঘ খুঁটি—দৃঢ়রূপে পুতিয়া দিবে এবং প্রত্যেক খালায় ২টি বীজ পুতিয়া দিতে হইবে। চারা গাছে ৬।৭টি পত্র উদ্গাত হইলে উৎকৃষ্ট চারাটি রাখিয়া অল্প চারা উৎপাদিত করিয়া ফেলিবে। চারাগুলির ডগা ১ হাত দীর্ঘ হইলে খুঁটিতে সংলগ্ন করিয়া দিতে হয়। প্রবল বাতাসে গাছ ভুগায়ী হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকিলে দীর্ঘ বেড়া কিংবা জাকারি নির্মাণ করিয়া দিলে ভাল হয়। সমগ্র মহীশূর রাজ্যে, বিশেষতঃ মহীশূর ও বাঙ্গালোর সহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামে প্রচুর পরিমাণে গুল্ম-বীনের আবাদ হয়। বর্ষাকালেও তথায় যথেষ্ট বীন পাওয়া যায়। বাঙ্গালোর সহরে প্রচুর বীন জন্মে,—এই জন্ত উক্ত সহরের নাম বাঙ্গালোর হইয়াছে।

### আর্টিচোক ( Artichoke. )

চাষীগণ ইহাকে হাতিচোক কহিয়া থাকে। হাতিচোক দুই প্রকার,—এক জাতীয় গাছের মাথায় যে ফল হয় তাহাই খাদ্য; অপর জাতির ভূগর্ভে গাছের গোড়ায় আদ্রক বা হরিদ্রার ন্যায় মূল জন্মে। উক্ত মূল সকলই খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রথমোক্ত জাতিকে গ্লোব (Globe) আর্টিচোক, এবং শেষোক্ত প্রকারকে জেরুজিলাম (Jerusalem) আর্টিচোক কহে। প্রথমে গ্লোব আর্টিচোকের কথা বলা যাউক।

**ক্লেমাস।**—শ্রাবণ মাসের ১৫ই তারিখ হইতে আশ্বিন মাসের ১৫ই পর্যন্ত বীজ বপন করিবার সময়। গাম্ভীর্য বা বাদ্দের বীজ বপন করিয়া

চারাগুলি ৫।৬ অঙ্গুলি বড় হইলে জমিতে পুতিয়া দিতে হয়। ক্ষেত্র মধ্যে দুই হাত অন্তর এক একটি বড় বড় গর্ত খনন করিয়া তাহাতে উত্তমরূপে গোয়ালের বা আস্তাবলের আবর্জনা দিরা মাটির সহিত সেই সার মিশাইয়া চারা রোপণ করিতে হয়। চারাগুলি যাবৎ না সবল হইয়া উঠে তাবৎকাল তাহাদিগকে প্রথর রৌদ্রের উত্তাপের সময় ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। সপ্তাহে একবার করিয়া উত্তমরূপে জলসেচন করা আবশ্যক এবং তৎসঙ্গে গাছের গোড়া কোপাইয়া মাটি আলাগা করিয়া দেওয়া উচিত। অতিরিক্ত গরম পড়িলে সপ্তাহে দুই তিন বার জল দিতে পারিলে ভাল হয়। যে স্থানে বর্ষার জল দাঁড়ায় অথবা যে স্থান নিত্যন্ত ঠাণ্ডা, এরূপ স্থানে ইহা রোপণ করা বিধি নহে। হালুকা, দোয়াশ ও গভীর মৃত্তিকায়ুক্ত স্থানই ইহার পক্ষে প্রশস্ত। গাছে ফুল আসিবার উপক্রম দেখা গেলে, মধ্যে মধ্যে গোড়ায় তরল-সার দিলে ফল বড় হয় ও সুপুষ্ট হয়। উক্ত ফল ছুঁকে সুসিদ্ধ করিয়া তাহার ভিতরের শস্ত ভক্ষণ করিতে হয়।

জেরুজিলাম।—আমেরিকার উত্তর প্রদেশে হইার স্বাভাবিক জন্মভূমি। তথায় অতি প্রাচীন কাল হইতেই জেরুজিলাম আর্টিচোকের ব্যবহার করিত। Battatas-de-Cannada নামে ইংলণ্ডে উহা ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে আনীত হয়। জেরুজিলাম নাম দেখিয়া অনেকে স্বভাবতঃ ইহাকে জেরুজিলামের সামগ্রী মনে করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। ইটালি ভাষায় Girasola শব্দের অপভ্রংশ Jerusalam শব্দের উৎপত্তি। ‘জিরাশোলা’ শব্দের অর্থ সূর্য্যামুখী হওয়া।

পূর্বেই বলিয়াছি ইহার মূল আর্জেন্টিনা বা হরিসার স্থায় গোর্ড জন্মে এবং তাহারই আহাৰ্য্য। স্বাভাবিক মূল বর্ধিত হইতে পারে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এক্ষণে জমির পতীর চাষ এবং মাটি হালুকা হওয়া প্রয়োজন।

জমিতে মাঘ মাসে উত্তমরূপে সার দিয়া ও মাটি চূর্ণ করিয়া ফাল্গুন মাস মধ্যে ক্ষেত্রে মূল রোপণ করিতে হয়। ক্ষেত্রে ২১০ ফুট অন্তর শ্রেণী করিয়া তন্মধ্যে ১-ফুট ব্যবধান, তিন ইঞ্চি মাটির মধ্যে বীজ-গেঁড় পুতিতে হয়। ১০।১২ দিনের মধ্যেই মূল ভেদ করিয়া আঁকোড় উদগত হইয়া থাকে। কিন্তু, উক্ত সময়ের মধ্যে আঁকোড় নয়নগোচর না হইলে উহাতে একবার জলসেচন করিতে হইবে। কল উদগত হইবার পর হইতে যাবৎ বর্ষা সমাগত না হয় তাবৎকাল মধ্যে মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জলসেচন করিতে হইবে। গাছগুলি এক ফুট উচ্চ হইলে (আলুগাছের জায়) ইহার গড়ায় মাটি তুলিয়া দিতে হইবে। সর্বদা গাছের গোড়া বাহাতে আলু ও পরিষ্কার থাকে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের মধ্যে মূল ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে, কিন্তু পৌষ মাস শেষ হইবার পূর্বে মূল পরিপুষ্ট হয় না। সুপুষ্ট হইয়া উঠিলে ভূমি হইতে মূলগুলিকে উৎপাটিত করিয়া শুষ্ক বালি মধ্যে রাখিয়া দিলে উহার সুগন্ধ অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। যদি উক্ত জমি অবিলম্বেই অথবা কোন ফসলের জন্ত প্রয়োজন না হয় অথবা এই ফসলের সমুদায় ফলই একেবারে উঠাইবার প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে মূলগুলিকে ভূগর্ভ মধ্যে থাকিতে দেওয়া উচিত, আবশ্যক মত উঠাইয়া লইলেই চলিবে।

জেরাজিলাম আটিচোকের মূল অতি পুষ্টিকর খাদ্য এবং ইহার সৌরভ অতীব মনোহর। যে স্থানে আলু উৎপন্ন হয় না কিম্বা হইতে পারে না, তথায় ইহার প্রচলন করার লাভ আছে। অনেকের মনে,—ইহার প্রচুর আবাদ থাকিলে দ্রুতকালে উক্ত মূল দ্বারা বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। ইহার আবাদ উত্তরোত্তর বাহাতে দেশমধ্যে বিস্তৃত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত।

## বর্জাকু ( Brinjal or Egg-plant, )

বর্জাকুর আবাদ সমধিক লাভজনক। ইহা এতই অধিক পরিমাণে কলিয়া থাকে যে, নির্দিষ্ট সংখ্যক গাছ থাকলেই একটা গৃহস্থের আর সৰ্ব্বসর বেগুণ ক্রয় করিতে হয় না। যে গৃহস্থের কিছুও জমি আছে, তিনি নিজ পরিবারের ব্যবহারের জন্য একখণ্ড এক-কাঠা জমির চৌকা রাখিলে বার মাস বেগুণ পাইতে পারেন।

জাতি-বিশেষ বেগুণের বীজ ভিন্ন ভিন্ন মাসে বপন করিতে হয়। সূত্রাং সৰ্ব্বসরে ৩৪ বার বীজ বুনিতো পারা যায়। ভাঁটাতে বীজ ‘পাত’ দেওয়া হইয়া থাকে।

বীজ নীচ নীচ অঙ্কুরিত করিতে হইলে বপন করিবার পূর্বে রাত্রিতে উহাকে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। সমস্ত রাত্রি ভিজিয়া বীজগুলি ফুলিয়া উঠিবে। পরে উহাকে জল হইতে উঠাইয়া কণকালের জন্য ছায়াতে প্রসারিত করিয়া দিলে উহার গাত্রস্থিত সমুদয় জল পরিশোধিত বা পরিশুদ্ধ হইয়া যাইবে।

শীতকালের বেগুণ স্বভাবতঃই কোমল স্মৃষ্টি ও বৃহদাকারের হইয়া থাকে। দেশী বেগুণের মধ্যে ‘মুক্তকেশী সর্ক্যাপেকা উৎকৃষ্ট এবং প্রকৃষ্ট প্রণালীতে আবাদ করিতে পারিলে প্রতি বিঘা ভূমি হইতে স্থান কল্পে ১০০ হইতে ৪০০ টাকার ফসল পাওয়া যায়।

ছয় সেরা বেগুণ লইয়া যে আজ কাল হৈ-চৈ গড়িয়া গিয়াছে তাহা মুক্তকেশীর প্রকারান্তর ভিন্ন আর কিছু নহে। আমি পুনঃ পুনঃ আবাদ করিয়া মুক্তকেশী হইতে ইহার কোন প্রভেদ দেখিতে পাই নাই। তবে মুক্তকেশী মার্কিন দেশে গিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। মুক্তকেশী বেগুণ আমার দেশে তিন সেরার উপর বড় হইয়াছিল।

বৃহদাকার বেগুণ অতিমধুর, কিন্তু বেশী বড় হইতে দিলে ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে, কারণ শস্ত ও বীজ পাকিয়া যায়, কোমলতা নষ্ট হয়, উপরন্তু গাছের ফল হ্রাস পায়। ইহার বৃহদাকার ফলের প্রতি লক্ষ্য রাখেন ওঁহাদের পক্ষে তাহা শোভনীয় কিন্তু ব্যবহারোপযোগী বার্তাকে উৎপন্ন করিতে হইলে মধ্যমাকারের হইলেই সংগ্রহ করা উচিত।

বেগুণ বারোমাসই উৎপন্ন হইয়া থাকে কিন্তু একই গাছ বার মাস ফল দান করে না। ভিন্ন জাতির বেগুণ ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে উৎপন্ন হয়। ঋতুভেদে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার সাধারণত জাতিতে বিভক্ত।

শীতের বেগুণ বীজ জৈষ্ঠ্য মাসে, গ্রীষ্মের বেগুণ অশ্বিন কুলি বেগুণের বীজ অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে এবং আউসে বীজ ফাল্গুন-চৈত্র বা বৈশাখে বপন করিতে হয়।

বেগুণ চারার গোড়ায় অনেক সময় লোণা লাগিয়া থাকে। ফলতঃ সেই সকল গাছ গোড়া ভাঙিয়া পড়িয়া যায়। লোনার লক্ষণ দেখা গেলে ভাঁটির চারিদিকে দুই অঙ্গুলি উচ্চ মাটির আলু বাধিয়া উত্তম ও প্রচুর-রূপে জলসেচন করিতে হইবে এবং মাটি একেবারে শুষ্ক হইলেই ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে লবণ কুটিয়া থাকে কিন্তু জল থাকিলে তাহার ভারে লবণ আর মৃত্তিকার উপরিভাগে উঠিতে পারে না। তেঁতুলের বা খইলের জল দিলেও লবণ নষ্ট হইয়া থাকে। চুণের জলে লবণ কাটিয়া যায় সত্য, কিন্তু চুণের সংস্পর্শে চারাগাছ মরিয়া যাইতেও পারে, সুতরাং তাহা ব্যবহার করা নিরাপদ নহে। ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, অতিরিক্ত জলসেচনের কলে সর্দি সংক্রামিত না হয়।

চারাগুলি ২।৩ অঙ্গুলি বড় হইলে, ‘পাত’ বা বীজতলা হইতে চারাকে হানাতর করিবার জন্য হাসপোরে ৩৪ অঙ্গুলি ব্যবধানে চারাগুলিকে রোপণ করিতে হইবে। স্বতঃসি চারাগুলি ৮।১৭ অঙ্গুলি বড় না হয়, ততদিন

মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে এক-একবার স্থানান্তর করা উচিত। এইরূপে ২৩ বার স্থানান্তর করিতে পারিলে গাছগুলি তেজাল ও স্বস্তী হয়। চারাগুলি ৫৬টা পাতাবিশিষ্ট হইলে ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে বসাইতে হইবে। নিতান্ত শৈশবাবস্থায় একবারে ক্ষেত্রে পুতিয়া দিলে প্রত্যেকের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত সে অবস্থায় ইহারা নিজের অভাব নিজে মোচন করিতে সক্ষম হয় না।

ক্ষেতে চারা বসাইবার পক্ষে সায়ংকালই উত্তম সময়। অপরাহ্নে ক্ষেত্রে চারা বসাইলে ভাঁটা বা হাপোর হইতে উৎপাটিত হওয়ায় উহাদিগের যে কষ্ট অনুভূত হয় সমস্ত রাত্রির শীতল বাতাসে তাহার অনেক লাঘব হয় কিন্তু দিবাভাগে উৎপাটিত ও রোপিত হইলে কষ্টের লাঘব না হইয়া বরং আলোক ও রৌদ্রের উত্তাপে গাছগুলি অধিক ক্ষমাইয়া পড়ে। সুতরাং অপরাহ্নে চারা স্থানান্তর করাই সুবিধাজনক। ভাঁটা হইতে গাছগুলি অতি যত্নসহকারে উঠাইতে হয়।

যে জমিতে গাছ বসাইতে হইবে, তাহা অন্ততঃ ১০১৫ দিবস পূর্বে প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত। জমি অন্ন হইলে বারবার কোদাল দ্বারা কোপাইয়া মাটি ঠিক করিতে হইবে। ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হইলে লাঙ্গলাদি দ্বারা তৈয়ার করিয়া রাখিতে হয়। তদনন্তর ক্ষেত্রের উত্তর-দক্ষিণে দুই হাত ব্যবধানে সরল রেখা টানিয়া তাহার পার্শ্বদেশ হইতে মাটি তুলিয়া দাঁড়া তৈয়ার করা আবশ্যক। আপাততঃ ছয় অঙ্গুলি উচ্চ দাঁড়া হইলেই চলিবে। উক্ত দাঁড়ার উপর প্রতি দুই হাত হইতে আড়াই হাত ব্যবধানে এক একটা চারা যত্ন সহকারে পুতিবে, পুতিবার নিয়ম এই যে, উহার গোড়া হইতে ২৩ অঙ্গুলি কাণ্ডের উপর পর্যন্ত মাটির ভিতর ডুবাইয়া দেওয়া অর্থাৎ কাণ্ডের নিম্নভাগ ভূপৃষ্ঠের উপরে না আগিয়া থাকে, কারণ তাহা হইলে নররোপিত চারাগুলি ভুশায়ী হইয়া পড়ে। গাছগুলি পুতিয়া



দিবার পর তাহাতে অন্ন অন্ন জলসেচন করা উচিত এবং যে পর্যন্ত না চারাগুলি সতেজ হয়। প্রতিদিন অপরাহ্নে সূর্যোস্তাপে প্রশমিত হইলে গাছের উপরিতাগে অর্থাৎ শিরাদেশে জল দিতে হইবে। এইরূপ জল-সেচন গাছের গোড়ায় না হইলেও চলে, কিন্তু গাছের কাণ্ড ও পাতা-গুলিতে সেই জল পতিত হওয়া চাই। ইহাকে গাছের স্নান কহে। এইরূপে স্নান করাইলে গাছগুলি স্নিগ্ধ হয় এবং অন্নদিন মধ্যে সবল হইয়া উঠে। জমিতে রোপণ করিবার পূর্বে বা পরে চারাগুলির ডগা ভাঙ্গিয়া দিবে।

ক্ষেতে চারা পুতিবার দেড় মাস বা দুই মাস পরে অর্থাৎ গাছগুলি এক হাত পরিমাণ উচ্চ হইলে ক্ষেতে অতিশয় সাবধানে একবায় লাজল দিলে ভাল হয়। এই সময়ে হলচালনা করিতে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক নতুবা হলচালনাকালে লাজনের ইচ্ছা কালের অথবা বন্দলের আঘাতে অনেক গাছের গোড়া অবধি উৎপাটিত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা এবং অনেক সময় ডালপালা ভাঙ্গিয়া যায়। তবুও ইহাতে বিশেষ উপকার হয়, গাছগুলি পরে ঝাড়বিশিষ্ট হয়। ক্ষেত্রে গাছ পুতিবার পরে বাহারী তথায় আর লাজল চালাইতে ভরসা না করেন, তাহাদের পক্ষে কোদাল দ্বারা জমি কোপাইয়া মাটি চূর্ণ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। জমিতে কোপান দিবার সময় গাছের গোড়ায় মাটি দিতে হইবে। অতঃপর আবশ্যক বোধ হইলে মধ্যে মধ্যে জমি কোপাইয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে।

বেগুনের ক্ষেতে জল হেঁচ দিবার প্রথা প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু বালুকাগর্ভ, মীরগ ও টান মাটিতে প্রয়োজন হইয়া নির্দিষ্ট কাল ব্যবধানে হেঁচ দিতে পারিলে ভাল হয়। উৎকৃষ্ট বাটির রস ছুসুর্ভের অনেক নিরে অবস্থান করে তন্নিবন্ধন অন্নকালজীবী উদ্ভিদগণ সে রসের দ্বারা উপকার

লাভ করিতে পারে না। নিম্ন বাজলার এবং নাৰাল জমিতে প্রায় জল-সেচনের প্রয়োজন হয় না। শীত বা গ্রীষ্মের ফসলে ২০।২৫ দিন অন্তর হেঁচ দিলে ভাল হয়। ইহাতে যে কেবল গাছের ত্রিবৃদ্ধি হয় তাহা নহে, ফলের আকারও অপেক্ষাকৃত বড় হয় এবং শাঁস মধুর ও কোমল হয়।

মৃত্তিকার ইতরবিশেষানুসারে বেগুণের স্বাদেরও তারতম্য হইয়া থাকে সতেজ ও সারবান জমির ফলে যেরূপ সুমিষ্ট আবাদ হয়, নিম্নেজ জমির ফলে সেরূপ হয় না। নিম্নে ভূমির গাছ তাদৃশ বাড়াল হয় না তাহার ফলন অধিক হয় না, ফলের আকার বড় হয় না, উপরন্তু ফলের ছাল খুল হয় ফলতঃ বীজ অধিক হয়।

আচট্ জমি যেমন বেগুণের পক্ষে উপযোগী, পুরাতন ভিটামাটিও তদনুরূপ। আবার যে জমিতে মাটির সহিত পুরাতন রাবিস বা চূণ-জ্বরকী মিশ্রিত থাকে তাহাও বড় উর্বরা এবং সে জমিতে যে বেগুণ জন্মে, তাহাও বৃহৎ এবং সুমিষ্ট হয়। সকল ক্ষেতেই ভিটা মাটি বা রাবিস পাওয়া যায় না, তবে যদি সন্নিহিতে কোন পতিত স্থানে ঐরূপ মাটি বা গুঁড়া রাবিস পাওয়া যায়, তাহা হইলে উহা আনিয়া প্রত্যেক গাছের গোড়ায় ২।১ মুষ্টি দিলে উপকার হইতে পারে।

বেগুণ গাছে সময়ে সময়ে পোকাকার আবির্ভাব হয়। পোকা নিবারণের জন্য প্রাচীন নিয়মানুসারে ছকার জল বা ছাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু এতদুভয়ের দ্বারা যদি কোন উপকার না পাওয়া যায় তাহা হইলে ‘লন্ডন-পার্পল’ (London purple) নামক এক প্রকার যে বিলাতী ঔষধ আছে, তাহা দ্বারা উপকার হইতে পারে। ২।৫টা গাছে যদি পোকা লাগে তাহা হইলে তাহাদিগের রোগ নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা সেন্তলিক উৎপাটিত করিয়া অগ্নিতে দহ করা

উচিত নতুবা সেই সকল কীট ও তৎপ্রযত ডিমরাশি ফুটিয়া অন্তান্ত গাছকে আক্রমণ করিতে পারে।

বেগুন সাধারণতঃ খেত ও লালাভ কৃষ্ণবর্ণের দেখা যায়। খেত অপেক্ষা শেযোক্ত প্রকারের বেগুন অধিক আদরণীয়। মসির্বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বেগুনের মধ্যে মুক্তকেশী বেগুনই উৎকৃষ্ট। মুক্তকেশী বেগুন এক একটা ১২।০ বা ১২ সের হইয়া থাকে। ফলেব আকার বৃহৎ করিতে হইলে ফলের সংখ্য হ্রাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয় এবং সেজন্য প্রত্যেক গাছে নির্দিষ্ট সংখ্যক ফল রাখিয়া অপরগুলিকে কচি অবস্থায় ভাঙ্গিয়া দিতে হয়।

বহু জাতীয় সুমিষ্ট ও সুপষ্ট বেগুন শীতকালেই জন্মে। ইহাদিগের বীজ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে 'পাত' দিতে হয়। চারাগুলি কিছু বড় হইলে অর্থাৎ ৪।৫টা পাতাবিশিষ্ট হইলে স্থানান্তর করিয়া দ্বিতীয় হাপোরে কিছুদিন লালনপালন করা আবশ্যক। পরে ৬।৭টি পাতা জন্মিলে ভাদ্র-মাসে ক্ষেতে বসাইবে। অন্তান্ত পাটের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ইহাতে আশ্বিন মাসেই ফল ধরিবার সুত্রপাত হয়।

লম্বা ও সরু জাতীয় এক প্রকার বেগুন হয়, তাহাকে কুলি-বেগুন কহে। কুলি-বেগুন ৬-৮ইঞ্চি হইতে প্রায় ১২ ফুট বা এক হাত দীর্ঘ পর্য্যন্ত হয়। ইহার বিস্তার ফল হয়।

ফলের বর্ণ, আকার ও কোন্ মাসে কোন জাতীয় বেগুন ভালরূপ জন্মে এবং প্রত্যেক জাতির আশ্বাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্বতন্ত্রভাবে যদি বীজ সংরক্ষণ করিতে পারা যায়, এবং প্রযত্নকর বিভিন্ন জাতির যদি নামকরণ করা যায়, তাহা হইলে অতি অল্পদিন—৩।৪ বৎসর মধ্যেই আমরা নানা-জাতির বেগুন উৎপন্ন করিতে পারি। সৌধিনগণ ও বীজ ব্যবসায়ীগণ এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে এ কার্য অতি সহজে সুসিদ্ধ হইতে পারে।

কালীগঙ্গা, কিরীটেশ্বরী, মুক্তকেশী, রাম-বেণুগ, রাক্ষ-বৌ প্রভৃতি কয়েক জাতীয় বার্তাকুর প্রচলন আছে। মুক্তকেশী ২৪-পরগণার সামগ্রী। মুরসিদাবাদের কালীগঙ্গা ও কিরীটেশ্বরীর ফল দ্রব্য লক্ষা এবং ঘোর বেণুগী, রক্তের প্রায় মসিবর্ণের জ্বায় এবং তাহাতে বীজের পরিমাণ অতি কম থাকে। রাক্ষ-বৌ গ্রন্থকার দ্বারা দ্বারভাঙ্গায় উৎপন্ন হইয়াছিল। শুনিতে পাই এক্ষণে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে।

বেণুগগাছে এক প্রকার পতঙ্গ জাতীয় কীট জন্মে। ডিম্বাবস্থায় বর্ণ সবুজ থাকে এবং পতঙ্গাবস্থা প্রাপ্ত হইলে সেই সকল কীটের বর্ণ ফিকে হইয়া যায়। ক্রমে সেই পতঙ্গ পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহার মস্তক মসিবর্ণ প্রাপ্ত হয়। উহার ৫টি পা ও ২টি শৃঙ আছে। উক্ত কীট অতি সাংক্রামিক। একবার একটা গাছে জন্মিলে নিকটস্থ অপর সকল গাছেই বিস্তৃত হইয়া সমূহ ক্ষতি করে। উক্ত কীট সকল গাছের পাতার নিম্নভাগে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাশি রাশি ডিম্ব প্রসব করে। গাছের পাতার নিম্নভাগ কুঞ্চিত হইলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহা কীটাক্রান্ত হইয়াছে। উক্ত কীটগু এই ক্ষুদ্র এবং উহাদিগের গতি এতই মৃদু যে, উহাদিগকে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না এবং ইহারা যে জীবিত প্রাণী তাহাও সহজে উপলব্ধি হয় না। ১৩০৩ সালে গ্রন্থকারের অধিনায় কয়েকটা গাছে কীটের আবির্ভাব হইয়াছিল। অনুভবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে তাহাদিগের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। উক্ত কীটের কয়েকটা যাহুঘরে (ইণ্ডিয়ান-মিউসিয়মে) পরীক্ষার্থ পাঠান হইলে তথাকার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ডাক্তার এণ্ডারসন সাহেব পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, ইহা এফিস (Aphis) জাতীয় একিডিডে (Aphidid) নামক পতঙ্গ। ইতিপূর্বে ইহাকে কৃষির শত্রুরূপে কখনও জানা ছিল না। ইহার আক্রমণ হইতে আক্রান্ত গাছদিগকে রক্ষা করিবার জন্য গাছে

কীর্ণভেজ বা ফিকে 'কেরোসিন ইমলসন' ছড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক।\*\*

গাছে উক্ত পোকা দেখা বাইলে, অবিলম্বে সেই অংশটা গাছ হইতে ভাঙ্গিয়া একবারে নষ্ট করিয়া ফেলা আবশ্যক নতুবা হই এক দিবস মধ্যে উহার স্থানীয় সমুদায় গাছকে আক্রমণ করিবে, তখন গাছ কাটিয়া ফেলা ভিন্ন কার্য্যতঃ কোন উপায় থাকে না। বিলম্ব করিলে পোকা সকল গাছের কুল আক্রমণ করিয়া গাছে ফলজন্মিতে দেয় না। তীব্র হকার জল দিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাতে পোকা বিনষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার পোকার দ্বারা বেগুণ গাছ সময়ে সময়ে আক্রান্ত হয়। শিবপুর আদর্শ-কৃষিক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়ক স্বর্গীয় নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেন যে 'এচিয়া মেলিসার্টি' ( *Achoea Melicerti* ) নামক পোকা দিবাভাগে মাটির মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া রাত্রিকালে গাছের কচিকচি পাতা খায় কিন্তু ভাল করিয়া চাষ করিলে তাহা জন্মিতে পারে না। তামাক ও লবণের জলে এই পোকার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া বাইতে পারে। দ্বিতীয় জাতীয় এফিলেচিয়া তিনিনসিওক্টো পঙ্কেটেটা ( *Aphillachia Vigintiocto punctata* ) কীটাবহায় বেগুণের পাতা খায় এবং পতলাবহায় বেগুণ গাছের পোকা খায়। ইহার দ্বারা উপকার ও অপকার দুইই হয়। প্রথম জাতীয় পোকা *Achoea Melicerti* কীটাবহায় দেখিতে প্রায় রেশম কীটের ত্রায়। দ্বিতীয় জাতীয় *Aphillachia Vigintiocto punctata* পোকাবহায় সবুজ

---

\* "The insects.... are plant lice ( *Aphididae* ) belonging to the genus *Aphis*."

"This insect has not hitherto been reported as pest to agriculture. I would recommend that spraying the plant with a weak solution of Kerosine Emulsion would be the best plan to get rid of the pest."

রন্ধের ঢাকা-ঢাকা; অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকার। পতঙ্গাবস্থায় প্রথম জাতীয় পোকা প্রজাপতিরূপ ধারণ করে, কিন্তু যে পোকা দ্বারা গাছের অধিক ক্ষতি হয়, তাহা ডালের মধ্যে থাকিয়া গাছের শীস খায়। কীটদষ্ট শাখা বা ডগাগুলি ভাঙ্গিয়া পোড়ান ভিন্ন উপায় দেখি না। ডালে ও পাতায় বিষ ছিটাইয়াও দেখিয়াছি উক্ত পোকায় উপদ্রব কয়ে নাই। উহা (*Diatrope saccharalis*) পতঙ্গাবস্থায় ক্ষুদ্রকার প্রজাপতির স্তায় থাকে। উক্ত প্রজাপতি গাছের ডালে ডিম দিয়া যায় এবং সেই ডিম প্রস্ফুটিত হইলে যে কীট উৎপন্ন হয় তাহারা ডালের মধ্যে ছিদ্র করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে।

মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে সন্ধ্যার পর জঞ্জাল পোড়াইয়া ধোঁয়া দিতে পারিলে পোকা মাকড়ের উপদ্রব কমিয়া যায়। আলোক দেখিয়া অনেক পতঙ্গ উড়িয়া আসিয়া অগ্নিতে বাঁপ দেয় ফলতঃ তাহাদিগের দৌরাশ্ব হাস হয়।

### বাঁকলা ( Field Bean )\*

বাঁকলার শুষ্ক দানা বজ্রবৎ কঠিন স্তূতরাং বপন করিবার পূর্বে দানা-গুলিকে জৈবদ্রব্য জলে কেলিয়া দিবে এবং তদবস্থায় ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া দিবার পর বপন করিতে হইবে।

বাঁকলা গাছ দেড় হইতে দুই হাত উচ্চ হইয়া থাকে। ইহার ফল ছোট ছোট মটর গুটির স্তায়। ফল অতি পুষ্টিকর এবং অর্দ্ধপুষ্টাবস্থায় ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহৃত হইবার উপযোগী। পাকিয়া গেলে দানা কঠিন হইয়া যায়, তখন মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাস বীজ বপন করিবার সময়।

---

\* গ্রন্থকার লিখিত "Field Beans as Fodder" নামক প্রবন্ধ।  
Indian Agriculturist, May 5, 1894.

অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগ হইতে গাছে ফুল ধরে এবং চৈত্র মাসের শেষ অবধি ফল হইয়া থাকে। গরম বাতাস পড়িলেই গাছ মরিয়া যায়। কচি অবস্থাতেই উহার শুঁটী তরকারীতে ব্যবহার করিতে হয়, ফল পাকিলে দানাসমূহ কঠিন হইয়া যায়, তখন আর তরকারীতে ব্যবহার চলে না। বীজ চূর্ণ করিয়া গাভীদিগকে খাইতে দিলে উহারা দুগ্ধবতী হয়। বাকুলার গাছও গাভীগণ আগ্রহ সহকারে খাইয়া থাকে। ফল সকল অর্ধ পরিপক হইলে ফলসমেত গাছ কাটিয়া খাওয়াইলে গাভীগণ অধিক পরিমাণে এবং ঘন দুগ্ধ প্রদান করে।

### বিলাতী বাকলা ( Broad Bean )

বিলাতী-বাকুলার গাছ দেখিতে প্রায় দেশী-বাকুলার আয় কিন্তু বিলাতী বাকুলার পাতা অপেক্ষাকৃত বড় ও চওড়া হয়। ইহার ফল ও বীজ বড় ও চেন্তা হয়।

শালগম, গাজর প্রভৃতির আয় চৌকায়, এক বা দেড় হাত অন্তর এক-একটা বীজ বপন করিতে হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইতে ১০।১২ দিন সময় লাগে কিন্তু ১০।১২ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রোপণ করিলে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। মাটিতে রসের অবস্থা বুঝিয়া সপ্তাহে একদিন, কি ছুই দিন জসসেচন করা আবশ্যক। কার্তিক মাস বীজ বপনের সময়। পৌষ মাস হইতে গাছে ফল ধরিতে থাকে। কচি অবস্থায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করা উচিত।

### মুলা ( Radish )

মুলার জাতি, স্থানীয় জলবায়ুর অগ্রপশ্চাৎ অনুসারে এবং ফসলবিশেষের ক্ষুদ্র বুঝিয়া প্রায় বারোমাস বীজ বপন করা বাইতে পারে। বারোমাস ফসলের সবরবাহ রাখিতে হইলে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস হইতে প্রতি মাসে

দুইবার বীজ বপন করা উচিত। কার্তিক মাসের পূর্বে বিলাতী বীজ বপন করা উচিত নহে।

মুলা,—কল জাতীয় উদ্ভিদ সুতরাং তাহার জন্ম হাল্কা দোয়াশ মাটি প্রেমন্ত। মাটি কঠিন হইলে কোমল মূল মাটি ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না এবং পার্শ্বস্থিত মাটির কঠিনতাবশতঃ মূলা সকল বিকৃতাকার ও কঠিন হয়।

বিলাতী-মুলা।—সাধারণতঃ ইহার দুইটা জাতি দেখা যায়। এক জাতীয়—লম্বা, এবং অল্প জাতীয়—গোল। প্রথম জাতীয় মুলার জন্ম মৃত্তিকা ঈষৎ গভীর করিয়া কোপাইয়া চূর্ণ করিতে হয়। মূলক্ষেতের মাটি ষতই হাল্কা ও চূর্ণ হইবে, মূলা তত কোমল ও বড় হয়। গোল জাতীয় মুলার জন্ম ছয় ইঞ্চি গভীর মাটি হইলেই চলিতে পারে। গোল জাতীয় মূলাকে এণ্ড-মূলা কহে। যে জাতীয় মুলারই আবাদ করা বাউক, জমির উত্তম পাট হওয়া উচিত। ক্ষেতে যেন কোন মতে ইষ্টক, খোলা, চোলা কিম্বা তৃণাদি জঙ্গলের শিকড় না থাকে। এই সকল জঞ্জাল সাধ্যমত বাছিয়া ফেলিতে হইবে।

গোয়াল-ঘরের গোবর ও চোনাবিশিষ্ট জঞ্জাল দ্বারা মুলার বিশেষ উপকার হয়। প্রতি চৌকায় বিশেষ পরিমাণে গো-শালার জঞ্জাল বিস্তৃত করিয়া মাটির সহিত বারবার উলট-পালট করতঃ কর্ষিত মাটি সমতল করণান্তর এক টুকরা কাঠ দ্বারা মাটি ঈষৎ চাপিয়া দেওয়া উচিত।

মূলা বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বীজ বনিবার পূর্বে চৌকায় মাটি নিয়মেশের এক ইঞ্চি পরিমাণ উন্মাইয়া বা খুঁড়িয়া দিবার পর বীজ বপন করিতে হইবে। মুলার ঝায় ক্ষুদ্র বীজ বুনিতে গেলে সকল স্থানে সমভাবে পতিত না হইয়া কোথাও ঘনভাবে, কোথাও পাতলা ভাবে পতিত হয়, কিন্তু বীজের সহিত ৪।৫ গুণ মাটি মিশাইয়া লইলে অনেকটা সমভাবে



ছড়াইয়া পড়ে। দীর্ঘকাল ক্ষেতে থাকিলে মূল্যের আকার বড় হয় কিন্তু স্বাদ তাদৃশ মিষ্ট থাকে না, উপরন্তু কঠিন ও ছিবড়া হইয়া যায়। এইজন্য আকার অপেক্ষা কোমলতার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। বিলাতী মূলা দীর্ঘকাল জমিতে থাকে না। বীজ বপনের দিন হইতে ২০ দিন হইতে ৩০।৩৫ দিন মধ্যে খাজাপযোগী হইয়া থাকে। বিলাতী মূলা,—তরকারী অপেক্ষা কাঁচা অবস্থায় স্বাদ মধুর।

**দেশী-মূলা।**—দেশী মূল্যেরও কয়েকটা জাতি আছে, যথা শিক্ড়ে, বর্ষাতি, আউসে ও পোষে। প্রথমোক্ত জাতি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে, বর্ষাতি-মূলা আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত, আউসে মূলা কার্তিক-অগ্রহায়ণে, এবং পোষে মূলা পৌষ-মাঘ মাসে উৎপন্ন হয়, কিন্তু শীতের অর্থাৎ আউসে এবং পোষে মূলা সর্বাপেক্ষা বড় হয়। এসময়ের আবাদযোগ্য মূলা, মেদিনীপুর, কাঁথি ও পাটনা জাতীয়। মেদিনীপুর ও কাঁথির মূল্যের আকার বড় হয়, সুস্বাদও বটে, কিন্তু পাটনাই মূল্যের আকার তাদৃশ বৃহৎ না হইলেও স্বাদ অপেক্ষাকৃত উপাদেয়।

গ্রীষ্মের মূল্যের বীজ,—চৈত্র মাসে, বর্ষাতি মূল্যের বীজ,—জ্যৈষ্ঠ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত; আউসে মূল্যের বীজ,—আশ্বিন ও কার্তিক মাসে, এবং পোষে মূল্যের বীজ,—কার্তিক মাসে বপন করিতে হয়। শিক্ড়ে মূল্যের ক্ষেতে যথেষ্ট পরিমাণে জলসেচন করিতে হয়। এসময়ে রৌদ্র প্রখর ও মাটি নীরস বলিয়া গাছ বাড়িতে পারে না। এইজন্য পটির উপর এক হাত উচ্চে অনতিদূর মাচান কিম্বা খড়ের আচ্ছাদন করিয়া দিলে ভাস হয়। এতদর্থে নারিকেল পাতা, খেজুর পাতা, দরমা, হোগলা, কিম্বা উলু প্রভৃতি ব্যবহার করা চলিতে পারে। এসময়ে মূল্যের আকার বড় হয় না কিন্তু যে তরকারিতে উহা ব্যবহৃত হয়, তাহার স্বাদ অতি উপাদেয় হয়, এইজন্য ইহার আবাদ সুহীন।

যে পট্টে বা যে ক্ষানে বর্ষাতি-মূল্য আবাদ করিতে হইবে, সে স্থান সাধারণ জমি হইতে স্বল্প উচ্চ হওয়া উচিত কারণ তাহা হইলে বর্ষাকালে তথায় আদৌ জল সঞ্চিত হইতে পারে না। জমিতে জল সঞ্চিত হইলে মাটি দৃঢ় হইয়া যায় ফলতঃ মূল্য বাড়িতে পারে না।

আউসে ও পোষে মূল্য আবাদকালে অতিরোদ্র বা অতিরুষ্টির সম্ভবনা নাই, তাহা ব্যতীত এ সময় যথেষ্ট শিশিরপাত হয়। এই সকল কারণে জলসেচনের তত প্রয়োজন হয় না।

মূল্য জমি প্রচুর সার প্রত্যাশা করে। মাটি যত সারবান হইবে, তত শীঘ্র মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। শীঘ্র-বৃদ্ধিই ইহার কোমলতা, সুস্বাদ, সুস্বাদের কারণ। সকল প্রকার মূল্য জন্ত মাটি সারাল ও বুয়া হওয়া চাই।

ইহার জায় যে সকল তরকারী অল্পদিনের মধ্যেই আহারোপযোগী হয়, তাহাতে সস্তা বা টাটকা ও হর্গন্ধযুক্ত সার দিলে ফসলের স্বাদ নষ্ট হয়। অতএব পুরাতন সার প্রদান করাই সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

— — —

### জালসিফি ( Salsify )

গাজর, বীট প্রভৃতির জায় ইহা এক প্রকার কন্দ জাতীয় আনাঙ্গ। এদেশে এখনও ইহার বিশেষ আদর হয় নাই, সুতরাং সমধিক পরিমাণে আবাদ হয় না। শীতের ব্যবহারোপযোগী কপি প্রভৃতির জায় ইহারও বীজ প্রাধান্য হইতে অগ্নি মাস মধ্যে ভাটিতে বপন করিতে হয়। পরে চারা-গুলি প্রায় তিন অঙ্গুলি পরিমাণ বড় হইলে চোকায় ১-ইঞ্চি অর্থাৎ প্রায় আধ হাত অন্তর, হই তিন অঙ্গুলি গভীর মাটির মধ্যে পুতিয়া দিতে হয়। মাটি খুব বুয়া ও সারবান হওয়া আবশ্যিক। ইহার কন্দ পার্শ্বদেশে

যেমন বর্ধিত হয়, তৃগুর্ভ মধ্যেও প্রায় ১২।১৪ ইঞ্চি প্রবেশ করে, স্তূতরাং ইহার অন্ত মাটি সমধিক গভীর, সারাল ও আলগা হওয়া উচিত। সময়ে সময়ে নিড়ানী ও জলসেচন করা ভিন্ন হইার অপর কিছু পাট নাই।

কন্দ আহারের উপযোগী হইলে ভূমি হইতে তুলিয়া পাতা ছাঁটিয়া কোন আবৃত স্থানে বালির মধ্যে রাখিয়া দিলে অনেক দিন থাকিতে পারে এবং প্রয়োজনমত বাহির করিয়া লইতে হয়।

### পারস্নিপ ( Parsnip )

গাজরের স্থায় ইহা এক প্রকার কন্দ-জাতীয় তরকারী। ইহার আবাদ অতি অল্পই দেখা যায়। পারস্নিপ ছই প্রকারের দেখা যায়। এক প্রকারের মূল কন্দ লম্বা দেশী মূলা বা গাজরের স্থায়। অন্য প্রকারের মূল,—গোল শালগমের স্থায়।

সারবান, গভীর ও শুকবিত জমিতে ইহা ভাল জন্মে। মাটির সহিত উত্তম গোবর-সার বা গোয়াল বাড়ীর আবর্জনা মিশ্রিত করিলে ভাল হয়। মাটিতে চিল বা কাঁকর থাকিলে বাহিয়া কেলিতে হইবে। আশ্বিন মাসে বীজ বপন করিবার সময়।

উল্লিখিত প্রণালীতে পটির জমি প্রস্তুত হইলে তন্মধ্যে পৌনে এক হাত ব্যবধানে শ্রেণী নির্দেশ করতঃ মাটির ভিতরে এক ইঞ্চি নিম্নে পাতলা করিয়া বীজ বপন করিয়া মাটি ঢাকা দিতে হইবে। সময়ে সময়ে জলসেচন করিতে হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা জন্মিলে অতি সাবধানে নিষ্কণ করিয়া দিতে হইবে। চারাগুলি ছই-তিন অঙ্গুলি উচ্চ হইলে, যদি ঘন-ভাবে জন্মিয়া থাকে বোধ হয়, তাহা হইলে পটি পাতলা করিয়া দেওয়া উচিত। চারা পরস্পরের মধ্যে ৯-ইঞ্চি অর্থাৎ আধহাত স্থান রাখিলেই

চলিবে। সপ্তাহে একবার জলসেচন এবং আরম্ভকমত নিড়ান করাভিন্ন বিশেষ কোন পরিচর্যা নাই।

### মোরী ( Anise )

হিন্দী ভাষায় মোরী—সোঁক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা তরিতরকারি মধ্যে পরিগণিত না হইলেও আমাষিগের গৃহস্থালীতে মোরীর যথেষ্ট ব্যবহার আছে, সুতরাং আদর আছে। ব্যঞ্জন রন্ধনে, তাড়ুল ব্যবহারে মোরী যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মোরীর গন্ধ ও স্বাদ অতি মৃদু ও মধুর। মোরী হইতে এক প্রকার সুরা প্রস্তুত হয়।

প্রয়োজনানুরূপ আবাদের জন্ম বড় বা ছোট হাণ্ডারে কিম্বা চৌকাষ বীজ ছড়াইয়া চারা উৎপন্ন করিতে হয়। কার্তিক মাসই বীজ বপনের সময়। বীজ বপনের চৌকা বা হাণ্ডারের মাটি উত্তমরূপে তৈয়ার করিয়া বীজ বুনিতে হইবে। ৫৬ দিনের মধ্যে চারা উদ্গত হয়। এক্ষণে জল সেচন করা উচিত। চারাগুলি স্থানান্তরিত হইবার ষোণ্য হইলে অর্থাৎ ৪৫ অঙ্গুলি দীর্ঘ হইয়া উঠিলে চৌকা মধ্যে এক হাত ব্যবধানে শ্রেণীর মধ্যে এক হাত অন্তর চারা নাড়িয়া পুতিতে হইবে। রোপণকার্য্য অপরাহ্নে করা উচিত। রোপণের পর প্রথমাবস্থায় প্রাতঃকালে জ্বৈৰ জল সেচন করিতে হইবে। অতঃপর মধ্যে মধ্যে জমি নিষ্কৃণ করা ভিন্ন অপর কোন পরিচর্যা নাই; কিন্তু মাটিতে রস না থাকিলে মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিতে হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। পৌষ-মাঘ মাসে গাছে শীষ উদ্গত হয় এবং তাহাতে ফুল, ক্রমে ফলের সমাগম হয়। এই সকল ফলই—মোরী। চৈত্র-বৈশাখ মাসে মোরী সকল পাকিয়া উঠে। তখন ডগা কাটিয়া আনিয়া বাড়িয়া-বাড়িয়া জুলিতে হইবে।

### শুল্কা শাক ( Dill )

শুল্কা-শাকের হিন্দী নাম,—সোয়া। নানাবিধ তরকারী সুবাসিত করিবার জন্য ইহার শাক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনভ্যস্ত ব্যক্তিদিগের নিকট ইহার গন্ধ প্রথম-প্রথম তীব্র বোধ হয়।

বধানিয়মে জমি তৈয়ার করিয়া কার্তিক মাসে হাপোরে বীজ ছড়াইয়া চারা উৎপন্ন করিতে হয়। চারাগুলি ৩৫ অঙ্গুলি পরিমাণ বড় হইলে পাট বা চোকা মধ্যে এক হাত অন্তর শ্রেণী মধ্যে তিন পোয়া হইতে এক হাত অন্তর একটা একটা চারা রোপণ করিতে হয়। সময়ে সময়ে জল সেচন ও পটি নিষ্কাশন করা ভিন্ন বিশেষ কোন পাট নাই। ইহার বীজও মসলারূপে ব্যবহৃত হয়। বীজ পাকিলে ডগ্গা কাটিয়া আনিয়া মোরির মত মাড়িয়া-মাড়িয়া তুলিতে হয়।

পার্বত্য শীতপ্রধান দেশে ফাল্গুন হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত বীজ বপনের সময়।

### কালজীরা ( Nigila Small Fennel )

ভারতবর্ষে কালজীরা বহুকালাবধি জন্মিতেছে কিন্তু কোন কোন সাহেবদিগের মতে ইহা মিশর ও ইউরোপের দক্ষিণাংশের গাছ।

ইহা শুল্কা শাকের ভ্রাতা, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কিছু বক্তব্য নাই। কালজীরে এদেশী সাধারণ তরকারীতে অতি অল্প ব্যবহৃত হয়।

### বেতুয়া বা বেতো শাক ( Chenopod um )

বেতুয়া শীতকালে জন্মিয়া থাকে। ছোট ছোট কেয়ারি বা চৌকায় কার্তিক মাসে পাতলাভাবে বীজ ছিটাইয়া দিবে। মধ্যে মধ্যে জলসেচন

আবশ্যক। গাছ বাড়িলেই কাটিয়া ব্যবহার করা উচিত। বেতুয়া শাক বড় কোমল ও সুস্বাদু। কবিরাজী শাস্ত্রমতে উহা নানাবিধ ঔষধের কার্য্য করে। ইহা দেশী শাক,—সুতরাং ইহার বীজ অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বর্গভেদে ইহার দুইটি জাতি আছে। এক জাতির গাছ সম্পূর্ণ সবুজ বর্ণের; অপর জাতির পাতার বোঁটা ও শিরা বেগুণী রঙ্গের। উভয় প্রকারই ব্যবহার্য্য।

### পালঙ (Beta Bengaliensis)

নানাবিধ শাকের মধ্যে পালঙ অত্যন্তম। পালঙের পাতা স্থূল, কোমল ও রসাল। ভাতে, সিদ্ধ, ষণ্ট, ভাজা ও চচ্চড়ীরূপে ভক্ষণীয়। ইহা অতি মিষ্ট ও উপাদেয় তরকারী।

পালঙ শাক শীতকালের তরকারী হইলেও বারোমাসই উৎপন্ন করিতে পারা যায়; কিন্তু শীতের পালঙ বড় এবং ঝাড়াল হয়। এ সময়ের আবাদে তত অধিক জনসেচনের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু গ্রীষ্মকালের ফসলে প্রচুর পরিমাণে জলসেচন করা প্রয়োজন।

পালঙের বর্গভেদে দুইটি জাতি আছে,—লাল ও সাদা বা সবুজ। শেষোক্ত পালঙের গাছ বৃদ্ধিশীল। পত্রসমূহ অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার ও স্থূল।

বারোমাস বোগান রাখিতে হইলে কয়েকটি স্বতন্ত্র পটি রাখিতে হয় এবং প্রতি মাসে এক-এক পটিতে বীজ বুনিতে হয়।

চারি উৎপাদনের দুইটি-নিয়ম আছে, ১ম,—পটি মধ্যে স্থায়ীরূপে বীজ বপন; ২য়,—হাস্যেতে বীজ বপনপূর্বক চারা উৎপন্ন করিয়া স্থানান্তরে নির্দিষ্ট আঁতর ব্যবধান চারা-রোপন।

হাপোরের এবং পটির মাটি সাঁরাল ও শিরাদার বা দানাদার ( fibrous ) এবং ৮।১০ ইঞ্চি গভীর ও ফাঁপা বা আলুগা হওয়া উচিত। পটি উত্তমরূপে কুন্দালিত করণান্তর মাটির সহিত গোয়ালের আবর্জনা সংযোজিত করিয়া মাটি চূর্ণ করিতে হইবে এবং সার ও মাটি উত্তমরূপে মিশ্রাল করিয়া ঈষৎ চাপিয়া দিতে হইবে।

শীতের ফসলের জন্ত আশ্বিনের শেষভাগ হইতে কার্তিকের শেষ ভাগ পর্যন্ত বীজ বপন করিতে পারা যায়। বারমাস যোগানের জন্ত প্রতি মাসে বা এক মাস অন্তর বীজ বপন করা উচিত।

পটিতে বীজ ছড়াইয়া না দিয়া আধ হাত অন্তর শ্রেণীতে ৭।৮ অঙ্গুল ব্যবধানে ২-৩ গভীর মাটির মধ্যে এক একটা বীজ পুতিয়া মাটি চাপা দিবে, অবশেষে মাটি ঈষৎ চাপিয়া দিবে। মাটি নীরস হইলে বীজ বপনের পূর্বদিন পটিতে উত্তমরূপে জলসেচন করিয়া রাখা উচিত, কারণ মাটিতে রস থাকিলে বীজসকল শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। বপনের পর ৬।৭ দিবসের মধ্যে বীজ মুখ্যরিত ও অঙ্কুরিত হয়।

হাপোরে চারা উৎপন্ন করিতে হইলে হাপোরের মধ্যে বীজ ছড়াইয়া রাখানিয়ম বীজ-বপনকার্য্য সমাধা করিতে হইবে। ৪।৫টা পত্র উদগত হইলে পটি মধ্যে পূর্বকথিত নিয়মানুসারে চারাগুলি রোপণ করিতে হইবে।

অতঃপর প্রয়োজনমত মধ্যে মধ্যে জলসেচন করা এবং মাটি উন্মোচন করিয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন পরিচর্যা নাই।

পালঙ্কের পাতা, কোমল ডাঁটা ও শীষ, অবশেষে গোড়া, ভুগুণায়। গাছের পাতাগুলি বড় হইয়া উঠিলে গোড়ার এক অঙ্গুল উপর হইতে কাটিয়া লইতে হয়। মাটি সাঁরবান্ এবং রসাল হইলে ২০।২৫ দিন অন্তর পাতা ও ডগা সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

## চুকা-পালঙ্ (Sorrel)

ইহার স্বাদ অম্লাক্ত। শীতকালেই ইহা জন্মিয়া থাকে এবং পালঙ্ শাকের ভায় আবাদের নিয়ম। আশ্বিন মাসের শেষভাগে হাৎপারে বীজ পাত দিয়া চারা উৎপন্ন করিতে হয়। বীজগুলিকে ২-অঙ্গুলি অন্তর অঙ্কাজুলি গভীর মাটির মধ্যে পুতিয়া দিয়া মাটি চাপা দিতে হইবে এবং মাটি সমতল করিয়া দিয়া হস্ত দ্বারা সমগ্র স্থানটী জেবৎ চাপিয়া দিতে হইবে। বপনের পর ৫১৬ দিন মধ্যে চারা উপগত হয়। অতঃপর মধ্যে মধ্যে জলসেচন করিলে ১৫।২০ দিনের মধ্যে চারাগুলি স্থানান্তর-করণের উপযোগী হইয়া উঠে। চারাগাছ ৩-অঙ্গুলি পরিমাণ বড় হইয়া উঠিলে চোকা বা পটীতে দীর্ঘ ও প্রস্থে এক হাত অন্তর স্থায়ীভাবে রোপণ করিয়া অম্লধিক জল সেচন করিতে হইবে। চুকাপালং অম্লান্নাদমুক্ত, ইহার পত্র ও কচি ডগা মধ্যে মধ্যে সংগ্রহ করিয়া রন্ধন করিতে হয়।

## বরবটী (Lobeya)

বরবটী,—সুটিজাতীয় অতি সুখাদ্য ও পুষ্টিকর তরকারী। কার্তিক মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কচি বরবটী তরকারীতে ব্যবহার করিতে হয়। সুপক্ক দানায় দ্বিদল বা ডাল সহিত হইয়া থাকে।

বাগানের সাধারণ মাটিতে ইহা জন্মিয়া থাকে। আষাঢ় মাসে ক্ষেত তৈরী করিয়া শ্রাবণ মাসে চোকামধ্যে বীজ ছিটাইয়া ফেলিতে হয়। ইহার পাঁছ লতানিয়া হইয়া থাকে। ঘনভাবে জন্মিলে কলন বেশী হয়, এজন্য চারা জন্মিলে ঘন স্থান হইতে চারা তুলিয়া পাতলা করিয়া দেয়া উচিত। কার্তিক মাস হইতে পাছে ফল জন্মিতে থাকে তখন



প্রতিদিন ফল তুলিতে হয়। অনাবশ্যক ক্ষেত্রে গাছেই ফল থাকিতে দেওয়া উচিত। গাছ যখন মরিতে আরম্ভ করিবে, তখন সমুদায় ফল সংগ্রহ করতঃ রোদ্রে শুষ্ক করিয়া গৃহমধ্যে রাখিয়া প্রয়োজনমত ব্যবহার করিতে হয়। বরবটার দাল কিয়ৎকাল জলে ভিজিগেই নরম হইয়া থাকে। তখন উহা কাঁচা খাইতে অথবা তরকারীতে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

### সীম ( Lab-lab or Sheem )

দেশী সীমের মধ্যে আন্তাপাতি, সাদা, বাধনখা, স্বত-কাখন, শুড়ল প্রভৃতি কয়টি প্রধান। সীম শীতকালে জন্মিয়া থাকে।

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ক্ষেত্রমধ্যে স্থানে স্থানে মাদা তৈয়ার করিয়া বীজ বপন করিতে হয়। বপন করিবার পূর্বে চব্বিশ ঘণ্টাকাল বীজ-গুলিকে জলে ভিজাইয়া রাখা কর্তব্য। অনন্তর প্রত্যেক মাদায় ২৩টা, সুপুষ্ট বীজ পুতিয়া দিতে হয়। চারাগুলি বড় হইয়া উঠিলে উপরে মাচা তৈয়ার করিয়া দেওয়া আবশ্যক। মাচার উপরে গাছ উঠিলে বিস্তার ফল হয় এইজন্য পল্লীগ্রামে গৃহস্থগণ ছাদের উপরে বা ঘরের চালে উঠাইয়া দিয়া থাকেন। কার্তিক মাস হইতে ইহা প্রচুর পরিমাণে ফল প্রদান করে। শীতাবসানে যদিও গাছ মরে না তথাপি উহা কাটিয়া ফেলা উচিত, কারণ দ্বিতীয় বৎসর উহাতে তাদৃশ অধিক বা ভাল ফল হয় না।

### মাখন-সীম ( Butter-bean or Jack-bean )

মাখন-সীমের দুইটা জাতি আছে। সীমের দানার বর্ণভেদে জাতিভেদ হইয়াছে। প্রথম জাতির মধ্যে এক জাতির দানা শুভ্র বর্ণের, এবং

অপর জাতিঁর দানা গোলাপী বা লালবর্ণের। প্রথমোক্ত সীমের নাম—  
 খেত বা সাদা মাখন-সীম এবং লাল বা গোলাপী দানাদার সীমের নাম—  
 লাল মাখন-সীম। ইহাদিগের আবাদ প্রণালী মধ্যে কোন প্রভেদ  
 নাই।

মাখন-সীম অতি সুমিষ্ট সীম, কিন্তু অধিক দিন গাছে থাকিলে এতই  
 কঠিন হইয়া যায় যে, অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে, সুতরাং কচি থাকিতে  
 ব্যবহার করা উচিত।

মাখন-সীম অতি বৃহৎ লতা। ইহার ফল অস্বাভাবিক একহাত দীর্ঘ  
 হয়, কিন্তু অত দীর্ঘ হইতে দিলে ফলন বেশী হয় না, উপরন্তু বাহা  
 জন্মে তাহাও কোমল ও খাণ্ডোপযোগী থাকে না। গাছের গোড়ায় তরল  
 সার দিলে পর্যাপ্ত ফলন হয় এবং ফলও কোমল হয়। চৈত্র-বৈশাখ  
 মাস বীজ বপনের সময়। মাখন-সীমের লতা সুদীর্ঘ, বিস্তৃত, গুরুভার।  
 ইহার জন্ত দৃঢ় ও উচ্চ মাচান করিয়া দিতে হয় কিম্বা প্রাচীর বা বেড়ায়  
 নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিলে চলে।

### চারকোণা-সীম (Goa Bean)

কামরাজ্য সদৃশ পলবিশিষ্ট চারকোণা ফল বলিয়া ইহাকে চারকোণা  
 সীম কহে। ফল প্রায় ৩৪ অঙ্গুলী দীর্ঘ হয় এবং আন্বাদ প্রায় ফরাস-  
 বীনের (french bean) জায়। আবাদ-প্রাণে বীজ বুনিতে হয়।  
 সীমের জায় ইহার পাট করিলেই চলিবে।

## স্কোয়াশ ( Squash )

স্কোয়াস বিলাতী কুমড়ারই জাতিবশেষ মাত্র, কিন্তু ইহার গোড়ার অংশ অপেক্ষাকৃত সরু বা সূচাল হয়। কুমড়া ও স্কোয়াস মধ্যে প্রভেদ এই মাত্র। স্কোয়াসের হিন্দী নাম,—বিলাতী কহু। ইহা এক প্রকার ছোট জাতীয় বিলাতী কুমড়া এবং সুখাদ্য তরকারী। সমতল দেশে আশ্বিন-কার্তিক মাসে, উত্তর পশ্চিমে ফাল্গুনের শেষভাগে, বীজ বপন করিতে হয়। ক্ষেত্রমধ্যে ৫৬ হাত অন্তর ১-হাত ব্যাসের মাদা প্রস্তুত করিতে হয়। মাদাগুলি এক হাত গভীর খনন করতঃ তন্মধ্যস্থিত মাটির সহিত উত্তমরূপে সার মিশাইয়া বীজ বপন করা উচিত। সাররূপে গবাদি পশুশালার আবর্জনা প্রশস্ত। বীজ অঙ্কুরিত হইলে যথাৱীতি জলসেচন করিবে। ছয়-সাত দিনের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। চারাগুলিতে পাঁচ-ছয়টি পাতা উদ্গত হইলে প্রত্যেক মাদার উপরে কঞ্চি বা অল্প কোন পালা দিতে হয়। ইহার গাছ লতিকা, অধিক বড় হয় না,—ছয়-সাত হাত হইলেই যথেষ্ট হইল।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং শৈত্য-প্রদেশে শীতের প্রকোপ বেশী বলিয়া তথায় শীতকালে না করিয়া গ্রীষ্মকালে আবাদ করিতে হয়। সে সকল দেশে মাঘ মাসের শেষ হইতে ফাল্গুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত বীজ বপন করা উচিত।

গাছের প্রকৃতি অনুসারে স্কোয়াস দুই ভাগে বিভক্ত যথা,—‘বুস’ (busl:) বা বোপ এবং লতানিয়া। ‘বুস’ জাতির গাছ ছোট ছোট বোপের-ভায়ে হয়, আর অল্প জাতি লতাইয়া যায়। প্রথমোক্ত জাতির জন্ম দীর্ঘ ও প্রস্থে তিন ফুট স্থান দিলেই চলে। শেষোক্ত প্রকারের জন্ম দীর্ঘে ও প্রস্থে ছয় হাত স্থান দিতে হইবে। স্থান বিশেষের গুণে এই জাতীয়

ফ্লোরাসের লতিকা সুদীর্ঘ ও প্রসারিণী হয়। সেরূপ স্থলে অবলম্বনের জন্ত মাচা বা জাফরি কিছা বেড়া নির্মাণ করা আবশ্যক।

মহীশূর রাজ্যে ফ্লোরাসের প্রভূত আবাদ হইয়া থাকে এবং বাজারে বারোমাসই ফ্লোরাস আমদানী হয়। জলবায়ুর বিশেষত্বহেতু সেখানে বারোমাস ফ্লোরাস জন্মে। আমি বর্ষাকালে তথায় চারি মাসকাল ছিলাম—এবং প্রতিদিন ব্যঞ্জনাদিতে ফ্লোরাস ব্যবহার করিতাম। সেখানে ফ্লোরাস গাছের বিশেষ বহু করিতে হয় না অথচ গাছগুলি লাউ, কুমড়া বা ঝিঙ্গে গাছের ত্রায় সুদীর্ঘ লতা হইয়া প্রচুর ফল প্রদান করে।

ইহার ফল দেখিতে অতি সুন্দর। ‘ক্রু-নেক’ গুলির আকৃতি ককর ত্রায় এবং তাহার গাত্র দাগড়া-দাগড়া ও বন্ধুর। আবার বৃক্ষ জাতীয়গুলির ফল ঐষং পল-কাটা। কয়েক জাতির বিবরণ নিয়ে লিখিত হইল :—

এক্সট্রা-এর্লি-বুশ (Extra Early Bush) অঙ্কুরিত হইবার ৪১ দিনের মধ্যে ইহার ফল ব্যবহারোপযোগী হয় এবং কচি অবস্থায় শুভ্র ও কোমল থাকে, কিন্তু পাকিলে হরিদ্রাত ও শক্ত হয়। মাটি ও সারের ভারতম্যানুসারে প্রত্যেক গাছ ২১৩ হাত স্থান অধিকার করে।

গোল্ডেন-সামার-ক্রু-নেক (Golden Summer Crookneck) ইহার বর্ণ সোনালী।

বারবেডোজ-ক্লাস্টার (Barbadoze Cluster)। আট ইঞ্চ লম্বা এবং ডিম্বাকৃতি। ইহার প্রচুর ফল জন্মে।

লান্ড্রেথ-টুর্ব্যানা (Landreth's White Turban) ইহার আকার টুপির ত্রায় অর্থাৎ একদিক সর ও অল্প দিক চওড়া। সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিলে গৃহে এক বৎসর কাল থাকিতে পারে।

মামমথ-চিলি (Mammoth Chilli) ইহা এক একটা বড় গাম্ভীর্য

## সব্জীবাগ

হয় এবং ওজনে ২।০ মণ পর্য্যন্ত হইতে শুনা যায়। কিন্তু এদেশে হাকেও অত বড় ফল উৎপন্ন করিতে দেখি নাই বা শুনি নাই। তবে বিলাতী কুমড়ার (Pumpkin) নামান্তর বলিয়া বোধ হয়।

আরও কয়েকটি উৎকৃষ্ট জাতি আছে, এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিশ্চয়জন। বীজ-বিক্রোতাদিগের ক্যাটলগে তাহা দ্রষ্টব্য।

ইয়োকোহাম (Yokohama) জাতীয় যে সকল কোয়াস, তাহার গাছ ১২ ফুট অর্থাৎ প্রায় ৮ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। ফল গোলা-র কিন্তু শেবাংশষ চ্যাপ্টা। ফলের গাত্র খাঁজবিশিষ্ট এবং ব্যাস ৮।১০ পর্য্যন্ত হয়।

কোয়াস জলে স্থলিদ্ধ করিয়া কুমড়া-ভাতের ত্রায় মাখিয়া তাহার সহিত ত হুন্ধ, মরিচের গুঁড়া ও ঈদং লবণ দিয়া গরম করিলে উত্তম পায়স পুডিং (Pudding) প্রস্তুত হয় এবং খাইতে বড় ভাল লাগে। এত-ত নানাবিধ দেশী তরকারীতে কোয়াস ব্যবহৃত হইতে পারে।

শৈলাচল প্রদেশে চৈত্র মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত বীজ বার সময়।

---

## সা-জীরা (Caraway)

আশ্বিন-কার্তিক মাসে ইহার বীজ বপন করিতে হয়। কোন স্থানে উৎপন্ন করিয়া গাছগুলিতে ৪ ৫টা পাতা জন্মিলে, এক ফুট ব্যবধানে মৈধ্যে রোপণ করিতে হয়। মাটি হাল্কা ও সাধারণ হওয়া উচিত। সকল নয়-ইঞ্চ বা আধ হাত ব্যবধান করিলেই চলিবে। শৈত্য শে ফাস্তন-চৈত্র মাসে উল্লিখিত প্রণালীতে আবাদ করিতে হয়।

ইহার আবাদে বিশেষ কোনরূপ পাট নাই, মধ্যে মধ্যে জল সেচন নিড়ানী ভিন্ন অপর কোন তদ্বির আবশ্যক করে না।

## শসা (Cucumber)

শসা প্রায় বারমাসই জন্মে। এক হিসাবে ইহা ফল, অন্য হিসাবে তরকারী, সুতরাং দুই রকমে ইহা ব্যবহৃত হয়।

ঋতুবিশেষের আবাদফলে শসা দুইটি প্রধান জাতিতে বিভক্ত ১ম, —ভুঁয়ে-শসা; ২য়,—পালা-শসা। ভুঁয়ে-শসা গ্রীষ্মকালে এবং পালা-শসা বর্ষাকালে জন্মে। ভুঁয়ে-শসা ভূপৃষ্ঠোপরি লতাইয়া যায় এবং অধিক বাড়ে না। ইহাদিগের ফল তাদৃশ বড় হয় না কিন্তু পালা-শসা বর্ষাকালের গাছ, অতিশয় দীর্ঘ ও স্থূল হয় এবং প্রচুর ও বড় বড় ফল প্রদান করে।

পালা-শসা।—জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বীজ বপনের সময়। ক্ষেত্র মধ্যে ৬/৭ হাত ব্যবধানে এক-একটি মাদা করিয়া তন্মধ্যে পুষ্করিণীর মাটি, পোড়া মাটি, গোয়ালের আবর্জ্ঞানাদি উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া বীজ বপন করিতে হয়। এক-একটি মাদায় তিনটি সুপুষ্ট বীজ পুতিবে। বীজ পুতিয়া মাদার উপর দুই অঙ্গুল স্থূল করিয়া সার দিয়া রাখিবে। ইহাকে ‘আব-রণ’ কহে। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিলে জলসেচন করিতে হয়।

চারাগুলি ৫৬টি পাতাবিশিষ্ট হইলে গোড়ায় মাটি উচ্চ করিয়া দিতে হইবে। মেটে-ষরের পুরাতন দেওয়াল ভাঙ্গা মাটি কিম্বা পোড়া-মাটি ইহার পক্ষে বিশেষ উপকারী, সুতরাং যদি সুবিধামত পাওয়া যায় তাহা হইলে কিয়ৎ পরিমাণে গাছের গোড়ায় দিতে হইবে। ইহাতে গাছের তেজ বৃদ্ধি করে। পালা-শসার জন্ম মাচানের প্রয়োজন। পাঁচ ছয়টি গাছের উপরে একটা করিয়া বড় মাচা করিয়া দিলেই চলিবে। গাছের

---

\* ‘আবরণ’ কাহাকে বলে এবং তাহার উদ্দেশ্য ও উপকারিতা কি ? এ সকল বিষয় গ্রন্থকার কৃত ‘ভূমিকর্ষণ’ নামক পুস্তকে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে।

গোড়া সর্বদা পরিষ্কার রাখিবে এবং তখাকার মাটি বাহাতে আল্গা থাকে তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

পালা-শসা-শ্রাবণ মাস হইতে আশ্বিন-কার্তিক পর্য্যন্ত ফল প্রদান করে কিন্তু শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে যে ফল জন্মে তাহাই উৎকৃষ্ট হয়, ফল বড় হয় এবং ফলের স্বাদ মুখরোচক হয়।

ভূয়ে-শসা।—স্থানবিশেষে ইহা চৈত্রে শসা নামে অভিহিত। ইহার বীজ ৪।৫ হাত অন্তর মাদায় বপন করিবে। ভূয়ে-শসাব গাছ ছোট হয় সুতরাং তাহার জন্ত মাচার আবশ্যক হয় না, উহা জমিতেই লতাইয়া থাকে। প্রচুর ভালসেচন করা এবং মাটি খুঁসিয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন পাট নাই। উক্ত শসার বীজ মাঘ-ফাল্গুন মাসে বপন করিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে গোবরের জল দিলে ফল অধিক ও বড় হয়।

নেপালে এক প্রকার শসা জন্মে, দারজিলিং অঞ্চলেও তাহার আবাদ হইয়া থাকে। ইহা প্রায় ১৮ হইতে ২০ ইঞ্চ দীর্ঘ এবং ৫।৬ ইঞ্চ পরিধি-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। হুগলী জেলায় তারকেশ্বর অঞ্চলেও বড় বড় শসা জন্মে।

ইংলণ্ড বা আমেরিকা হইতে যে সমুদায় শসার বীজ এ দেশে আনীত হয়, এদেশের সাধারণ 'সমতল' প্রদেশে তাঁদৃগ আশানুরূপ ফল প্রদান করে না কারণ তাহাদিগের মধ্যে এমন অনেক জাতি আছে, বাহা তথায় গৃহ মধ্যে বা কাচের ঘরে জন্মে। সুতরাং সেই সকল কোমল স্বভাবাপন্ন গাছের বীজ-জাত গাছ এ দেশের রৌদ্র-ঝুটি সহ্য করিতে সক্ষম না হইয়া অঙ্কুরিত হইবার পর মরিয়া যায়, কোনটা বাঁচিয়া থাকিলেও সেরূপ সুপুষ্ট বা ফলপ্রসূ হয় না। এই জন্ত দেশী-শসার বীজ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা ভাল।

শসার পক্ষে পুরাতন রাবিশের গুঁড়া বিশেষ সার। গাছের গোড়ার

ইহা প্রদান কারলে গাছের খুব তেজ হয় এবং ফসও প্রচুর জন্মে। সারবান ক্ষেত্রের গাছ বাঁড়াইয়া যায় ফলতঃ গাছের বৃদ্ধি এত অধিক হয় যে, সময়ে সময়ে গাছে ফল ধরে না। গাছ অত্যন্ত তেজাল হইলে কতকগুলি পাতা ও নগণ্য কেবুড়ি ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত।

এক প্রকার লাল বর্ণের পতঙ্গ শসা-গাছের পরম শত্রু। ইহাদিগকে বিনাশ করিবার কোন উপায় নাই। তবে গাছের গোড়ায় ও পাতায় কাঠের ছাই দিলে তথায় পোকা-মাকড় আর যায় না। গাছের গোড়ায় বা তলায় ধোঁয়া দিলেও হুই চারি দিনের জন্ত তাহারা পলায়ন করে। সপ্তাহে হুই দিন সন্ধ্যাকালে গাছের গোড়ায় এবং মাচার তলায় ঘুঁটে কিম্বা দোস্তা পাতার ধোঁয়া দিলে পাতায় ধোঁয়া গন্ধ হয়, এজন্ত তাহারা সে দিকে ধাবিত হয় না। কচি ডগা ও কচি পাতাই ইহাদিগের আক্রমণের বিষয় কিন্তু সেগুলি ৫।৭ দিনের পুরাতন হইলে আর ভয়ের কারণ নাই, পাকা বা শক্ত পাতা তাহারা স্পর্শ করে না। নূতন ডগা উদগত হইলেই তাহাতে কাঠের ছাই ছড়াইয়া দেওয়া কীট-পতঙ্গ নিবারণের অতি উত্তম উপায়।

শসা,—ফলরূপে ব্যবহার করিতে হইলে ফল অধিকদিন গাছে রাখা উচিত নহে, ঈষৎ পরিপুষ্ট হইলেই গাছ হইতে পাড়িয়া খাওয়া উচিত, কিন্তু রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করিবার জন্ত আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিলে সমগ্র ফলটা পরিপুষ্ট হয়, ফলতঃ ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহারের উপযোগী হয়।

শসার চাটুনী হইয়া থাকে, দেশীমতে চাটুনী করিতে হইলে শসা খোসা ছাড়াইয়া খুব ছোট-ছোট পাতলা-পাতলা করিয়া কাটিতে হয়। অতঃপর তাহার সহিত আদার রস, বা লেবুর রস ও লবন মিশ্রিত করিলে অতি মুখরোচক চাটুনী হয়। এইরূপ চাটুনী প্রায় তত্ত্বাব্য ও সুবর্ণ-বণিকদিগের বাড়ীতে ক্রিয়াকর্মে প্রস্তুত হয়।



উৎকৃষ্ট ফল বীজের জন্ত রাখিতে হয়। বীজ-শসাকে পাঁড়শসা কহে। বীজ-ফল সুপক হইয়া উঠিলে, তবে তাহা আহরণ করিবে এবং চিরিয়া বীজগুলি ধোত করতঃ উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দিলে ভবিষ্যতে কাজে লাগিবে।

### লাউ ( Bottle-gourd. )

লাউ,—বাঙ্গালীর শীতকালের একটা প্রধান তরকারী। ইহা দুই জাতীয়—এক আউশে বা চৈতী, অপর আমুনে বা শীতের। চৈত্র-বৈশাখ মাসে যে লাউ জন্মে, তাহা আউসে এবং শীতকালে যাহা জন্মে, তাহা আমুনে। আমুনে-লাউ সুমিষ্ট ও উপাদেয়, সুতরাং সমধিক আদরের। আউসে-লাউয়ের স্বাদ তত সুস্বাদু নহে, এইজন্ত বাঙ্গলা দেশে ইহার তাদৃশ আদর নাই। কিন্তু, বেহার ও পশ্চিমোত্তর-প্রদেশ অঞ্চলে গ্রীষ্ম-কালে লাউ একটা প্রধান তরকারী মধ্যে পরিগণিত, এজন্য গ্রীষ্মকালেও তথায় ইহার প্রভূত আবাদ হয়।

আকৃতি অনুসারে লাউয়ের কয়েকটা জাতি আছে। ইহার কোন জাতি সুগোল কোন জাতি ঈষৎ লম্বা, আবার কোন জাতি দুই তিন হাত দীর্ঘ চোঙ্গ সদৃশ ফলও প্রদান করে। আউসের বীজ পৌষ মাসে এবং আমুনের বীজ জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করিতে হয়।

লাউ-বীজ মাদায় বপন করিতে হয়। মাদাটা গভীররূপে খনন করিয়া মাটি উলট-পালট ও চূর্ণ করিয়া, তাহার সহিত গোয়ালঘরের আবর্জনা মিশাল করিতে হইবে। মাদা প্রস্তুত হইবার তিন চারি দিবস পরে তাহাতে বীজ পুতিতে হয়। বীজগুলিকে, পুতিবার আগে, একদিন ভিজাইয়া রাখা বিধি, নতুবা অঙ্কুরিত হইতে অনেক বিলম্ব হয়। বীজ

অকুরিত করিবার আর একটি সহজ উপায়,—একখণ্ড কাপড়ে বীজগুলি আলগা ভাবে বাঁধিয়া কিয়ৎকণ ভিজাইয়া রাখিতে হয়। অতঃপর কতকগুলি খড় উত্তমরূপে ভিজাইয়া বীজের পুটুলি উঠাইয়া সিক্ত খড়ের দ্বারা উত্তমরূপে জড়াইয়া বাঁধিয়া আধ হাত মাটির নিম্নে পুতিয়া রাখিতে হয়।

দুইদিন পরে মাটি হইতে উক্ত পুটুলি উঠাইয়া লইলে যদি দেখা যায় যে, বীজগুলির অঙ্কুরোদগম হইয়াছে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অকুরিত বীজগুলি প্রত্যেক মাদায় দুইটি করিয়া বপন করিতে হইবে। যদি উক্ত সময়ের মধ্যে অকুরিত না হইয়া থাকে তাহা হইলে বীজের অবস্থা বুঝিয়া পুনরায় ২১ দিনের জন্য পুতিয়া রাখা উচিত। এই উপায়টি আমার পূর্বে জানা ছিল না। মুরসিদাবাদস্থ রৈইসবাগের প্রাচীন সর্দার মালী হুঃখু শেখের নিকট আমি ইহা দেখি ও শিখি। কয়েক বৎসর হইল বেচারী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। যাহা হউক, মাটি হইতে বীজ উঠাইয়া যদি দেখা যায় যে, উহাদিগের অঙ্কুরোদগম হইয়াছে, তাহা হইলে আর কাল বিলম্ব না করিয়া অবিলম্বেই প্রতি মাদায় ২-টি করিয়া বীজ পুতিয়া দিবে। বিলম্ব করিলে অঙ্কুর শুকাইয়া যাইতে পারে।

আমুনের বীজ হইতে যথাসময়ে চারা উৎপন্ন করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে বা আষাঢ় মাসের প্রথমভাগে বৃষ্টি হইলেই চারাগুলি যথাযোগ্য স্থানে পুতিয়া দিবে এবং উপরে মাচা বাঁধিয়া দিবে। বর্ষাকালে গাছের গোড়ার মাদা মাটি দিয়া পূর্ণ করিয়া দেওয়া উচিত,—অধিক মাটি দিয়া উচ্চ করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। একরূপ না করিলে গাছের গোড়ায় জল সঞ্চিত হয় ফলতঃ গাছ রুগ্ন হইয়া যায়। গাছের গোড়ায় পোড়া মাটি দিতে পারিলে ভাল হয়। লাউ গাছের পক্ষে পুষ্করিণীর মাটি ও খুব ভাল লাগে।

## সব্জীবাগ

পুষ্করিণীর সন্নিকটে লাউ গাছ জন্মিয়া থাকিলে কিঞ্চিৎ রোপিত হইয়া থাকিলে পুষ্করিণীর উপর মাচান করিয়া দিবে। জলের বাতাসে গাছ ভাল থাকে এবং জলেব উপরে যে ফল হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত বড় ও দীর্ঘ হইয়া থাকে। মুরসিদাবাদে মদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মহেশনারায়ণ রায়ের বাগানে কয়েক বৎসর পূর্বে তাহা দেখিয়াছি। পুষ্করিণীর উপর মাচানে যে গাছ প্রসারিত হয়, তাহাতে দেড় হাত লম্বা ও তদপযুক্ত পবিধি-বিশিষ্ট ফল হইত অথচ সেই বীজজাত ফল অপর স্থানে তত বড় হইত না।

শীতের লাউ গাছে কার্তিক মাস হইতে ফল ধরিতে আরম্ভ হয় এবং মাঘ মাস পর্য্যন্ত ফলিতে থাকে। তৎপরে যে ফল হয় তাহা গবাদি পশুতে খাইয়া থাকে। লাউ ও কলাই একত্রে সিদ্ধ করিয়া জাব্ দিলে গাভী খুব দুগ্ধবতী হইয়া থাকে।

আউসে লাউয়ের রীজ পৌষ-মাঘ মাসে ক্ষেত্রে মাদা করিয়া যথানিয়মে বপন করিবে এবং মাচা করিঃ তাহাতে গাছ উঠাইয়া দিবে কিঞ্চিৎ ভূমিতে প্রসারিত হইতে দিবে।

প্রায় ১৫।১৬ বৎসর গত হইল আমার কলিকাতাস্থ ভবনে একটা লাউ গাছ জন্মে। উক্ত গাছটাকে আমি বড় যত্ন করিতাম এবং কয়েকটা বিষয় পরীক্ষা করিবার জন্ত তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। গাছটাকে বিচালী নির্মিত রজ্জু দ্বারা দিতলের ছাদে উঠাইয়া দিয়াছিলাম। ভূমি হইতে ছাদ পর্য্যন্ত মূল কাণ্ডে যত ফেঁকড়ি উদগত হইত, তাহাদিগকে কাটিয়া লইতাম। এইপ্রকারে অন্নদিন মধ্যে সমগ্র ছাদ গাছে ভরিয়া গেল এবং কার্তিক মাস হইতে ফল দেখা দিল। বলিয়া রাখি, ছাদে গাছটা পৌছিলে মধ্যে মধ্যে ১৫।২০ দিন ব্যবধানে গাছের গোড়ায় সর্বপ থৈল ও ২৭শত বিগলিত তরল সার একত্রে মিশাইয়া দেওয়া হইত। উক্ত উপায়

অবলম্বন করায় গাছটী এত ফল প্রদান করিয়াছিল যে, তাহা বসিয়া শেষ করা যায় না। তন্নিবন্ধন নূতন ফেঁকড়িও যথেষ্ট বাহির হইত কিন্তু সেগুলি ভাঙ্গিয়া লওয়া হইত নতুবা ফলনের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিত। উক্ত উপায় দ্বারা অপরাপর গাছও ফলন্ত করিতে পারা যায়। ফল বেশী বড় হইতে দিলে ফলের সংখ্যা তত অধিক হয় না, সুতরাং কচি থাকিতে ফল সংগ্রহ করিলে ভাল হয়। কচি লাউ আঁত উপাদেয় তরকরৌ।

সুপক্ক লাউয়ের খোলে কমণ্ডলু ও তন্তুরার খোল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। তাহা ব্যতীত অন্ত অনেক কাজে আসিতে পারে। সুতরাং নষ্ট না করিয়া যত্নসহকারে বীজ বাহির করিয়া লইয়া শুষ্ক করতঃ রাখিয়া দেওয়া উচিত।

লাউ আহারকালে মুখপ্রিয় ও নীতল, কিন্তু গুরুপাক, এজ্ঞ অধিক খাওয়া ভাল নহে।

## ভুট্টা ( Indian Corn or Maize )

খাস বাঙ্গালাদেশে সমধিক পরিমাণে ভুট্টার চাষ হইতে দেখা যায় না কিন্তু সাঁওতাল পরগণা হইতে আরম্ভ করিয়া যতই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া যায় ততই ভুট্টার আবাদ বেশী দেখা যায়। তথায় ইহা একটী কৃষির ফসল মধ্য পরিগণিত। নিম্নবঙ্গ লোকে সখ করিয়া বাগানে কয়েকটা গাছ রোপণ করেন মাত্র। সুতরাং বাঙ্গালীর ইহা সখের ফসল। হিন্দুস্থানী কৃষকগণ বাঙ্গালাতে অস্বাধিক ভুট্টার আবাদ করিয়া থাকে।

ভুট্টা বারমাসই জন্মাইতে পারা যায় কিন্তু ইহার প্রকৃত আবাদের সময়,—বর্ষাকাল। বীজ বপনের দিন হইতে দুই মাস মধ্যেই ভুট্টা ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে। ইহার জন্ম বারমাসে জমি হওয়া আবশ্যক।

বধাকালে যে ভূমিতে জল দাঁড়ায়, সেখানে বর্ষাকালে ভুট্টা হইতে পারে না। অপর সময়ে নাবাল জমিতে আবাদ করিতে পারা যায়।

ভুট্টার বীজ বপন করিতে হয়,—জ্যৈষ্ঠমাসে। বৈশাখ মাসের শেষ-ভাগে জমি উত্তমরূপে লাঙ্গল ও মই দ্বারা তৈয়ার করিতে হয়। কিন্তু এ সময় মাটি এত কঠিন হইয়া থাকে যে, তাহাতে লাঙ্গলের কাল প্রযুক্তি হয় না এবং বলদেও হাল টানিতে পারে না। মাটি কঠিন থাকিলে তাহাতে একবার ছেঁচ দিয়া মাটি ভিজাইয়া, ‘যো’ হইলে তবে লাঙ্গল দেওয়া উচিত। জমি চষিবার পবে তাহাতে এক হাত অন্তর বীজ দিয়া পার্শ্বস্থিত মাটি চাপা দিবে। ৩৭ দিন মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হয়। এক্ষণ হইতে ১-১২ দিন অন্তর একবার ছেঁচ দিতে হইবে এবং নিড়ান দ্বারা তৃণাদি পরিষ্কার করিয়া দিবে। ছিটান বুনানীতে জলসেচন করা চলে না। মধ্যে মধ্যে বারিপাত হইলে জলসেচনের প্রয়োজন নাই।

ভুট্টা গাছের প্রত্যেক পত্রগ্রন্থিতে মোচা ধরিয়া থাকে এবং সেই মোচায় যে দানা থাকে তাহাই ভুট্টার শস্ত। দেশী ভুট্টা এত নিকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, গাছে প্রায় একটির অধিক মোচা জন্মে না। তাহা বাতীত মামুলী রীতিতে আবাদিত হয় বলিয়া গাছ শীর্ণ হয়। একেই ভুট্টা অতি বুদ্ধুকু ফসল, যেমন অধিক রস আহরণ করে, তেয়ি সার রাশি রাশি পরিশোধন করিয়া জমিকে নিষ্কোজ করিয়া দেয়, তবে বর্ষায় আবাদ হয় বলিয়া তাহার রসাতাব হয় না কিন্তু মাটি খুব সারাল হওয়া প্রয়োজন। কৃষকেরা সার দিতে পারে না কাজেই তাহার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হয়। সব্জীবাগের মধ্যে ইহার আবাদ করিতে হইলে, কৃষকের পথ অবশ্যন না করিয়া উদ্ভাসিক প্রণালীতে আবাদ করিতে হইবে। তদর্থে কেত্র উত্তমরূপে কর্ষণ এবং মাটি-চূর্ণ করিয়া যথাযথ সার,—গোবর-সার ও উদ্ভিজ্জ তরু দিয়া জমি তৈয়ার,

শ্রেণীবদ্ধভাবে বীজ বপন, প্রয়োজন মত জলসেচন ইত্যাদি নিয়মিতরূপে করিতে হইবে—তবেই আশাবূরূপ ফল পাওয়া যায়।

শুগল ইহার পরম শত্রু। রাজিকালে ইহারা দলে দলে আসিয়া ভূট্টার গাছ ভাঙ্গিয়া ফল খাইয়া পলায়ন করে। এ জন্য ভূট্টা-ক্ষেত্র সর্বদা—বিশেষতঃ রাজিকালে—রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যিক।

ভূট্টার বীজ প্রতিমাসে বা মাসে দুইবার বপন করা যাইতে পারে। আষাঢ় মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বীজ বপন করিতে হইলে ক্ষেত্রে জলসেচন করিতে হয় না। দেশী অপেক্ষা হিন্দুস্থানী বীজ অনেক কারণে শ্রেষ্ঠ। আমাদের মতে শেযোক্ত বীজই বপনযোগ্য। তবে কথা এই যে বিলাতী আনীত-বীজ ( Imported Seed ) অপেক্ষা এদেশে উক্ত বীজজাত গাছে সে বীজ জন্মে তাহা বিশেষ ফলসম্পন্ন হয়। সুতরাং প্রতিষ্ঠিত-বীজ ( acclimatised seed ) বপন করা উচিত। সস্তা আনীত-বীজ জাত গাছ খুব তেজাল হয় এবং প্রত্যেক গাছে ৩৪টি মোচাও জন্মে, কিন্তু মোচার অধিকাংশ কোষ ফোকলা বা নিসীজ হয়। এই কারণে অন্ত বিলাতী অপেক্ষা প্রতিষ্ঠিত বিলাতী বীজ বিশেষ স্পৃহনীয়।

কেবলই বিলাতী বীজের উপর নির্ভর না করিয়া কিছু দেশী ভূট্টার বীজ লইয়া আবাদ করিলে ভাল হয়। প্রকৃষ্ট প্রণালীতে দেশী বীজের আবাদ হইলে ফলনে ও ফসলে ৩৪ বংশ পরে উৎকৃষ্ট ভূট্টা উৎপন্ন হয়।

মার্কিনের যে কয়েকপ্রকার বীজ আমাদের ভাল বোধ হইয়াছে, নিয়ে তাহার তালিকা দেওয়া গেল। পাঠক ইচ্ছা করিলে পরীক্ষা করিতে পারেন।

আর্লি ম্যাথথ, এন্টারপ্রাইজ, সুগার-করন, ক্রলবি, মিনসোট্য, একট্রা-

আর্লী-এডামস, কেবিন-হোম, কণ্ট জেন্টলম্যান, ইয়োলোপেন্‌সিল্‌ভেনিয়া ইত্যাদি ।

উপরোক্ত কয়েকটির মধ্যে সুগার-করণ ও কণ্টাজেন্টলম্যান এই দুই প্রকার গাছের প্রত্যেক গ্রহিতে ২৩টী, সময়ে চারিটী মোচা ধরিয়া থাকে । প্রতিষ্ঠিত-মার্কিন-বীজের গাছে মোচা অধিক হয় এবং দানাও বড় হয় । অতি সারাল জমিতে তুটীর গাছ নিতান্ত তেজাল হইয়া উঠে, ফলতঃ আশানুরূপ ফলন হয় না । গাছ অতিশয় তেজাল হইয়া উঠিলে কাণ্ডের উপরার্ক ভাগ কাটিয়া ফেলা উচিত কারণ তাহা হইলে যথাযোগ্য ফলন হইয়া থাকে । জৈদৃশ তেজাল গাছের মূলদেশ ও কাণ্ড হইতে অনেক ফেঁকড়ি উৎপন্ন হয়, ফলতঃ মূল গাছের উৎপাদিকাশক্তি খর্ব্ব হয় । গাছের গোড়া বা গাত্র হইতে এইরূপ ফেঁকড়ি জন্মিলে ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত ।

বীজ সুপক হইলে কোন জাতির বর্ণ কাঁচা-সোণার ছায়, কোন জাতীর বা লাল রং হয়, আবার কোন জাতীর সাদা রং হয় । পাকা ফলগুলি মোচা সমেত উঠাইয়া, বীজের অন্ত গুহে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া দিবে । ভূমিতে বা চাতালে কিম্বা ঠাণ্ডা স্থানে পড়িয়া থাকিলে বীজ নষ্ট হইয়া যায় ।

### লঙ্কা ( Chilli or Pepper )

লঙ্কা নিজে তরকারী না হইলেও অধিকাংশই ব্যঞ্জনই যে ইহার আবশ্যক হইয়া থাকে, সে বিষয়ে সংশয় নাই । লঙ্কার গুণ তীব্রতা । বাল না দিলে বহু ব্যঞ্জনই সুস্বাদ হয় না ।

পশ্চিম বঙ্গে, বোধ হয় লবণতাহেতু, ততটা বাল ব্যবহারের প্রয়োজন

হয় না কিন্তু ২৪-পরগণা, হাওড়া, হুগলী অতিক্রম করিলে লক্ষা খালের ব্যবহার সমধিক দেখা যায়।

পূর্ববঙ্গে ইহার যথেষ্ট আবাদ হয় এবং তথাকার চাবীগণ ইহার চাষে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়া থাকে।

লক্ষা চাষের জন্ত মাঠান ও উচ্চ জমির আবশ্যক। উন্মুক্ত ও রোদ-পিঠে জমিতে লক্ষা ভাল জন্মে।

বৈশাখ মাসে জৈষজ্জাবাবিশিষ্টস্থানে হাপোর করিয়া বীজ বপন করিবে। অতঃপর বিচালী দ্বারা ঢাকিয়া দিলে ভাল হয়। এইরূপে ২৩ দিন চাপা থাকিলে বীজগুলি অপেক্ষাকৃত শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। সময়ে সময়ে আবশ্যক মত জলসেচন করিবে। ৩৭ দিনের মধ্যে ছারা দেখা যায়। তখন মধ্যে মধ্যে শলাকা দ্বারা মাটি উসুকাইয়া, এবং গাছের ঘনতা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে চারাদিগকে স্থায়ীরূপে ক্ষেত্রে বসাইতে হইবে।

ইতিপূর্বেই মাটি তৈয়ার করিয়া রাখিতে হইবে। দেড় হাত অন্তর শ্রেণীর মধ্যে দুই হাত অন্তর, এক-একটি চারা রোপণ করিতে হইবে। এই সময়ে যথেষ্ট বর্ষা থাকে সুতরাং ক্ষেত্রে জল দিবার প্রয়োজন হয় না, তবে চারা বসাইবার পরে যদি বৃষ্টির অভাব হয়, তাহা হইলে গাছে জল দিতে হইবে। মাটি কঠিন হইয়া গেলে জমি কোপাইয়া মাটি জালিয়া দেওয়া আবশ্যক। গাছে ফল দেখা গেলে গাছের গোড়ার বিট লবণ দিলে ফল বড় হয় এবং ফল অধিক হয়। গাছের গোড়ার লবণ দিবার পর বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকিলে ক্ষেত্রে জলসেচন করা উচিত, কারণ তাহা হইলে লবণ অচিরে গলিয়া গিয়া গাছের আহরণোপযোগী হইয়া থাকে। বিধা প্রতি দশ সের লবণ লাগে। লবণের সহিত সমভাবে মাটি মিশাইয়া লওয়া উচিত।



লঙ্কার আবাদে জমি শীঘ্র নিত্যজ হইয়া পড়ে, অতএব এক জমিতে বারংবার ইহার আবাদ করা উচিত নহে কিন্তু যদি করিতে হয়, তাহা হইলে জমিতে উত্তমরূপে সার দিতে হইবে। খোঁয়াড় ও গোয়ালবাড়ীর আবর্জনা লঙ্কার পক্ষে উত্তম সার।

বাঙ্গলা দেশে অনেক প্রকার লঙ্কা জন্মে, কিন্তু তাহার নাম না থাকায় স্বতন্ত্ররূপে নির্দেশ করা কঠিন। ‘ধানী’ নামক এক জাতীয় লঙ্কা আছে তাহা ধানের জায় ক্ষুদ্র, কিন্তু অপরিমিত ঝাল। ঝালের জন্তই লঙ্কার ব্যবহার।

এক জাতীয় লঙ্কা ফলনকালে উর্দ্ধমুখ থাকে, এই জন্ত ইহা সূর্য্যাম্বী লঙ্কানামে অভিহিত। ইহা তীব্র ঝাল। ঝাল ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও কোন কোন দেশে অপরিমিত লঙ্কা ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্ববঙ্গে প্রচুর লঙ্কা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সে ব্যবহারের সাফল্য আছে কারণ তথাকার রন্ধন প্রণালীর বিশেষত্ব হেতু সেই উৎকট ঝাল ব্যঞ্জন, চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে গলাধঃকরণ করা চলে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে যে ঝাল ব্যবহৃত হয় তাহার পরিমাণ বা উপমা নাই, উপরন্তু সে দেশের লোক রন্ধনবিজ্ঞাকুশল নহে, নানা প্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে জানে না, রাশি রাশি লঙ্কা উদরস্থ করিয়াই সে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা পরিতৃপ্ত। লঙ্কা ভক্ষণ সৰ্ব্বদা মহীশূর ও মাক্রাজ চিরদিন মনে থাকিবে।

ইংলণ্ড ও আমেরিক হইতে নানা জাতীয় সূঠাম লঙ্কার বীজ প্রতি বৎসর এদেশে আমদানী হয়। ইহার গাছগুলি এক বা দেড় ফুটের অধিক উচ্চ হয় না। উক্ত লঙ্কার ফলগুলি দেড়-ইঞ্চি হইতে তিন ইঞ্চি লম্বা হয় এবং চারি পাঁচ ইঞ্চি পরিধি বিশিষ্ট হয়, কিন্তু তাদৃশ ঝাল হয়। অধিক কি, তাহার কয়েকটি জাতিতে আদৌ ঝাল নাই বরং অতিশয় মিষ্ট। ইহার বীজ শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে গামলায় বপন করিতে হয়। চারা উৎপাদ

হইয়া চারি অঙ্গুলি উচ্চ হইলে ওটিতে এক হাত অন্তর রোপন করিতে হয়। পৌষ-মাঘ মাসে গাছে ফল ধরে। ফল পাকিয়া উঠিলে গাছের শোভা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ব্যবহার অপেক্ষা সৌন্দর্যের অনেকে ইহা রোপণ করেন। অনেকে আবার টবে গাছ পুতিয়া রাখেন। ছোট টবে ছোট গাছে বড় বড় সুরঞ্জিত ফল দেখিবার জিনিষ বটে।

### সেলেরি (Celary)

চাষীগণ ইহাকে সিলুড়ী কহিয়া থাকে। উত্তমরূপে পাট ও তধির না করিলে সেলেরি ভাল উৎপন্ন হয় না। পুরা তেজে যখন ইহা বাড়িতে থাকে, তখন কিকিশ্মাত্র ও বাধা পাইলে ইহার স্বাদ খারাপ হয়। শ্রাবণ মাসের প্রথম ভাগে গামলায় বীজ বপন করিতে হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইতে ২।৫ সপ্তাহ পর্য্যন্ত সময় লাগে। চারাগুলি এক ইঞ্চি পরিমাণ বড় হইলে গামলা হইতে তুলিয়া ভাঁটিতে রোণ করিবে। ভাদ্র মাসে দ্বিতীয়বার বীজ বপন করিবে। এই সময়ের রোপিত বীজ অঙ্কুরিত হইতে পূর্ব্বের ত্রায় অধিক সময় লাগে না এবং চারা জন্মে তাহাও অতি শীঘ্র বাড়িয়া থাকে, অধিক কি, ইহার ফসল পূর্ব্বরোপিত বীজের ফসল হইতে ১৫।২০ দিন পশ্চাতে থাকে মাত্র। চারাগুলি যখন ৭।৮ অঙ্গুলি দীর্ঘ হইবে, তখন তাহাদিগকে জুলির মধ্যে পুতিয়া দিতে হইবে। ক্ষেত্র মধ্যে চারি ফুট ব্যবধানে এক ফুট গভীর ও আঠার ইঞ্চি চওড়া করিয়া জুলি প্রস্তুত করিতে হইবে। জুলির মাটি অন্ত্র না ফেলিয়া তাহার পার্শ্বেই জমা করিয়া রাখিলে পরে কাজ আসিবে। এই জুলি মধ্যে পুরাতন গোয়াল-বাড়ীর অথবা আস্তাবলের আবর্জনা দিতে হইবে। উপরোক্ত সারের মধ্যে কোন

পোকা-মাকড় না থাকে তাহা দেখা উচিত। জুলিগুলিকে উক্ত সার দ্বারা ৮-৯-ইঞ্চি পূর্ণ করিয়া ৯-ইঞ্চি অন্তর এক-একটি চারা পুতিয়া দিবে এবং যথানিয়মে তাহাতে জলসেচন করিবে। সময়ে সময়ে তাহার গোড়া নিড়েন দ্বারা পরিষ্কার ও আলগা করিয়া দেওয়া উচিত।

গাছগুলি যখন এক ফুট উচ্চ হইবে কিম্বা পূর্ণাবস্থার সন্নিকটে হইবে, তখন তাহার গোড়ায় মাটি উচ্চ করিয়া দিবে কিন্তু গোড়ায় মাটি দিবার পূর্বে বাবতীয় শুক ও ছোট পাতা কাটিয়া ফেলিয়া গাছের গোড়ায় এরূপ-ভাবে মাটি দিতে হইবে যে, কেবল গাছের পত্রাংশ মাত্র দেখা যায়। অবশিষ্ট সমুদায় নিরাংশ ঢাকা থাকা আবশ্যিক। গোড়া অনাবৃত থাকিলে উপরিভাগ বিবর্ণ ও শক্ত হইয়া যায়। অনেকে আবার গাছের গোড়ায় কাঁশের খোলা বা কলা-বসনা দিয়া থাকেন। যে কোন উপায়েই হউক, গাছের গোড়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। এইরূপে ১৫।২০ দিবস ঢাকা থাকিলে আবৃতাংশ শুক ও কোমল হয় এবং তখনই ব্যবহারের উপযোগী হয়। সেলেরিতে উত্তম সালাদ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

### আমাদা (Mango-ginger)

ইহা আর্দ্রকের জাতিবিশেষ। গাছের আকার, প্রকৃতি এবং গেঁড়—অবিকল আর্দ্রকের দ্বায়। মূলে কাঁচা আঁত্রবৎ গন্ধ থাকায় ইহার নাম আমাদা হইয়াছে। ইংরাজীতে ইহাকে ‘ম্যাঙ্গোজিঞ্জার’ কহে। বৈজ্ঞানিক নাম *Curcuma amada*.

গেঁড় বা মূখী খণ্ড খণ্ড করিয়া রোপণ করিলে চারা জন্মে। সারবান জমিতে তিন ফুট চওড়া চৌকা করিয়া কাঙ্কন মাস হইতে বৈশাখ মাস মধ্যে উক্ত চৌকায় এক হাত অন্তর এক-এক খণ্ড গেঁড় পুতিয়া দিতে

হইবে। ১০।১২ দিন মধ্যে অল্প উল্লসিত হয়। ষাট না বর্ষা আগত হয়, তাবৎ উহাতে মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিতে হইবে। ঈষৎস্নান্যুক্ত স্থানে আমাদা ভাল জন্মে। তাহা বলিয়া গাছতলায় আবাদ করা উচিত নহে। শীতকালে গাছ মরিয়া যায়, তখন মূল উঠাইয়া লইতে হয় কিন্তু না উঠাইয়া পুনরায় পর বৎসর তাহাতেই গাছ জন্মে। তখন আবশ্যকমত উঠাইয়া লইলেও চলে। অঞ্চল বা চাটুণীতে ইহার রস দিলে আত্মাণ কাঁচা আত্মর জ্বায় হইয়া থাকে।

### মেথি ( Common fenu greek )

মেথির বৈজ্ঞানিক নাম *Trigonell Foenum Groecnm*। মেথির ডগা ও কচিপাতা তরকারীরূপে ব্যবহৃত হয় এবং ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ ব্যঞ্জনাদির মসলা মধ্যে পরিগণিত। এছাড়াও ঔষধাদিতেও ব্যবহৃত হয়।

ছোট ছোট চৌকায় আশ্বিন-কার্তিক মাসে বীজ পাতলা ভাবে ছড়াইয়া বপন করিতে হয়। চারা উল্ল হইলে মধ্যে মধ্যে জলসেচন করা ও মাটি খুঁসিয়া দেওয়া ভিন্ন অপর কোন পাট নাই।

গাছগুলি অগাধিক বড় হইয়া উঠিলে মধ্যে মধ্যে ডগা কাটিয়া ব্যবহার করিতে পারা যায়। বীজ করিবার জন্য স্বতন্ত্র গাছ থাকা উচিত। যে সকল গাছ হইতে ডগা কাটিয়া লওয়া হয় তাহাতে অধিক দানা কীড়া ভাল দানা জন্মে না—স্বরণ রাখা উচিত।

## সব্জীরাগ

### খন্ড়া বা ধনিয়া ( Coriander )

পানে ও রন্ধনকার্যে যে ধনে মসলারূপে ব্যবহৃত হয়, ইহা তাহাই। ইহার শাকে অতি সুগন্ধ থাকায় অনেক তরকারীতে নিয়োজিত হইয়া থাকে।

উদ্ভানের সাধারণ জমিতে পটি করিয়া তন্মধ্যে বীজ বুনিতে হয়। কার্তিক মাসে বীজ বপন করিতে হয়। যাবৎ গাছ না জন্মে তাবৎকাল আবশ্যকমত জল সেচন করিতে হইবে। গাছ জন্মিলে ২।৪ দিবস অন্তর প্রচুর পরিমাণে জল দেওয়া আবশ্যক। গাছগুলি ৫।৬ ইঞ্চি উচ্চ হইলেই কাটিয়া লইবে। একরূপ যতবার কাটিবে ততবারই উহা গজাইবে। গাছ একেবারে উপড়াইয়া লইবে না, কেন না, তাহা হইলে উহার আর গজাইবার উপায় থাকে না। ধনের দানা জন্মাইতে হইলে গাছ কাটিবে না। ফাল্গুন মাসে দানা সংগ্রহ করিতে হয়।

### পুদিনা ( Mint )

পুদিনার পাতায় অতি সুগন্ধ। ইহাতে সুন্দর চাট্‌নী তৈয়ার হয় এবং অন্যান্য তরকারীতে দিলে তাহাও অতি সুগন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম—*mentha viridis*.

যে জমিতে কিছু এঁটেল-মাটির ভাগ অধিক, তাহাতে পুদিনা ভাল জন্মে। আষাঢ় মাসে পটি মধ্যে ইহার ডগা বা শিকড় কাটিয়া পুতিয়া দিলে ৮।১০ দিনের মধ্যে শিকড় জন্মে। পটি অতি ঘন না হয়, একতাল এক ফুট অন্তর শ্রেণী মধ্যে ছয় ইঞ্চি অন্তর ডগা বসাইতে হয়। গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন এবং শীতকালে সপ্তাহে দুই দিন জল দিতে হয়। যেখানে রোপণের প্রথম ডগা বা মূল পাইবার পক্ষে অনুবিধা, তথায় বীজ বপন

করিতে হইবে। আশ্বিন মাসে পটিতে বীজ বপন করিতে হইবে। পুদিনা একবার জমিতে একস্থানে বহুদিন থাকে কিন্তু প্রতিবৎসর স্থানান্তর করিয়া দিলে ভাল হয়, কিম্বা পুরাতন পটির জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া উত্তমরূপে নূতন মাটি ও সার দিলে চলে। ইহাপেক্ষা নূতন পটি করিয়া দেওয়া সহজ বলিয়া আমাদের মনে হয়। পাতা শুক করিয়া রাখিয়া দিলেও অনেক কাজে লাগে।

### পিপারমেন্ট ( Peppermint )

পিপারমেন্টের গাছগুলি পুদিনার ছায় ছোট ছোট। ইহার তরু সবই পুদিনার ছায়। আশ্বিন-কার্তিক মাসে বীজ বপন করিতে হয়, কিম্বা ডগা কাটিয়া ছোট চোকা বা পটিতে ছয় ইঞ্চি অন্তর রোপণ করিতে হয়। বৈকালের রোদ না লাগে এরূপ স্থান হইলেই ভাল হয়। চোকায় প্রায়ই জলসেচন করা আবশ্যক এবং মধ্যে মধ্যে কিম্বা প্রতিবার ডগা সংগ্রহ করিবার পরে, চোকায় অল্প সার ছড়াইয়া দিতে হয়। বলা বাহুল্য, মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া বাস-মুখা বাছিয়া ফেলা আবশ্যক, নতুবা তৃণাদি জন্মিয়া গাছগুলিকে ঢাকিয়া ফেলে, ক্রমে মারিয়া ফেলে। একখণ্ড চারি হাত চওড়া ও আট হাত লম্বা পটি থাকিলে, একটা গৃহস্থের উপযোগী পিপারমেন্ট বারমাস পাওয়া যাইতে পারে।

আষাঢ় মাস হইতে আশ্বিনের শেষ পর্যন্ত প্রতি মাসে একবার করিয়া ডগা কাটিতে পারা যায়। পরে দুই মাস অন্তর ডগা পাওয়া যাইবে। ডগা মাটিতে সংলগ্ন হইয়া থাকিলে আপনা হইতে উহার গ্রন্থিতে শিকড় জন্মে এবং সেই শিকড় সংযুক্ত ডগা জমিতে রোপণ করিলে অতি শীঘ্র চারা জন্মে। সর্বদা ডগার আবশ্যক না থাকিলে কণ্ঠিত ডগা ছায়ায় শুক

করতঃ কাগজের মোড়কে রাখিলে ভবিষ্যতে ব্যবহার করা চলে। পিপার-মিণ্টের পত্র জলে সিদ্ধ করতঃ চুয়াইলে মনোহর পিপারমেন্ট সার বা নির্বাস বাহির হয়। উক্ত সার বা নির্বাস এবং ইহার গাছ অনেক অল্পবয়স্কের সময় কাজে লাগে। ইহা একটি মসলার মধ্যে গণ্য, সুতরাং চাট্‌নী প্রকৃতিতে পুদিনার জায় ব্যবহার করা চলে। টব বা গামলায়ও ইহার সংক্ষিপ্ত আবাদ হইতে পারে।

---

### টাইম (Thyme)

সাহেবদিগের ব্যবহার্য্য একপ্রকার শাক। তাহা ব্যতীত মশলার জন্তও টাইমের আবাদ হইয়া থাকে। ইহার কোমল পত্র ও ডগা শঙ্ক-রূপে, কিম্বা ব্যঞ্জনাদি সুগন্ধ করিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়।

ভাদ্র-আশ্বিন মাসে হাণোরে বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিতে হয়। চারাগুলি স্থানান্তরিত হইবার যোগ্য হইয়া উঠিলে অনতিগভীর জুলির মধ্যে এক হাত হইতে দেড় হাত অন্তর এক-একটি চারা রোপণ করিয়া বথারীতি পালন করিতে হয়। মাটি খুব সারাল হওয়া প্রয়োজন। মাটি সর্বদা ঈষৎ রসা থাকে ইহা টাইমের পক্ষে বিশেষ স্পৃহনীয়।

গাছগুলি ৮।১০ অঙ্গুলি উচ্চ হইয়া উঠিলে গোড়া ষেঁসিয়া কাটিয়া লইতে হয়। গাছগুলি কর্তিত হইবার পরে জুলির মাটি উড়াইয়া চূর্ণ করিয়া দিতে হয়। এইরূপে সপ্তমসর মধ্যে ৩।৪ বার কাটিতে পারা যায়। কর্তিত গুল্ম শুকাইয়া রাখিতে হয়। বিস্তৃত আবাদ করিলে লাভবান হওয়া যায়।

---

## দ্বাদশ অধ্যায়

### নটে-শাক ( Amaranthus )

নটে-শাকের কতকগুলি জাতি আছে, তন্মধ্যে চাঁপা-নটে, কন্কা-নটে ও পদ্ম-নটে প্রধান। ইহাদিগের কচি পাতা ও ডগা অতি উপাদেয় সামগ্রী। বারমাসই ইহা জন্মিয়া থাকে কিন্তু বর্ষা ও শীতকালে বাহা জন্মে তাহাই উৎকৃষ্ট।

ইহার জন্ম জমি খুব সারবান ও রসাল হওয়া আবশ্যক। জমি সারবান ও রসাল হইলে গাছ খুব শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। গাছ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িলে অতি কোমল হইয়া থাকে। এইজন্ত ইহার জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে গোয়ালের আবর্জনা দিতে হইবে। বেলে বা দৌ-আঁশ মাটি অপেক্ষা মাটি ঈষৎ এঁটেল হইলে নটে শাকের পক্ষে ভাল হয়। বেলে বা তজ্জাতীয় মাটি শীত ও গ্রীষ্মকালে শীঘ্রই নীরস হইয়া পড়ে সুতরাং তাহাতে সর্বদাই জলসেচনের আবশ্যক হয়। উপরন্তু এরূপ মাটির শাকের স্বাদ ভাল হয় না।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে জমি উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া পটিতে পাতলা করিয়া বীজ বপন করিতে হয়। মাটি সরস না থাকিলে প্রতিদিন জলসেচন করিবে। চারা ঘনভাবে জন্মিয়া অল্পাধিক চারা পটি হইতে তুলিয়া লইবে। প্রত্যেক গাছের জন্ত চারিদিকে অন্ততঃ ৫।৬ ইঞ্চি এবং অপর জাতের জন্ত এক ফুট স্থান থাকা আবশ্যক। চারা বাহির হইলে সপ্তাহে দুই-তিন দিন পটিতে উত্তমরূপে জলসেচন করিবে এবং মাটিতে যো পাইলে নিড়ান করিয়া দিবে। পটি মধ্যে তৃণাদি জন্মিলে শাক বাড়িতে পারে না।



বীজ অঙ্কুরিত হইবার ৫।৬ সপ্তাহ মধ্যে শাক কাটিতে পারা যায়। ইহার গাছ একবারে না উপড়াইয়া গোড়ায় ২।৩ অঙ্গুলি রাখিয়া উপরি-ভাগ কাটিয়া লইবে। এইরূপ যতবার কাটিয়া লইবে ততবার নূতন ফেঁকড়ি বাহির হইবে। অধিক দিবস না কাটিলে শাক শক্ত হইয়া যায় ফলতঃ ভক্ষণে তত আরাম পাওয়া যায় না। ছুই তিনবার কাটিবার পরে তরল-গোবর-সার কিংবা খৈল-পচা জল দিতে পারিলে ভাল হয়। শাক কাটিয়া লইবার পরে জলাভাব হইলে গাছ শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। অতএব, জমি বাহাতে সর্বদা সরস থাকে তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। উল্লিখিত প্রণালীতে প্রতি মাসেই বীজ বপন করা যাইতে পারে এবং বারমাসই শাক খাওয়া চলিতে পারে। অজ্ঞান নটে-শাকের আবাদ-প্রণালীও এইরূপ।

### ডেঙ্গো ( *Amaranthus Lividus* )

বর্ষাকালে ইহা একটা বিশেষ তরকারী বলিলেও চলে; ইহার কচি পাতা ও শাখা-প্রশাখা তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। ডেঙ্গোর গাছ যত বড় হইতে থাকে ততই মিষ্ট হয় কিন্তু গাছ অধিক বড় হইলে, পাতা তাদৃশ কোমল থাকে না এবং শাখা-প্রশাখা শক্ত ও ছিব্ড়া-বিশিষ্ট বা তন্তুক হইয়া যায়। উচ্চ, উর্বরা ও রস ভূমিতে যে সকল ডেঙ্গো জন্মে তাহা প্রায় আড়াই বা তিন হাত উচ্চ হয় এবং একটী বড় গাছ কলিকাতার বাজারে ছুই পয়সা বা ততোধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। বর্ষাকালের ডেঙ্গো তাদৃশ মিষ্ট না হইয়া পানুসে হয় কিন্তু অপর সময়ের শাক স্মিষ্ট ও উপাদেয় হয়।

বিগত সন ১৩০২ সালে ভ্রমণোদ্দেশে বরিশাল গিয়া তথায় যে রূপ

সুদীর্ঘ ডেলো দেখিয়াছি কুত্রাপি তাদৃশ দেখি নাই। সেখানে গাছগুলি সচরাচর পাটগাছের জায় ৭।৮ হাত দীর্ঘ হয় কিন্তু আশ্বাদ বড় পান্বে।

বেলে বা দো-আঁশ অপেক্ষা ছুধে-এঁটেল মাটিতে ডেলো ভাল জন্মে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস বীজবপনের সময়। বুনিবার পূর্বদিবস হাপোরে উত্তমরূপে জল দিয়া রাখিতে হয়। বপনের দিন মাটি উন্কাইয়া খুর করিয়া বীজ বপন করিবে। অতঃপর সমস্ত রাত্রি অনাবৃত রাখিয়া পরদিবস সকালে বিচালী, চেটাই বা দরমা দ্বারা হাপোর ঢাকিয়া দেওয়া এবং অপরাহ্নে তাহা খুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। ২।৩ দিন এইরূপ করিলে বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয় না। বসিতাবস্থায় হাপোর অনাবৃত থাকিলে বায়ুমণ্ডলের চাপে মাটি দৃঢ় হইয়া যায়, অতঃপর রৌদ্রোজ্জ্বলে মাটি শুকাইয়া ও ফাটিয়া যায়। চড়াই পানীতেও খাইয়া যায় এই সকল কারণে ক্ষুদ্র বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব ঘটে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ঈষৎছায়াযুক্ত স্থানে হাপোর করিয়া বীজ বপন করিবে। জলসেচন করিয়া হাপোর সর্বদা ভিজা রাখিবে। ৪।৫ দিনের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। বুঝিয়াই ছই বা তিন দিবস অন্তর উত্তমরূপে জলসেচন করিবে। ইতিমধ্যে যে পটিতে চারা বসাইতে হইবে তাহা কোপাইয়া ও মাটি চূর্ণ করিয়া এবং সার মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হইবে। মাটিতে উত্তম-খৈল-ও গোবর-সার মিশ্রাল করিতে হয়। তদনন্তর আষাঢ় মাসে ২।১ পসলা বৃষ্টি পড়িলে চারাগুলি উঠাইয়া পটিতে দেড়হাত অন্তর পুতিয়া দিবে এবং যাবৎ উত্তমরূপে বর্ষা আগত না হয়, তাবৎ মধ্যে মধ্যে জলসেচন করিবে। বর্ষারন্ত হইলে আর জল দিবার আবশ্যক হয় না। গাছের গোড়ায় জল না দাঁড়ায়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে। গাছগুলি এক হাত উচ্চ হইলে ডগা কাটিয়া লইবে। এরূপ করিলে গাছ অধিক

লম্বা না হইয়া শাখাপ্রশাখা ও পত্রবিশিষ্ট হইয়া থাকে। গাছগুলি বেশ শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট এবং ঝড়াল হইলে প্রয়োজনমত ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া আনি এবং রন্ধন করিয়া ভোজন কর।

সুপক ডেকোর গোড়া স্থূল, তক্তদ বা ছিবড়েও শাঁসাল হয়। এই অবস্থায় ডাঁটা চর্কনে আরাম পাওয়া যায়। বাঁহার ডাঁটা চর্কনকে বর্করতা বা বর্করতার জের মনে করেন তাঁহার অল্প উপায়ে উহার সত্ত্ব আত্মদান করিতে পারেন। যথানিয়মে ডাঁটা সিদ্ধ করিয়া উহা হইতে শাঁস বাহির করিয়া একখণ্ড বস্ত্রে ছাঁকিলে উত্তম নির্ঘাস পাওয়া যায়। অতঃপর সেই কাতে জৈবৎ সর্ষপ তৈল, লবণ ও মরিচের গুড়া মিশাইলে উপাদেয় ভোজ্য হইয়া থাকে। উহার সহিত ২।৪ বিন্দু কাগজী লেবুর রস দিলে আরও রসনা তৃপ্তিকর হয়।

কাটোয়া অঞ্চলে এক প্রকার ডেকো জন্মে, তাহা স্বভাবতঃ খৰ্ক কিন্তু ঝড়াল হয়। উক্ত ডেকোর ডাঁটা খুব মিষ্ট ও শাঁসাল হয়। বৈশাখ মাসের মধ্যে সরস হাঁপোরে ইহার বীজ পাত দিয়া যথানিয়মে উৎপন্ন করিয়া, চারাগুলি স্থানান্তর করণযোগ্য বড় হইলে, ক্ষেতে বা পটিতে ১ বা ১। হাত ব্যবধানে সেগুলিকে যত্ন সহকারে রোপণ করিবে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস ধরানী রদিন স্নতরাং জমিতে যথেষ্ট জলসেচন করা উচিত।

### লাল-শাক ( *Amaranthus gangeticus* )

লাল-শাক,—নানা জাতীয় নটে, ডেকো প্রভৃতির সমবর্গীয় উদ্ভিদ। লাল-শাক গাছগুলির প্রকৃতি জৈবৎ চেলা। রন্ধন করিলে উহা হইতে প্রচুর রং নির্গত হয় এবং ভক্ষণকালে হাতে রং লাগিয়া যায়। অতি সুখরোচক ও কোমল শাক বলিয়া সকলের প্রিয়।

যে সকল উদ্ভিদ হইতে শাক অর্থাৎ কচি পত্র, কাণ্ড প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হয় তাহাদিগের আবাদের জন্য মাটি রসধারক, দোয়ীশ ও সারাল হওয়া প্রয়োজন। ঈদৃশ মাটির গাছ অতি বৃদ্ধিশীল হয়, তাহার ফলে পত্রদণ্ডাদি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার ও রসাল হয় এবং তাহার তন্তুতা কম হয়। অন্তথা গাছের বৃদ্ধি মন্থর হয়, তন্নিবন্ধন অনেক দিন জমিতে না থাকিতে পাইলে আহরণোপযোগী হয় না। এইরূপে দীর্ঘকাল বাহিরে থাকিবার ফলে উদ্ভিদের অবয়ব, - পত্র, ডগা প্রভৃতি শক্ত হইয়া যায়, সেই সঙ্গে কোমলতা আত্মদণ্ড বিকার প্রাপ্ত হয়। এই সকল কারণে শাক জাতীয় উদ্ভিদের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে গোবর, খৈল, গবাদি পশুশালায় সঞ্চিত পুরাতন সার সমধিক পরিমাণে নিয়োজিত করা উচিত। কেবল তাহাই নহে। কোদাল দ্বারা ৮।১০ ইঞ্চি মাটির ভিতর পর্য্যন্ত কুদালিত এবং উত্তমরূপে চুর্ণীত করিয়া উপরোক্ত সার প্রসারিত করতঃ মাটি ও সার উত্তমরূপে মিশাইয়া ফেলিতে হইবে।

ফাস্কন-চৈত্র মাস হইতে আষাঢ় মাসের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত বীজ বুনিতে পারা যায়। ফাস্কন হইতে জ্যৈষ্ঠমাস পর্য্যন্ত সাধারণতঃ মাটি বড় নীরস থাকে সেইজন্য এ সময়ে বীজ বপন করিতে হইলে বপনের পূর্ব্বদিন বীজ পাতনের জন্য নির্দিষ্ট পাটতে—আয়তন বুঝিয়া ২।৪ ঘড়া জলসেচন করিয়া রাখিলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুদালিত সমগ্র মাটি সরস হইয়া উঠে।

লাল-শাকের বীজ অতি ক্ষুদ্র, চিকণ মসিবর্ণের এবং পিচ্ছিল। উহার বীজ সমভাবে বপন করা যায় না, এই জন্য বপনের পূর্ব্বে উহার সহিত ৫।৭ গুণ মাটি মিশাইলে বীজগুলি পাতলা হয় এবং এই অবস্থায় সেই বীজ-মিশ্রিত মাটি পাতে ছড়াইলে বীজ সকল সমভাবে পতিত না হইয়া ছড়াইয়া পড়ে, ফলতঃ অস্বুরিত হইলে স্থানান্তর হয় না।

অতঃপর পট্টের মাটিকে একবার বিচলিত করিয়া একখণ্ড তক্তা বা কাগজ দ্বারা ঢাপিয়া দিবার পর বীজগুলি ধীরে ধীরে পাতলাভাবে ছড়াইয়া দিয়া, পুনরায় তাহার উপর কাগজ প্রসারণ পূর্বক তত্ত্বপরি হস্ত পরিচালনা করিতে হয়। এইরূপে আবরিত হইলে বৃন্তিকার ক্ষতি কমিয়া যায়, মাটি ও বীজ অস্বাভাবিক দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়, মাটির রস তদ্ব্যবহৃত হইতেই বীজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিম্নিত্র ক্রমের পুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হয়। অতঃপর কুরা বা লঘু মাটি কিম্বা অনতিশুদ্ধ পাতাসার বা গোবর-মাটি দ্বারা বীজ-তলা ঢাকিয়া দিতে হইবে। এক্ষণে আরও একবার পূর্ব-বৎ কাগজ প্রসারণ পূর্বক তত্ত্বপরি হস্তচালনা করিবে। ক্ষুদ্র বীজ বপনের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায় এবং নিয়ম। এসময়ে বীজরোপিত স্থানে সাক্ষাৎ সূর্যোত্তাপে এবং বৃষ্টির দাপটে ক্ষতি হয়,—বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয়, রসের অভাব হয় ইত্যাদি। কিন্তু যাহাতে সেরূপ ঘটতে না পারে তদ্ব্যবস্থায় পূর্বাঙ্কে বীজ-পাতের উপরে বিচালী প্রসারিত করিয়া দিতে হয়। এইরূপে বিচালী আবৃত রাবিলে মাটির রস ও উত্তাপের সমতা রক্ষিত হয় এবং যে উত্তাপ উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশ যথাস্থানে থাকে, ফলতঃ অঙ্কুরোদগমের সুবিধা হয়।

তিন দিনের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ভূপৃষ্ঠোপরি কল উদগত হয়। এক্ষণে বিচালীর আবরণ অপসৃত করা আবশ্যিক। অতঃপর অপরাহ্নে অতি সাবধানে জলসেচন করিতে হইবে। বারিপাতের দাপটে কোমল চারা আহত হইতে পারে এই জন্য জলসেচনে সতর্কতার প্রয়োজন। এক্ষণে যত্নের সহিত লালনপালন করিলে ২০।২২ দিনের মধ্যে চারাগুলি ২।৩ অঙ্গুলি উচ্চ হইয়া উঠিবে এবং বলসক্কর করিবে। উক্ত ২০।২২ দিন কাল বীজ-তলার থাকিলে মধ্যে মধ্যে উত্তমরূপে জলসেচন করিবে এবং মাটি বসিয়া গিয়াছে মনে হইলে বংশ-শলাকা দ্বারা মাটি খুঁড়িয়া দিতে

হইবে। খুঁড়িবার সময় চারাগাছের কোনরূপ অনিষ্ট না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

চারাগুলি ৩৪ অঙ্গুলি বড় হইয়া উঠিলে উত্তম সারাল পটীর মধ্যে এক হাত অন্তর সারিতে আধ হাত হইতে পৌনে ১-হাত ব্যবধানে চারা রোপণ করিতে হইবে। সূর্যাস্তকালই চারা রোপণের উত্তম সময়। এক্ষণ হইতে মধ্যে মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বারিসেচন করিয়া সমগ্র মাটি উত্তমরূপে ভিজাইয়া দেওয়া উচিত। এইরূপে জলসেচন করিলে ১০।১৫ দিন অন্তর জলসেচন করিলে চলিতে পারে, নতুবা প্রতিদিন জলসেচন করিতে হয়। প্রথমোক্ত উপায়ই অবলম্বনীয়।

ঐজ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে প্রায় ঝুটি হইয়া থাকে স্নতরাং এ সময়ে বীজবপন করিতে হইলে বীজ-পাত আবশ্যিক হওয়া উচিত নতুবা ঝুটিতে বপিত বীজ এবং মাটি—উভয়ই বিচলিত হইতে পারে।

### পুতিকা বা পুঁই ( Malabar Nightshade )

আবাদী পুতিকার দুইটি জাতি আছে—সাল-পুঁই, ও সাদা বা হরিৎ-পুঁই। অল্প এক জাতীয় পুঁই যেখানে-সেখানে স্বতঃই জন্মে, তাহার নাম—বন-পুঁই এবং তাহা অব্যবহার্য। পুঁই,—গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের লতা। বর্ষাকালের গাছ স্বভাবতঃ দীর্ঘ, তেজাল ও প্রসারিণী-লতা হইয়া থাকে। মাটি সারাল হইলে ডাঁটা, ডগা ও পাতা স্থূল, রসাল ও শালাল হয়। এ সময়ের লতাদিগকে কুটিরের চালে, কোটার ছাদে কিম্বা মাচান বা বেড়ায় সংলগ্ন করিয়া দিলে বিস্তর শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট হইয়া সুবিস্তৃত লতা হয়। গ্রীষ্মকালের গাছে প্রচুর জল সেচন করা প্রয়োজন। উভয় সময়েই মাটি সারাল হওয়া উচিত। গৃহস্থালীর পুরাতন ওঁচলা, ধোয়াড় বা গোয়াল-ঘরের আবর্জনা—ইহার উত্তম সার।

হাপোরে চারি অঙ্গুলি অন্তর বীজ পুতিয়া চারা উৎপন্ন করিয়া চারা-গুলি ৪৫টা পাতাযুক্ত হইলে ক্ষেতের স্থানে স্থানে মাদা করিয়া রোপণ করিতে হইবে কিম্বা সারবন্দিভাবে ৫১৬ হাত অন্তর রোপণ করিলেও চলে। ইহাদিগের জন্ত মাচান করিয়া দেওয়া উচিত। গ্রীষ্মকালের গাছের জন্ত মাচান না করিলেও চলিতে পারে কারণ সে সময় তৃণাদির তত প্রাচুর্য্য থাকে না। গ্রীষ্মকালের গাছে প্রচুর জলসেচন করিতে হইবে।

পুতিক পালনের জন্ত একটি প্রণালী আছে। এতদ্ব্যতীত নিম্নে ক্রমে নিয়মিত স্থান ব্যবধানে এক হাত চওড়া এবং আধ হাত বা পোণে এক হাত গভীর একটি নালা খনন করিতে হয়। অতঃপর বীজ বপনের কিছুদিন পূর্বে গোশালা, আস্তাবোল প্রভৃতির সম্মার্জিত জঞ্জাল দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া মাটি চাপা দিয়া রাখিতে হয়। অতঃপর যথাসময়ে সেই সারিতে ৪৫ হাত অন্তর বীজ কিম্বা চারা পুতিয়া দিবে। গ্রীষ্মকালে উক্ত সারি জল প্লাবিত করিয়া দিতে হইবে। পট, মাদা, প্রভৃতি সর্বদা নিষ্কণ রাখিবার চেষ্টা করা উচিত।

পুইগাছ পিচ্ছিল রস বা লাল পূর্ণ, ভোজনকালেও তাহা বুঝা যায়। কুটীত শাকে লবণ মাখাইয়া কটাহে বা হাঁড়িতে সিদ্ধ করিলে উহা হইতে অনেক রস নির্গত হইয়া আসে। স্বরগ থাকে যে, উহা বিনা জলে এবং পাত্রের মুখ ঢাকিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। এইরূপে ক্ষণকাল সিদ্ধ হইলে যে রস নির্গত হয় তাহা ফেলিয়া দিলে শাকের পিচ্ছিলতা অনেকটা কাটিয়া যায়। অনন্তর সেই সিদ্ধ শাক লইয়া তৈল মসলাদি দ্বারা ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে হয়।

## বিলাতী-কুমড়া বা মিঠে-কুমড়া ( Pumpkin )

বিলাতী-কুমড়া সংস্কৃত ভাষায় কৰ্কার নামে অভিহিত, কিন্তু কৰ্কার শব্দের বিবরণপাঠে কুম্ভাও বুঝায়, অথচ কুম্ভাও অর্থে আমরা সাঁচি বা চাল-কুমড়া বুঝিয়া থাকি। এ সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ রহিল। ইহা ভারতের দেশজ উদ্ভিদ কি না তাহাও বলা যায় না। ইহার সঙ্গে বিলাতী শব্দ সংযোজিত হইল কেন তাহাও বুঝা যায় না। যাহা হউক, আমাদের কার্যসিদ্ধির জন্য বিলাতী বা মিঠে কুমড়া শব্দ ব্যবহার করিব। ইহার হিন্দী নাম—কাদমা বা মিঠেকহু। কুমড়ার আকার জাতি এবং পরিচর্যাভুসারে এক-আধ-সের হইতে এক মণের অধিক বড় ফল হইয়া থাকে, কিন্তু যে সকল গাছে বৃহৎ ফল তাহাতে অধিক ফলন হয় না। বৃহদাকারের কুমড়া কণ্ঠ বা বজ্র-বাড়ীতে সাজায় দেয়; কিন্তু গৃহস্থবাড়ীর ব্যবহারের জন্য বৃহৎ অপেক্ষা মাঝারি আকারের কুমড়া স্পৃহনীয়।

এক গাছে বৃহদাকার ফল ৩৪টির অধিক হয় না, এবং সে ৩৪টি ফলও পরস্পর সমতুল্য হয় না। বিগত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ঘরবঙ্গরাজের রাজনগরের সবজীবাগানে একটা কুমড়া গাছে ৪টি মাত্র ফল হইয়াছিল। উক্ত ফল কয়টির মধ্যে একটির ওজন আটচল্লিশ সের এবং অপর ৩টির প্রত্যেকের ওজন ২৫৩০ সের মাত্র হইয়াছিল। কিরূপ স্থান ও কিরূপ মাটিতে জন্মিয়াছিল বলিয়া রাখি কারণ তাহা পাঠকদিগের কাজে লাগিতে পারিবে। পুষ্করিণী খোদিত ভরাট মাটিতে উহা আপনাই জন্মিয়াছিল। কেহ বীজ বা গাছ রোপণ করে নাই, দৈবক্রমে বীজ কিরূপে তথায় আসিয়া পড়িয়াছিল। গাছটা একটা বেলগাছের নিরে জন্মিয়াছিল সুতরাং তাহাকে সেই বেলগাছেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়া হয়।

কুমড়ার আকার এক প্রকার নহে,—কোন জাতির ফল ছোট থাকিয়া



বা বালিশের জ্বায়, কোন জাতির ফল গোলাকার, আবার কোন জাতির লম্বা বা গোল হইয়া খাঁজ বা পল-বিশিষ্ট ফল হয়। যাহা হউক, ইহাতে কিছু আসিয়া যায় না। কসলের সময়ানুসাৎ কুমড়াকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভাগ করা যায়। এক জাতি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলে, অপর জাতি আষাঢ় হইতে কার্তিক মাস পর্য্যন্ত; তৃতীয় জাতি কার্তিক হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ফলিয়া থাকে, সুতরাং বিবেচনা করিয়া বিশেষ বিশেষ জাতীয় কুমড়ার আবাদ করিলে বারমাস ফল পাওয়া যাইতে পারে। বৈশাখী-কুমড়ার বীজ মাঘ মাসের প্রথম ভাগে, শারদীয় কুমড়ার বীজ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে, এবং মাঘী কুমড়ার বীজ আষাঢ় মাসে, বপন করিতে হইবে। ঋতু-বিশেষে কুমড়া লতিকার বৃদ্ধির ইতরবিশেষ হইয়া থাকে, সেইজন্য বৈশাখী জাতীয় গাছের লতিকা অপেক্ষা কম বৃদ্ধিশীল। গ্রীষ্মকালে একদিকে সূর্যের প্রখর উত্তাপ, অন্যদিকে ভূগর্ভে রস কম থাকে, এই দুই কারণে এ সময়ের গাছ অধিক বাড়ে না। উক্ত জাতীয় গাছের জন্ম ৭৮ হাত অন্তর ১-হাত ব্যাসের এক হাত গভীর গর্ত করিয়া যথানিয়মে মাদা বা থালা করিতে হইবে। সেই থালার মাটির সহিত খোঁয়াড়ের আবর্জনা উত্তমরূপে মিশাইয়া দৃঢ়রূপে চাপিয়া দিতে হয়। অতঃপর, মাদার উপর ত্রিকোণাকারে অর্থাৎ তিনদিকে তিনটা বীজ পুতিয়া দিতে হয়।

শারদীয় জাতির গাছসবুহ বর্ষা পায়, সেই জন্ম অতিশয় দ্রুতবৃদ্ধিশীল হয়। ইহাদিগকে যথাসময়ে উল্লিখিত নিয়মে ১০-হাত অন্তর থালায় বপন করিবে। মাঘী-জাতীয় কুমড়ার জন্ম এই নিয়ম অবলম্বনীয়। বর্ষাকালে ইহার শীত শীত তৃণাদি আগাছা দ্বারা ঢাকিয়া যায়, ফলতঃ তাহাদিগের বৃদ্ধির ক্ষতি হয়; কিন্তু মাদার মাটি সারাল হইলে গাছগুলি খুব শীত ক্ষেত্রময় প্রসারিত হইয়া পড়ে, তখন আর তৃণাদি জঙ্গল উহা-

দিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না, বরং তাহাদের বিস্তারের ফলে তৃণাদির বৃদ্ধি একবারে স্থগিত হইয়া যায়।

মাচায় কুমড়া গাছের সুবিধা হয় না, কারণ কুমড়ার গাছই স্বভাবতঃ অতিশয় ভারী। অতঃপর কয়েকটি কুমড়া জন্মিলেই মাচান নামিয়া পড়ে কিম্বা ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা। এইজন্য কুমড়ার জায় বৃহৎ ও ভারী সতিকাদিগকে ভূপৃষ্ঠেই প্রসারিত হইতে দেওয়া ভাল।

ভূমিতে বপন করিবার পূর্বে বীজগুলি ১০।১২-ঘণ্টা জলে নিমজ্জিত রাখিলে শীঘ্রই অঙ্কুরিত হয়। চারাতে প্রয়োজনমত প্রৈতিদিন কিম্বা ২।১ দিন অন্তর অপরাহ্নে প্রচুররূপে জল দিবে। বর্ষাকালে গাছে জল দিতে হয় না। ষাট বর্ষ আগত না হয় তাবৎ জল দেওয়া বিধি।

গ্রীষ্মকালে গাছের জন্ত মাচা আবশ্যক হয় না, কারণ তখন মাটি শুষ্ক থাকে সুতরাং গাছে ফল ধরিলে কোন অনিষ্ট হয় না; কিন্তু বর্ষার গাছে মাচা করিয়া না দিলে অথবা ঘরের চালে গাছ উঠাইয়া না দিলে ভূশায়ী ফল সকল ভূমির আর্জতাহেতু পচিয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ১৮০২ সালে মুরসিদাবাদে রেইলবাগে বর্ষাকালে কয়েকটি গাছে বড় বড় এবং প্রচুর কুমড়া হইয়াছিল, কিন্তু ভূমির নিয়তানিবন্ধন মাটি নিরন্তর সিক্ত থাকিত বলিয়া বিস্তর ফল খারাপ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কয়েকটি ফলের নিম্নে টাল ও ইষ্টক পাতিয়া দিবার বন্দোবস্ত করায় সেগুলি রক্ষা পাইয়াছিল। বৃহৎ ক্ষেত্রে উহা সুবিধাজনক নহে। তবে দেখিতে হইবে, যেন জমিতে জল সঞ্চিত না হয়, কিম্বা জঙ্গলাদি না জন্মে।

গাছ হইতে যত শীঘ্র ফল সংগ্রহ করিয়া লওয়া যায় তত অধিক ফল জন্মে, সুতরাং ফলের পরিপুষ্টি শেষ হইলেই তাহাকে ঘরে আনা উচিত। ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্ত অধিক দিন রাখিতে হইলে সুপক্ক ফল রাখা কর্তব্য।

সুপক ফল গৃহমধ্যে শিকায় ঝুলাইয়া রাখিলে অনেক দিবস পর্য্যন্ত ভাল থাকে। ভোজনের পক্ষে কচি ও অর্ধপক ফলই উপাদেয়। পাকা ফল দেখিতে বড় হয় সত্য, কিন্তু সে সময়ে উহাতে একটা অপ্রীতিকর গন্ধ হয়। সুপক কুমড়া মিষ্ট হয়। চৈত্র মাস হইতে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত কুমড়া যজ্ঞ বা কৰ্ম্মবাড়ীর প্রধান তরকারী,—অধিক কি কুমড়া না থাকিলে হয় ত এই কয় মাস কোন ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন হইত না।

### সাঁচি বা চাল-কুমড়া (White gourd)

সংস্কৃত ভাষায় ইহা কুম্বাণ্ড নামে অভিহিত। ইহা হইতেই কবিরাজ মহাশয়গণ কুম্বাণ্ড-খণ্ড প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। সাঁচি-কুমড়াতে যে কেবল তরকারী হয় তাহা নহে। সাঁচি কুমড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া সিদ্ধ করতঃ চিনিতে পাক করিলে যে বন্ফী হয়, তাহা অনেক রোগের ঔষধ ও পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরাতন কুমড়ার মূল্য অধিক, সেই জন্য অনেকে উক্ত কুমড়া গৃহমধ্যে শিকায় ঝুলাইয়া কিম্বা ঘরের চালে রাখিয়া দেয়। পল্লীগ্রামে প্রায় সকল গৃহস্থের চালেই কুম্বাণ্ড গাছ দেখা যায় বলিয়া ইহার অপরা নাম চালকুমড়া।

সাঁচিকুমড়ার বীজ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করিতে হয়। সাধারণ বাগান বা উচ্চ ভূমিতে ৫৬-হাত অন্তর এক-একটা মাদা তৈয়ার করিয়া দুইটা সুপক বীজ বপন করিবে। মাটি সরস হইলে ৫৬ দিন মধ্যে বীজ হইতে চারা উৎপত্ত হয়। বপিত হইবার পূর্বে বীজগুলিকে ১০।১২ ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া লইতে পারিলে বীজ অপেক্ষাকৃত শীঘ্র অঙ্কুরিত

হইয়া গেলে কাঠ বা বংশ শলাকা দ্বারা উকাইয়া দিতে হইবে। গাছের জন্ত মাচা করিয়া দিবে কিম্বা ঘরের চালে গাছ উঠাইয়া দিবে। মাচার গাছ উঠিলে যখন তাহাতে ফল হইবে, তখন প্রত্যেক ফলের জন্ত একটা শিকা করিয়া দিবে নতুবা ফলের ভারে গাছ ঝুলিয়া পড়ে অথবা প্রবল বাতাসে ছিঁড়িয়া যাইতে পারে।

সাঁচি-কুমড়া যখন ছোট থাকে, তখন তাহার গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম লোম বা সোঁয়া থাকে, কিন্তু ফল বড় হইলে ক্রমে তাহা ব্যরিয়া গিয়া কুমড়ার সমগ্র গাত্রে এক প্রকার চক-খড়ির গুঁড়ার ছায়া পদার্থ দেখা যায়। তখন ইহাতে হাত দিলে সেই গুঁড়া হাতে লাগিয়া যায়। শ্রাবণ-ভাদ্র মাস হইতে কুমড়া ফলিতে থাকে। তরকারীতে ভক্ষণ করিতে হইলে কচি অবস্থাতেই গ্রহণ করা ভাল। পাকা কুমড়ার শস্ত বা শাঁস বাহির করিয়া জীলোকেরা নানাবিধ বড়ি তৈয়ার করিয়া থাকেন। উক্ত বড়িকে কুমড়া-বড়ি কহে। তরকারির সহিত কুমড়া-বড়ি সতি উপাদেয় হইয়া থাকে।

### তেলাকুচা ( *Coccinea grandis* )

তেলাকুচা গাছ যথা-তথা স্বতঃই জন্মে বলিয়া উহা ঔষধানিক উদ্ভিদ-রূপে পরিগণিত হয় নাই। নিম্নবঙ্গে বারমাসি নানাবিধ তরিতরকারী উৎপন্ন হয় বলিয়া তেলাকুচা সস্র উদ্ভিদ আমাদের নিকট অবজ্ঞাত। বেহার অঞ্চলে, অনেকের বাগানে বা অগ্নিনায় তেলাকুচা যত্নপূর্বক রোপিত হয়, এবং তাহার লতিকা ও ফল তরকারিতে ব্যবহৃত হয়।

তেলাকুচার বীজ ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং সুপক্ক ফল

কোমল করিয়া কীট দূরীকরণ করিলে সহজেই চারা উৎপন্ন

হইতে পারে। কানুন-চৈত্র ও বৈশাখ—এই তিন মাসের মধ্যে যে কোনও সময়ে বীজ বুনিলে চারা উৎপন্ন হয়। চারা গাছে ৫৬টি পাতা জন্মিলে প্রাচীর বা বেড়ায় নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিতে হয়। ইহার অন্ত কিছু পাট নাই।

সাধারণতঃ আনাচে-কানাচে তেলাকুচা গাছ স্বতঃই উৎপন্ন হয়। সেই গাছের গেঁড় বা মূল আনিয়া রোপণ করিলেও চলিতে পারে। গাছ বড় হইলে গোড়া হইতে যে সকল ফেঁকড়ি জন্মে তাহা কাটিয়া রোপণ করিলেও চারা উৎপন্ন হয়।

লাউ, বিজে প্রভৃতি কোন কোন সব্জীর একটা নিকৃষ্ট জাতি আছে তাহাদিগের ফলের স্বাদ তিক্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ তেলাকুচারও একটা তিক্ত জাতি আছে, সুতরাং বিবাদ জাতির গেঁড় বা বীজ ব্যবহার করা উচিত নহে। গাছের বীজ বা গেঁড় রোপণ করিতে হইলে অগ্রে তাহার ফল চাকিয়া দেখা উচিত।

গাছের গোড়ায় সাধারণ সার গুঁচলা বা আবর্জনা দিলেই চলিতে পারে। রাজ-দারতাকার রাজনগরের সব্জীক্ষেত্রের একপার্শ্বে একখণ্ড ভূমিতে নিয়মিতরূপে প্রতি বৎসরই তেলাকুচার আবাদ করিতে হইত। ইহার ফল এবং কচি ডগা ও পাতা তরকারীতে ব্যবহার্য। সুপক্ক ফল গৃহপালিত পক্ষীদিগের খাদ্য।

একবার রোপণ করিলে ২৩ বৎসর গাছ বাঁচিয়া থাকে এবং যথা-সময়ে ফল প্রদান করে। প্রথম বৎসরে ফলন শেষ হইলে, পর বৎসর মাঘ মাসে গাছের মূল শাখাগুলির এক হাত আন্দাজ রাখিয়া অবশিষ্টাংশ ছাঁটিয়া দিতে হইবে।

## কাঁকুড় ( *Cucumis melon* var. *Utilissimus*.)

কাঁকুড়,—শলা, ফুটী প্রভৃতির সমবর্গীয় জাতিবিশেষ ; কিন্তু তরমুজের স্তায় পাকা থাইতে তাদৃশ সুমিষ্ট লাগে না। এই জন্ত সচরাচর তরকারীতে ব্যবহার হয়। কচি-কচি কাঁকুড় কাঁচা থাইতে মন্দ লাগে না।

পলি-পড়া চর ভূমিতে কাঁকুড় ভাল জন্মে। আশ্বিন মাসে চর হইতে জল সরিয়া গেলে এবং মাটিতে ঘো হইলে কাঁকুড় বীজ বপন করিতে হয়। অতি উত্তমরূপে জমি চষিয়া আড়াই হাত অন্তর ৪।৫ ইঞ্চি গভীর জুলি করিবে ও দুই জুলির মধ্যবর্তী স্থান ঈষৎ উচ্চ করিবে এবং দুই দিক ঢালু করিবে। তদনন্তর সেই জুলির মধ্যে ২।৩ হাত অন্তর ২।৩টা বীজ বপন করিবে। মাটি রদা না থাকিলে দুই-এক দিবস তাহাতে জলসেচন করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে। ইহাতে জল আর আবশ্যক হয় না।

চৈত্র-বৈশাখ মাসে আর এক দফা কাঁকুড়ের বীজ রোপিত হয়। এ সময়ের কাঁকুড় বর্ষাকাল পর্য্যন্ত ফলিয়া থাকে। ইহার বিশেষ কোন পাটি নাই।

## ঝিঙ্গে ( *Luffa acutangula* )

ইহাকে রাম-তরাইও কহে। বর্ষাকালের ইহা একটা প্রধান তরকারি মধ্যে গণ্য। কচি ঝিঙ্গের আত্মী পটোলের স্তায়। উহার এক একটা ফল এক হাত বা পাঁচ পোয়া পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। ফল অতিরিক্ত বড় হইলে কিম্বা অনেক দিন গাছে থাকিলে ছিবিড়াবিশিষ্ট হইয়া যায় এবং বীজগুলিও শক্ত হইয়া যায়। ঝিঙ্গের কচি অবস্থায় চক-চড়িতে

মাঘ মাসে ভূঁয়ে বিজের এবং বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে পালা-  
বিজের বীজ বপন করিতে হয়। ভূঁয়ে বিজের লতা অধিক দীর্ঘ হয়  
 না; সুতরাং ভূপৃষ্ঠোপরি লতাইয়া থাকে, কিন্তু পালা-বিজের লতা  
 বিস্তৃত হয় এবং বর্ষায় অতি বৃদ্ধিশীল হয়, এইজন্ত ইহাদিগকে মাচার  
 নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। ভূঁয়ে-বিজের জন্ত ক্ষেতে ৪।৫ হাত  
 অন্তর মাদা করিয়া প্রত্যেক মাদায় ২।৩টা বীজ বপন করিবে এবং অন্যান্য  
 বীজের স্থায় ইহাতেও জলসেচন করিবে। বিজে লতাইবার স্থান দেওয়া  
 উচিত। মাচাতে ফল লম্বা হয়, আর জমিতে যে সকল গাছ লতাইয়া  
 যায়, তাহাদিগের ফলের কোন নিয়ম নাই, তবে মাচার ফলের স্থায়  
 অধিক লম্বা হয় না। পুষ্করিণীর কিনারায় গাছ পুতিয়া জলের উপরে  
 মাচা করিয়া দিলে সে গাছ খুব তেজাল হয় এবং তাহাতে অধিক এবং  
 বড় বড় ফল হয়। যেখানে দুই চাক্রিটা গাছের প্রয়োজন সেখানে  
 মাচার উঠাইয়া দেওয়া ভাল, কিন্তু যথায় অধিক গাছ রোপিত হয়,  
 তথায় সকল গাছের জন্ত মাচা করিয়া দেওয়া অসম্ভব, সুতরাং জমিতেই  
 লতাইতে দেওয়া উচিত। এই জন্ত জমি সর্বদা পরিষ্কার থাকা নিতান্ত  
 প্রয়োজন।

বিজের মধ্যে অল্প এক জাতি আছে, তাহার ফল অতিশয় তিক্ত  
 হইয়া থাকে। এইজন্ত পরিচিত লোকের নিকট হইতে ভাল জাতির  
 বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে। নিজের ক্ষেত্রের যে বীজ রাখিবে তাহা যেন  
 ভাল জাতির হয়। ক্ষেত্রে যদি তিক্ত বিজের গাছ জন্মিয়া থাকে, তাহা  
 হইলে তাহার মুলোৎপাটন করিয়া ফেলিয়া দিবে, নতুবা ভ্রম ক্রমে  
 তাহার বীজও ভাল জাতির বীজের সহিত মিশিয়া যাইতে পারে।

## পটোল ( *Trichosanthes dioeca* )

বাঙ্গালী গৃহস্থের পক্ষে পটোল একটা উপাদেয় তরকারি। কিন্তু ইহার আবাদে পরিশ্রম ও সাবধানতার আবশ্যক। হিন্দী ও ইংরাজীতে ইহা পলবল ( pulwal ) নামে অভিহিত।

সচরাচর দুই জাতীয় পটোল দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, এক জাতীয় ধূসর বর্ণের, তাহার নাম—মুরসিদাবাদী পটোল। ইহার বিশেষ স্বাদ নাই, কিন্তু বাজারে এই জাতীয় পটোলেরই যথেষ্ট আমদানী হয়, ইহার মূল্যও অপেক্ষাকৃত স্থূল। মুরসিদাবাদ অঞ্চলে এই জাতীয় পটোলেরই প্রাচুর্য্য অধিক, আবাদও অধিক। ইহার খোসা বা ত্বক অপেক্ষাকৃত স্থূল। অপর জাতীয় ডোরাদার পটোল সকলের আদরের বস্তু। এই জাতির নাম,—বালির পটোল। ইহার স্বাদ মধুর, বাস প্রীতিকর। বাঙ্গালার মধ্যে কাঁচড়াপাড়ার পটোল স্বনামখ্যাত কিন্তু অনেক জেলায় আবাদ হইয়া থাকে। ডোরাদার পটোল ভৰ্জিত হইবার সময় যে স্থূলর গন্ধ প্রসারিত হয় তাহা লোভনীয়। ভাজা, ডালনা দম, কালীয়া ছোঁকা, চাটনী, মাংস—সকল প্রকারেই পটোল নিয়োগযোগ্য। এবং যে কোন ব্যঞ্জনে সংযোজিত হটক, তাহা অতি উপাদেয় হয়। ইহার একটা বিশেষত্ব এই যে, সকল ব্যঞ্জনেই ইহা আপন বিশিষ্টতা স্বাদ ও সুগন্ধ দ্বারা প্রতিপন্ন করে।

নব্ব্বাপে এক জাতীয় পটোল জন্মে, তাহা স্বতন্ত্র জাতীয় বলিয়া মনে হয়। উক্ত পটোল খৰ্কাকার, তত শাঁসাল নহে, কিঞ্চিৎ তেমন সুস্বাদু নহে। চেষ্টা করিলে বালির পটোল অনায়াসে উৎপন্ন করিতে পারা যায় অথচ স্থানীয় লোকেরা সেই খৰ্কাকৃতি, স্থূল ত্বক সুগন্ধ বিহীন পটোলের আবাদ করে কেন তাহা বুঝা যায় না।



এবং ঈদৃশ জমিতে পটোল যেরূপ বৃহৎ, সুস্বাদ ও সুগন্ধ হয়, অন্ত কুত্রাপি সেরূপ হয় না। তাহা ব্যতীত ভূগর্ভোদ্ধিত নূতন মাটিও পটোলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

ষারভাঙ্গা-রাজের বহোর পরগণার অন্তর্ভুক্ত রাজনগরে একখণ্ড পটোলক্ষেত ছিল, তাহার আয়তন ৭।৮ বিঘা। কমলা নদী হইতে ৪০০ হাত দূরে অৱস্থিত, মাটি স্বভাবতঃ বেলে। উক্ত-ভূমি খণ্ডের এক দিকে একটা পুষ্করিণী খোদিত হইয়াছিল এবং মাটি উক্ত ক্ষেত্রের একাংশে প্রসারিত করা হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে ডোরাদার জাতীয় অর্থাৎ বালির পটোলের গেঁড় আনা হইয়া তাহাতে আবাদ করিয়াছিলাম। সেই জমিতে যেরূপ পটোল উৎপন্ন হইত, এরূপ পটোল কোথাও দেখি নাই। সেই সকল পটোল দীর্ঘে ৬-ইঞ্চি এবং মধ্যস্থলের বেটনী ৫-ইঞ্চি হইতে ৬-ইঞ্চি হইয়াছিল। তাহার স্বাদও এমন উপাদেয় হইয়াছিল যে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ইহা দেশের মাটির গুণ।

পটোলের মূল ভূগর্ভে এক হাত হইতে দুই হাত পর্যন্ত নিয়ে প্রবেশ করে। এই নিমিত্ত পটোলক্ষেতের মাটি গভীর, হাল্কা ও বেলে হওয়া স্পৃহনীয়। মাটি কঠিন, ভারি বা ভাসা হইলে তাহাতে পটোলের আবাদ করিয়া সুবিধা হয় না। অপরন্তু সাধারণ জমি অপেক্ষা পটোলক্ষেত উচ্চ হওয়া উচিত। বর্ষাকালে যে জমি জলে ডুবিয়া যায়, অথবা যে জমি স্বভাবতঃ সিক্ত এবং মাটি আটাল,—পটোলের পক্ষে তাহা অতি নিকৃষ্ট। এইজন্য স্বভাবতঃ উচ্চ, শুষ্ক ও লঘু জমিতে পটোলের আবাদ করা উচিত। বালুকা-প্রধান নোয়াঁপ মাটি পটোলের পক্ষে প্রশস্ত।

ক্ষেত্রের চতুর্দিকে বৃহৎ গাছ না থাকে, এরূপ স্থানে পটোলের আবাদ করা উচিত,—অন্ততঃ ক্ষেত্রের পূর্ব ও দক্ষিণ দিক মুক্ত থাকা আবশ্যক। উদ্ভিদ যাত্রের ই পূর্বদিকের আলোক বিশেষ উপকারী এবং দক্ষিণদিকের

আলোক উদ্ভাপবিশিষ্ট, স্মৃতরাং তদ্বারা জমিতে যথেষ্ট উদ্ভাপ ও আলোক পৌছে।

সাধারণতঃ কার্ত্তিক মাসে পটোল রোপণ করিতে হয়, কিন্তু বারমাস পটোলের আমদানি রাখিতে হইলে দুই খণ্ড ক্ষেতের ব্যবস্থা করা উচিত এবং তাহা হইলে এক খণ্ড ক্ষেতে কার্ত্তিক মাসে, অপর খণ্ডে পৌষমাসের শেষে আবাদ করিতে পারা যায় এবং তাহা হইলেই বারমাস পটোল পাওয়া যাইতে পারে। পটোল অগ্রে উৎপন্ন করিবার বাসনা থাকিলে অথবা তাহা বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে হইলে, যাহাতে পটোল অগ্রে জন্মে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মাঘ-ফাল্গুনে পটোল অনেক দামে বিক্রয় হয়। যে কৃষক সকলের অগ্রে বাজারে পটোল আমদানী করিতে পারে সে বিশেষ লাভবান হয়। অসময়ের পটোল প্রতি মণ ২৩।২৫ টাকায় বিক্রয় হয় কিন্তু যে সময়ে প্রচুর জন্মে তখন তাহার প্রতি মণ দশ আনা বার আনা বা এক টাকা হয়। অতএব লাভের জন্তই হউক, আর সাংসারিক ব্যবহারের জন্তই হউক, যাহাতে উহা অগ্রে জন্মে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

পটোল আবাদের জন্ত বর্ষাকালে বারষাৎ স্নগভীর চাষ দিয়া জমিতে 'পচান' দিতে হয়। জল্লাদি পচিয়া গেলে এবং বারষাৎ মাটি উলটপালট হইলে ক্ষেত্রের উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি হয়। অতঃপর বারষাৎ হলচালনা দ্বারা মাটি চূর্ণ করিতে হইবে। তৎপরে ক্ষেত্রে জুলি টানিয়া, জুলি-পরম্পর মধ্যস্থিত স্থানসমুদায় জৈব ও ঢালু করিতে হয়; তিন হাত অন্তর \* বা ব্যবধান রাখিয়া পটোলের জুলি প্রস্তুত করা উচিত এবং সেই জুলি আধ হইতে পৌনে এক হাতের অধিক গভীর করিবার প্রয়োজন হয় না।

যে মাটি উঠিবে তাহা দ্বারাই জুলি-পরস্পর-মধ্যবর্তী স্থান উচ্চ করিলেই জুলি কাটিয়া চলিতে পারে।

বর্ষা উত্তীর্ণ হইলে কার্তিক মাসের মধ্যে গেঁড় বা গোড়া রোপণ করা উচিত। উহার মূল ২১০ অঙ্গুলি দীর্ঘ থাকিলেই চলে, অধিক দীর্ঘ রাখিবার আবশ্যক হয় না।

পটোলের আবাদ পত্তনে তিনটি উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে :—  
১ম—গেঁড় রোপণ, ২য়,—বল্লরি লতা রোপণ, এবং ৩য়,—লতাগুচ্ছ রোপণ। পটোলের আবাদ করিবার জন্ত উল্লিখিত তিনটি উপায়ের মধ্যে যে কোনটি অবলম্বন করিলেই চলে, কিন্তু প্রথমটাই বিশেষ কার্য্যকরী এবং প্রচলিত।

**গেঁড়-রোপণ।**—ঈষৎ শিকড় সমেত গাছকে গেঁড় \* কহে। পুরাতন ক্ষেত হইতে গেঁড় সংগ্রহ করিয়া যথাস্থানে এক-একটি গেঁড় মাটিতে পুতিয়া দৃঢ়রূপে মাটি চাপিয়া দিবে; গেঁড়ের শিরোভাগ যেন মাটিতে চাপা না পড়ে—এমন করিয়া রোপণ করিতে হইবে; অতঃপর তাহার শিরোভাগ কতকগুলি টুকরা বিচালী দ্বারা চাকিয়া দেওয়া উচিত। ১০।১৫ দিন এইরূপ থাকিলে গেঁড়ের শিরোভাগ হইতে ফেঁকুড়ি উদ্গত হয়, তখন বিচালী অপসৃত করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা না করিলেও কোন ক্ষতি নাই। গেঁড়গুলি পুরাতন, স্থূল ও পরিপুষ্ট হওয়া প্রয়োজন। নূতন ও শীর্ণ গেঁড় হইতে গাছ জন্মিতে পারে কিন্তু তাহা আশামুরূপ বৃদ্ধিশীল ও ফলপ্রদ হয় না।

**বল্লরি-রোপণ।**—পটোলের পুরাতন লতা রোপণকে বল্লরি-রোপণ কহে। লতা সংগৃহীত হইলে ২১০ গাছা লতা লইয়া জুলির মধ্যে লম্বিতভাবে রাখিয়া মাটি চাপা দিবে। এহলে জুলি ৮ অঙ্গুলি গভীর হওয়া

\* পটোলের মূলকে 'গেঁড়' কহে।

উচিত। বাহা হউক, বল্লরি রোপিত হইলে জুলির মাটি ঈষৎ চাপিয়া দিতে হয়। ১০।১৫ বা ২০ দিনের মধ্যে লতিকা গাছের গ্রন্থিসমূহ হইতে ফেঁকড়ি বাহির হইয়া ভূপৃষ্ঠে দেখা দেয়।

**গুচ্ছ রোপণ।**—গুচ্ছ রোপণের অভিপ্রায় বল্লরি-রোপণ হইতে স্বতন্ত্র নহে, প্রণালী বিভিন্ন মাত্র। এতদ্ব্যতীত ২।৩ গাছা লতা জড়াইয়া গুচ্ছ বাঁধিতে হয় মাত্র। অনন্তর জুলির মধ্যে ২।৩ হাত অন্তর, ৮ অঙ্গুলি গভীর গর্ত মধ্যে সেই গুচ্ছ পুতিয়া দিবে। ইহাই গুচ্ছ রোপণ।

লতিকা অপেক্ষা গেঁড় রোপণ করিলে শীঘ্র ও অধিকতর তেজাল গাছ জন্মে। যে সকল লতায় পটোল জন্মে না, চলিত ভাষায় তাহাকে বাঁজা বা ‘ফেলা’ লতা কহে। এই সকল লতার গেঁড় বা গ্রন্থি হইতে যে গাছ জন্মে, তাহারা অফলা বা বাঁজা হয়, স্তত্রাং ঈদৃশ লতা রোপণ করা উচিত নহে। ঈদৃশ লতায় ফল জন্মে না, কারণ তাহাতে যে সমুদায় পুষ্প জন্মে, তাহারা পুংজাতীয়। এ জাতীয় গাছের স্বতন্ত্র চোকা বা পটি থাকিলে তাহা হইতে পত্র বা ডগা সংগ্রহের জন্ত ফলবতী গাছ ভাঙ্গিতে হয় না। কচি-ডগা ও ফেঁকড়িতে কয়েকটি উপাদেয় তরকারী হয়।

ফলন্ত লতাসমন্বিত ক্ষেত্র মধ্যেও কখন কখন ২।৪ টা গাছ অফলা হইয়া যায়। দৈব ঘটনার উপর মানুষের হাত নাই এবং ইহার কোন কারণ নির্দেশ করিতে পারা যায় না। অনেক পুরুষ ও রমণী বন্ধ্যা আছে তাহার কারণ কেহ নির্দেশ করিতে পারে নাই। গাছের বন্ধ্যাস্থ ও আমরা স্বীকার করিয়া লইব। ক্ষেত্র মধ্যে এরূপ গাছ আদৌ থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। রোপণকালে পটোলের লতার উপর অধিক মাটি চাপা না পড়ে, কেননা তাহা হইলে, নূতন অঙ্কুর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিতে বিলম্ব হয় এবং অনেক সময়ে উঠিতে পারে না। গাছ উগত হইলে, নিড়ানি-করণ তিন অঙ্গ বিশেষ পাট নাই। ক্ষেত্র প্রতি মাসে একবার নিষ্কণ করা

আবশ্যক। নিড়ানি করিবার জন্ত বালক বা স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিলে অল্প খরচ লাগে। চাষীদিগের মধ্যে এরূপ সংস্কার আছে যে, রাজিবাস-কাপড় পরিহিত হইয়া পটোল ক্ষেতে প্রবেশ করিলে ফসলের ক্ষতি হয়, ইহা একটা বাজে কথা। মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়ায় মাটি আলগা করিয়া দিতে হইবে। লতাগুলি পরস্পর জড়িত না হয়, এজন্য সময়ে সময়ে উহাদিগকে সরাইয়া দেওয়া আবশ্যক। ক্ষেত্র মধ্যে আদৌ তৃণাদি জন্মিতে দেওয়া নহে।

পটোলের গাছ দুই তিন বৎসর ফসল প্রদান করে কিন্তু প্রথম বৎসর সর্বাপেক্ষা অধিক ফসল জন্মে। দ্বিতীয় বৎসর তদপেক্ষা ঈষৎ কম ফলে কিন্তু ফল বড় হয়। নূতন আবাদ করিতে হইলে, যে ক্ষেত্রে একবার পটোল জন্মিয়াছে, তৎপর বৎসরেই তাহাতে আবার পটোল না দিয়া অন্য ক্ষেত্রে দিতে পারিলে ভাল হয়। সর্বোপায়ে নূতন পটোল আমদানী করিতে হইলে পূর্ব বৎসরের আবাদকে বজায় রাখিতে হয় এবং সে ক্ষেত্রে আশ্বিন-কার্তিক মাসে কুক্ষালিত করতঃ জললাদি পরিষ্কার করিয়া দিতে হয় এবং সেই সঙ্গে শুষ্ক পুরাতন লতাগুলিকে ছাটিয়া দেওয়া উচিত।

এক বিঘা পটোলের ক্ষেত্র হইতে বৎসরে ১০০ টাকারও অধিক আয় হইতে পারে এবং সম্বৎসরে ২০।২৫ টাকা ব্যয় হইলেও যথেষ্ট লাভ থাকে।

### উচ্ছে ( Bitter gourd. )

উচ্ছের আবাদ তিক্ত হইলেও ইহাতে নানাবিধ ঔষুকৃষ্ট ব্যঞ্জনাদি হইয়া থাকে। নিতান্ত বেলে-মাটি ব্যতীত অপর সকল মাটিতেই প্রায়

ইহা জন্মিয়া থাকে। ক্ষেতের ষথাবিধ পাট করিয়া তিন হাত ব্যবধানে এক-একটি মাদা করিয়া তন্মধ্যে ৩৪টি হিসাবে বীজ বপন করিয়া দুই এক দিন অন্তর বৈকালেই জলসেচন করিবে। ছয়-সাত দিনের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। গাছ বাহির হইলে মধ্যে মধ্যে গোড়ার মাটি 'খুসিয়া' দিতে হইবে। কার্তিক মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত বীজ বপন করিতে পারা যায়।

আকার ভেদে উচ্ছের দুইটি জাতি আছে ১ম,—গোলাকার; ২য়,—পুলি-পিষ্টক সদৃশ লম্বা, গোল এবং উভয় পার্শ্ব ক্রম-সূক্ষ্ম। এতদ্ব্যয়ের স্বাদ মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই।

চারাগুলি ঈষৎ বড় হইয়া উঠিলে যদি তন্মধ্যে শীর্ণ গাছ দেখা যায় তাহা হইলে তাহা তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। এক মাদায় কতকগুলি গাছ থাকিলে পরে ডগাগুলি পরস্পর জড়াইয়া যায়, সুতরাং তাহাতে ফল অধিক হয় না। এইজন্ত প্রতি মাদায় দুই তিনটির অধিক গাছ থাকা ভাল নহে। ইহা লতানিয়া গাছ। ইহার জন্ত অল্প মাচা করিয়া দিলে মন্দ হয় না। কিম্বা তাহাদিগের অবলম্বনের জন্ত মাদা বেঁটন পূর্ব্বক কঞ্চি বা অল্প পালা দিলে চলিতে পারে। এ সময়ে বর্ষা থাকে না, সুতরাং ভূমিতে লতাইয়া গেলেও ক্ষতি নাই। ফাল্গুন মাস হইতে ইহাতে ফল ধরিতে থাকে। উচ্ছের নামান্তর 'উচ্ছে'। কিন্তু উচ্ছে শব্দটি পূর্ব্ববদে চলিত।

### করলা (Balsam apple.)

করলা,—উচ্ছে জাতীয় এবং ইহার ফলও উচ্ছের ন্যায় কিন্তু উচ্ছে অপেক্ষা অনেক বড় হয়। এক একটা করলা এক ফুট দীর্ঘ হয়। বাগানের সাধারণ জমিতে করলা জন্মিয়া থাকে, তবে ইহা বর্ষা ণালে ফলে,

একজু জমি কিঞ্চিৎ উচ্চ না হইলে গোড়ায় জল বসিয়া গাছের অনিষ্ট করে। করলা দুইবার বপন করিতে পারা যায়। চৈত্র মাসের প্রথম হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত বীজ বপন করিবে এবং প্রয়োজন বুঝিলে প্রতি-দিন জল দিবে। ইহার জন্তু মাচান আবশ্যক। চৈত্র-বৈশাখে রোপিত গাছে আষাঢ় মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়। দ্বিতীয় দফায় শ্রাবণ মাসে বীজ বপন করিলে অগ্রহায়ণের শেষ ভাগ হইতে ফাল্গুন-চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়। অবর্ষার সময় গাছে জলসেচন করা উচিত।

গাছের গোড়ায়, কিম্বা বীজ পুতিবার অগ্রে, মাদায় পুরাতন গোবর-সার বা পোড়া মাটি দিলে ইহার বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। বর্ষাকালে গাছের গোড়ার মাটি উচ্চ করিয়া দেওয়া আবশ্যক এবং সময়ে সময়ে তৃণ-জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। ভূমিতে গাছ লতাইয়া গেলে বর্ষার জলে মাটির আর্দ্রতায় ফল পচিয়া যায়।

করলা ও করেলী ইহারা জাতি এক হইলেও কালভেদে ইহারা আবাদিত হয়। গ্রীষ্মকালে যাহার আবাদ হয়, তাহার নাম—করলা, এবং বর্ষাকালে যাহার আবাদ হয় তাহা করেলী নামে অভিহিত।

### ধুঁহুল ( *Luffa Egyptica* )

হিন্দুস্থানবাসীগণ ইহাকে ঝীয়া-ভরি কহে। ধুঁহুল বৃহৎ লতানিয়া গাছ, মাচা বা গাছের উপরে ভাল থাকে। ইহার ফল এক হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে। ধুঁহুল অতি মিষ্ট তরকারী, পাকিয়া গেলে তন্তু-বিশিষ্ট হইয়া যায় কিন্তু তাহা হইলেও অব্যবহার্য্য নহে, বরং পাকা ধুঁহুলের ব্যজন কষ্ট, ডালনা, চচ্চড়ী প্রভৃতি অতি সুখরোচক হয়। ধুঁহুলের গাছ

বৃহজ্জাতীয় লতা, স্তূতরাং ইহার মাচা মজবুদ হওয়া আবশ্যক। সাধারণ জমিতে মাদা করিয়া বীজ বপন করিবে এবং যাবৎ বর্ষা আগত না হয় তাবৎ গোড়ায় রস থাকা আবশ্যক। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত বীজ বপন করিবার সময়। ইহার জন্ত অল্প বিশেষ পাট্ নাই।

সুপক ধুন্দুলের ছাল সদৃশ আবরণ স্নান বা গাভ্রধাবনে ব্যবহৃত হয়। উক্ত জালতী দ্বারা গাভ্র মর্দন করিলে গাভ্র পরিষ্কার হয় মর্দনকালে আরামও অনুভূত হয়।

### চিচিঙ্গে ( Snkae gourd. )

চিচিঙ্গে লতানিয়া উদ্ভিদ স্তূতরাং মাচায় উঠাইয়া দিতে হয়। ইহার দুইটা জাতি আছে, তন্মধ্যে একটি তিক্ত, অপরটা ব্যবহারোপযোগী। তিক্ত জাতির নাম,—তিত্-চিচিঙ্গে। তিক্ত জাতির ফল প্রায় ছোট অর্থাৎ এক ফুট আন্দাজ লম্বা হয়, আর অল্প জাতির ফল বড়ও হয়, ছোটও হয়। বড় জাতির ফল দেড় হইতে দুই হাত লম্বা হয় এবং তাহার গাভ্রে লম্বা ভাগে মাদা দাগ থাকে। বর্ষাকালে ইহার ফল। তিক্ত জাতীয় গাছ রাখিয়া কোন ফল নাই, কারণ উহার ফল ব্যবহারে আইসে না। মাচার নীচে ৪।৫ হাত অন্তর এক একটি মাদা করিয়া, ফাল্গুন মাসের শেষভাগ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত বীজ বপন করিতে পারা যায় কিন্তু অগ্রে বপন করায় লাভ আছে। যাবৎ বর্ষা আগত না হয়, তাবৎ প্রতিদিন বা দুই এক দিবস অন্তর গাছের গোড়ায় জল দিবে। অগ্রে রোপিত গাছে বর্ষাকালেই ফল হয়, আর পশ্চাৎ রোপিত গাছে আশ্বিন-কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ফল থাকে।



## চেঁড়স ( Lady's finger. )

চেঁড়সের ফল পল বা কোণবিশিষ্ট এবং ৪-ইঞ্চি হইতে ১-ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ক্ষেত্র মধ্যে দুই হাত অন্তর মাধা করিয়া তন্মধ্যে বীজ বপন করিতে হইবে। প্রতি মাধায় ২টি করিয়া বীজ দিবে এবং গাছ বাহির হইলে প্রতি মাধায় সতেজ একটি মাত্র গাছ রাখিয়া অপর চারা উঠাইয়া ফেলিবে অথবা হাপোরে চারা জন্মাইয়া চৌকায় বা পটীতে রোপণ করিলে চলতে পারে। মাধায় পুরাতন গোবর সার বা পড়া মাটি দিলে গাছ তেজাল হয় এবং প্রচুর ফল প্রদান করে। মাঘ হইতে আষাঢ়-শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত বীজ বপন করা যাইতে পারে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে যে বীজ বপন করা যায়, তাহার গাছ অধিক বড় হইবার পূর্বে ফল ধরিতে আরম্ভ হয়। এমন কি অনেক গাছ ৮।১০ অঙ্গুলি উচ্চ না হইতেই তাহার ফল ধরে। এই সকল ছোট গাছের ফুল ছিঁড়িয়া দেওয়া উচিত। এ সময়ের গাছে প্রচুর জলসেচন করা কর্তব্য। বর্ষার গাছ ৫।৬ ফুট উচ্চ এবং ঝাড়াল হইয়া অনেক ফল প্রদান করে। ইহার আষাঢ় মাস হইতে ফল প্রদান করিয়া থাকে।

চেঁড়স গাছের স্বক হইতে এক প্রকার তন্তু বা পাট বাহির হয়, তাহা অতি শুভ্র, চিকণ ও শক্ত। যে প্রণালীতে পাট গাছ হইতে তন্তু বাহির করা যায় সেই উপায়ে চেঁড়স গাছ হইতেও পাট বাহির করিতে হয়। পাট তৈয়ার করিতে হইলে পাটের জায় ঘনভাবে বীজ বুনিতে হয় নতুবা গাছে প্রশাখা জন্মে, ফলতঃ তাহা হইতে দীর্ঘ পাট উৎপন্ন হয় না। গাছে ফুল ধরিলে গাছ কাটিয়া পাটের জায় কাটিয়া লইলেই তন্তু বাহির হয়।

### মেস্তা বা লাল-অম্বরী ( Red sorrel. )

ইহা মেস্তা-পাট নহে, চেঁড়স জাতীয় গাছ। বর্ষাকালে হাপোরে চারা উৎপন্ন করিয়া ক্ষেত্রে ২১০ হাত ব্যবধানে তিন হাত অন্তর এক-একটি চারা রোপণ করিতে হয়। কার্তিক-অগ্রহায়ণ হইতে মাঘমাস পর্যন্ত মেস্তা গাছ ফল প্রদান করে। ফলের আকার কস্তুরা বা চেঁড়সের স্থায়। ফলগুলি সুপক হইলে সুন্দর সিন্দূরবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আশ্বাদ অম্লাক্ত। ইহাতে অম্বল ও নানাবিধ চাটনী প্রস্তুত হয়। সুপক ফল সিদ্ধ করিয়া উহার শাঁস বাহির করিয়া সমপরিমাণ চিনি সমেত উত্তাপে অল্পক্ষণ পাক করিলে সুন্দর চাটনী বা Marmalade প্রস্তুত হয়। শিশি বা বোতল মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে দীর্ঘকাল ব্যবহার করিতে পারা যায়।

প্রতি বৎসর বীজ বপন করিয়া আবাদ করিতে হয়। আবাদের বিশেষ কিছু পাট নাই।

### শজিনা (Horse-radish-tree )

শজিনা গাছের কচি পাতা ও ডগা, ফুল ও ফল ব্যঞ্জননের অন্তর্গত। শজিনার যে দীর্ঘ স্টী জন্মে তাহাকে শজনা-খাড়া কহে। শজনা গাছ একবার আঁজাইলে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া প্রতি বৎসর যথাসময়ে ফুল-ফল প্রদান করে।

সুপক ফলের বীজ বুনিয়া চারা উৎপাদন করিতে হয়। সে চারা গাছ বড় হইয়া ফুল ফল প্রদান করিতে ২১০ বৎসর সময় লাগে; কিন্তু ১০ হাত দীর্ঘ আধ-পাকা ডাল পুতিলে এক বৎসর পরেই আওলাত মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে এবং এই উপায়েই সাধারণতঃ গাছ উৎ-

পান্নিত হইয়া থাকে। পল্লীগায়ে অনেক শজন ডাল সংগ্রহ করিয়া বেড়া রচনা করেন, ক্রমে সেই সকল ডাল জমিতে শিকড় বিস্তার করে এবং তাহা হইতে শাখা প্রশাখা উদ্গত হইয়া তাহাতেই ফুল-ফল জন্মে।

বৎসরের মধ্যে যে কোনও মাসে ডাল রোপণ করিতে পারা যায়, কিন্তু বসন্তকালই ডাল পুতিবার সময়। এই সময়ে পুরাতন গাছ ছাঁটিয়া দিতে হয়। সেই ছাঁটা ডাল যথা স্থানে স্থায়ীভাবে পুতিয়া দিয়া ডালের শেষাগ্রভাগে এক তাল গোবর-মিশ্রিত মাটির পিণ্ড দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হয়।, এরূপ করিলে উপরের কর্তিত স্থান শুষ্ক হইতে পায় না, ফলতঃ শীঘ্রই গোড়ায় শিকড় নামে এবং কাণ্ডে শাখা প্রশাখা নির্গত হয়।

কাণ্ড বা ডাল রোপণ করিতে হইলে আধ হাত হইতে এক হাত গভীর গর্ত করিয়া তাহাতে কাণ্ডটী যত্নসহকারে পুতিয়া দিলে এক মাসের মধ্যে উহাতে শিকড় জন্মে। অন্তঃপর ইহার আর কোন পাট নাই।

বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিতে হইলে চৈত্র-বৈশাখ মাসে সুপক্ক ডাঁটার শুষ্ক বীজ লইয়া হাপোরে চারা উৎপন্ন করিতে হয়। চারাগুলি অল্পাধিক বড় হইয়া উঠিলে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে যথাস্থানে স্থায়ীরূপে রোপণ করিবে।

ফল প্রদান শেষ হইলে শজন গাছ প্রতি বৎসর ছাঁটিয়া দিতে হয়। গাছ ছাঁটিয়া দিলে বহু নূতন শাখা প্রশাখা জন্মে, গাছ বিচ্যূত হয়, ফলও অধিক হয় এবং ডাঁটা সুতার হয়। সচরাচর ফাল্গুন-চৈত্র মাসেই গাছ ছাঁটা যায়।

---

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

### চুবড়ী-আলু (Yam)

চুবড়ী-আলুর কয়েকটি জাত আছে, কিন্তু তাহাদিগের আকার ভিন্ন আর কিছুতেই বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। ইহাদিগের আকার গোল আলুর মত নিয়মিত নহে। কোনটা লম্বা, কোনটা গোল, কোনটা বাঁকা ইত্যাদি নানা আকারের হইয়া থাকে। জমির ভালরূপ পাট হইলে এক-একটি আলুর কন্দ বা মূল ৪।৫ সের অপেক্ষা বড় হয়।

চুবড়ী-আলুর জমি উচ্চ এবং দৌঁ-আঁশ মৃত্তিকাবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। মাটি একহাত হইতে দেড় হাত গভীর করিয়া কোদলাইয়া, পরে লাঙ্গল ও মই দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে। এই সকল কার্য্য মাঘ মাসের মধ্যে শেষ করিয়া মাঘ-ফাঁস্তুনে বীজ-আলু পুতিয়া দিতে হইবে।

সচরাচর কেহ ইহার আবাদ করে না। আঁদাড়ে-জঙ্গলে স্বতঃই জন্মিয়া থাকে। চাষীরা তাহা হইতে আলু সংগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। আবাদী-ফসলের স্থায় আবাদ করিলে, ক্রমে উহা উপাদেয় তরকারীরূপে গণ্য হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

চুবড়ী-আলুর গাছ দীর্ঘপ্রসারী, ভারি ও স্থায়ী লতা। ক্ষেত্রের বেড়া বা পগারের নিকট স্থানে স্থানে মাদা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বীজ বা গেঁড় পুতিয়া দিতে হয়। মাদার মাটি আলাগা করিয়া তাহার সহিত বাগানের পুরাতন জজাল-চূর্ণ মিলিত করিয়া দিলে ভাল হয়। তাহাদিগের ক্ষেত বা বাগানের বেড়া বা পগার নাই। তাহাদিগকে মাঠেই আবাদ করিতে হইবে। এরূপ স্থানে আবাদ করিতে হইলে মাদার আয়তন তিন

হাত বেঁটন বা এক হাত ব্যাস ও এক হাত গভীর হওয়া উচিত। শ্রেণী-মধ্যে ৮।১০ হাত অন্তর মাদা করিয়া গৌড় রোপণ করিতে হইবে গাছগুলি ঈষৎ বড় হইয়া উঠিলে প্রত্যেক মাদাকে কেন্দ্র করিয়া ঈষদূরে তিন দিকে তিনটি খুঁটি পুতিয়া খুঁটির উপরিভাগ টানিয়া একত্রে বাঁধিয়া দিলে তাহাদিগের সুন্দর অবলম্বন হয়।

চীনদেশে যে প্রণালীতে ইহার আবাদ হয় সেই প্রণালীতে আমি ২।৩ বৎসর ইহার আবাদ করিয়াছিলাম। এতদর্থে ছোট আলুগুলি হাপোরে ঘন করিয়া রোপণ করিতে হয়। ১০।১৫ দিনের মধ্যে রোপিত বীজ হইতে ফেঁকড়ি উদ্গত হয়, তখন প্রয়োজনমত জলসেচন করিতে হয়। ফেঁকড়িগুলি ৪।৫ হাত দীর্ঘ হইলে, সতিকাগুলিকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া কর্তন করিতে হয়। ইহাদিগকে ‘কলম’ কহে। প্রত্যেক খণ্ড বা ‘কলমে’ তিনটি গ্রীষ্ম থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

ইতিমধ্যে জমিতে তিন হাত অন্তর জুলি পরস্পরের মধ্যবর্তী-স্থানে ভেলি নির্মাণ করিয়া রাখিতে হইবে। কলম প্রস্তুত হইলে উল্লিখিত ভেলির মধ্যস্থলে ৪।৫ অঙ্গুলী চওড়া এবং ৪ অঙ্গুলী গভীর জুলি খোদিত করিয়া তাহার মধ্যে এক-হাত অন্তর-অন্তর এক-একটি কলম, উত্তরাভিমুখে হেলাইয়া বা শায়িত করিয়া দিবে। উপরিভাগের শেষ গ্রীষ্মটি মাটিতে ঢাকিয়া না যায় তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। ১০।১৫ দিনের মধ্যে কলমে ফেঁকড়ি উদ্গত হয়।

একণে দেখিতে হইবে কেন্দ্র তৃণাদিতে না ঢাকিয়া যায়। প্রত্যেক গাছের একটা মাত্র কাণ্ড রাখিতে হইবে। মূল-লতা হইতে ফেঁকড়ি (lateral shoots) উদ্গত হইলে বা মুখরিত হইবার উপক্রম করিলে তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। মূলতঃ, প্রত্যেক গাছে একটা মাত্র ফেঁকড়িহীন কাণ্ড থাকিবে।

ফাঙ্কন মাসে কোন হাঁপোরে কলমের জন্ত গেঁড় রোপণ করিলে বৈশাখ মাসে কলম পাওয়া যায়। বৈশাখ মাসে অনর্থক বিলম্ব না করিয়া কলম রোপণ করিলে পৌষ-মাঘ মাসে আলু উঠাইতে পারা যায়।

অল্প প্রাণালীতে আবাদ করিতে হইলে, যথারীতি জমি তৈয়ার করিয়া তিন হাত অন্তর জুলির উভয়পার্শ্বের মাটি তুলিয়া ভেলি তৈয়ার করা উচিত। মাটি যত ফুঙ্কো হইবে কন্দ তত বড় হইবে। মাটি হইলে সরাল কন্দের আকার বড় হয়, কন্দের শাঁস মোলায়েম হয়। এই জাতীয় আলুর পক্ষে বাগানের লতা-পাতা ও গোশালার পুরাতন মিশ্র-সার বিশেষ উপযোগী। অতঃপর ক্ষুদ্র বীজ-আলু পূর্বাঙ্কে মুকাইয়া লইয়া ভেলির মধ্যস্থলে সমশ্রেণীতে একহাত অন্তর রোপণ করিবে। গাছগুলি তিন হাতের অধিক দীর্ঘ হইতে না দিলে প্রত্যেক গাছ ঝাড় বাঁধিবে এবং দাঁড়া গাছ (standard) হইবে, ফলতঃ তাহাদিগের জন্ত কোন অবলম্বনের প্রয়োজন হইবে না।

গাছের গোড়া সর্বদা পশ্চিমকার রাখিতে হইবে। বর্ষায় মাটি দৃঢ় হইয়া গেলে ঘো-মত মাটি আলগা করিয়া দিতে হইবে।

চুপুড়ী আলুর ভিতর পিচ্ছিল লালার বাহুল্যহেতু অনেকে পছন্দ করেন না, কিন্তু তাহা দূর করিবার উপায়—আলুগুলিকে অগ্রে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া আধঘণ্টা কাল ছাই মধ্যে রাখিয়া দিলে উক্ত লাল দূর হয়। অতঃপর তাহাকে যথাবিধি কুটিয়া রন্ধন করিতে হইবে।

### রাজা-আলু ( sweet potato )

রাজা-আলুর আকার লম্বা, মধ্যস্থল স্থূল এবং শেবাগ্রভাগেয় শৃঙ্গের দ্বায় ক্রমবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার স্বকের বর্ণ লাল বা ঘোর গোলাপী

বলিয়া ইহার নাম রাজা-আলু হইয়াছে। রাজা-আলু সিদ্ধ করিলে মোমের  
স্থায় কোমল হয়। ইহার স্বাদ মিষ্ট এবং গন্ধ মনোহর, কিন্তু জৈব তীব্র।

রাজা-আলু লতানে ভূশায়ী উদ্ভিদ। ভূগর্ভ মধ্যে ইহার শিকড়ে যে  
কন্দ জন্মে তাহাই রাজা-আলু। আলুর জন্ত যেরূপ হালকা মাটির আব-  
শ্রুক, রাজা-আলুর জন্তও অবিকল সেইরূপ মাটির প্রয়োজন। মাটি নিতান্ত  
বেলে না হয় অথচ হালকা হয়, এরূপ মাটি প্রশস্ত। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে  
ক্ষেত পাতিবার সময়। ইহার আবাদকালে পুরাতন গাছের লতা রোপণ  
করিতে হয়। লতার অভাব হইলে কন্দকে মুখরিত করিরা রোপণ করা  
এ সময়ের আবাদের জন্ত ডাঙ্গা-জমির আবশ্রুক। আশ্বিন-কার্তিক  
মাসে নাবাল জমিতে কিছা নদীর চর বা সৈকতে আবাদ করিতে  
পারা যায়।

রোপণের কাল সমাগতপ্রায় হইলে বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র শীঘ্র জমি  
তৈয়ার করিতে হইবে। রাজা-আলু সদৃশ কন্দ-জাতীয় উদ্ভিদের জন্ত জমি  
কর্ষণ গভীর করিতে হইবে। বিঘা প্রতি ৮১০ বার কর্ষণ ও মৃত্তিকা  
চূর্ণন যেমন প্রয়োজন, মাটিতে সার সংযোজিত করাও সেইরূপ প্রয়ো-  
জন। অতঃপর জ্যৈষ্ঠ মাসের ভিতরে চৌকার মধ্যে দীর্ঘ-ভাগে ৭৮ ইঞ্চি  
গভীর জুলির মধ্যে পুরাতন গাছের পরিপুষ্ট লতিকা শায়িত করিয়া দিতে  
হয়। কন্দ রোপণ করিতে হইলে জুলির মধ্যে ২৩ হাত অন্তর এক এক  
খণ্ড মুখরিত কন্দ শায়িত করিয়া মাটি চাপা দিতে হইবে। জুলি পরম্প-  
রের ব্যবধান ২১০ বা ৩ হাত হইলেই চলিবে।

লতা বা কন্দ, যাহাই রোপিত হউক, জুল ভরাট করিবার সময় ৭৮  
অঞ্জুল পরিমাণ স্থল করিয়া মাটি দিলে ভাল হয়। চারা সকল ভূপৃষ্ঠ  
ছাড়িয়া উঠিলে জুলির অবশিষ্ট অংশ ভরাট করিয়া দেওয়া উচিত। বর্ষা  
হইলে জুলির মাটি বলিয়া যায় এবং জুলিতে জল সঞ্চিত হয়। যাহাতে

জুলিতে জল দাঁড়াইতে না পারে এই উদ্দেশ্যে পার্শ্বদেশ হইতে মাটি তুলিয়া গাছের গোড়া ঢাকিয়া সমগ্র জুলি উচ্চ করিয়া দিতে হইবে।

রাজা-আলুর ক্ষেত পাতনে আর একটি উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। লতিকা কিম্বা কন্দ প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণ সংগ্রহ করিতে না পারিলে লতিকার পুরাতন দণ্ড সকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া জুলির মধ্যে বসাইলে চলে। খণ্ডসমূহের প্রত্যেকটিতে ৩টি গ্রন্থি থাকা আবশ্যক। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সেই লতা খণ্ড বা কলমগুলিকে উত্তর পূর্বদিকে ঈষৎ হেলাইয়া পুতিয়া দেওয়া আবশ্যক, কারণ তাহা হইলে লতার উপরি-ভাগে রৌদ্রের উত্তাপ তত অধিক লাগিতে পায় না। এতদ্ব্যতীত, গাছ হেলাইয়া পুতিলে শীঘ্র শীঘ্রই শিকড় জন্মিয়া শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট হয়। ক্ষেত্র না জলময় হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত।

গ্রীষ্মের আবাদী ক্ষেত্রের কন্দ কা্তিক মাস হইতেই তুলিতে পারা যায় কিন্তু অগ্রহাষণ বা পৌষ মাস পর্য্যন্ত মাটিতে থাকিতে পাইলে কন্দ-গুলি বড়, পরিপুষ্ট ও সমধিক মিষ্ট হয়। আশ্বিন-কা্তিকে রোপিত ক্ষেত্রের কন্দ মাঘ-ফাল্গুন মাসে তুলিতে পারা যায়।

রাজা-আলু সাতিশয় পুষ্টিকর সামগ্রী। বাঙ্গালা দেশের ভ্রায় হুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশে ইহার আবাদ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে সামান্য হুর্ভিক্ষে গরীর দুঃখী লোকে ইহা খাইয়া প্রাণধারণ করিতে পারে। ইহা কাঁচ খাইতে মন্দ লাগে না।

### শকরকন্দ-আলু ( Batatas Edulis )

শকরকন্দ-আলু, রাজা-আলু অপেক্ষা বড় হয়। ইহার স্বাদ মিষ্ট, কিন্তু পুষ্টোক্ত আলুর ভ্রায় সুস্বাদ বা সুপ্রাণবিশিষ্ট নহে, এজন্য বাঙ্গালীর হোসে



ইহার তাদৃশ আদর নাই, কিন্তু রাঙা-আলুর ভ্রায় ইহা পুষ্টিকর আনাজ ।  
হিন্দুস্তানবাসীগণের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবহার আছে ।

শকরকন্দ আলুর বর্ণ সাদাটে । ইহার চাষ ও আবাদ-প্রণালী অবি-  
কল রাঙা-আলুর ভ্রায় । অগ্রহায়ণ মাস হইতে ইহা ব্যবহারোপযোগী  
হয় । সেই সময় ইহাকে মাটি হইতে তুলিয়া লইতে হইবে ।

ইতিপূর্বে যে কয়েক জাতীয় আলুর কথা বলা হইয়াছে, তাহা ব্যতীত  
আরও অনেক প্রকার জঙ্গলী আলু জঙ্গলে জন্মিয়া থাকে, অবগ্যবাসী  
স্থানীয় লোকেরা তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে ।

কিছুদিন পূর্বে গ্রন্থকার উক্ত আলু হইতে পালো প্রস্তুত করিয়া-  
ছিলেন । পূর্বেই বলিয়াছি যে ইহা পুষ্টিকর । পালো প্রস্তুত করিলে  
আলু অপেক্ষা লঘু হয় । ইহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিবার জন্ত কোন  
কোন ডাক্তারকে উক্ত পালো দেওয়া হয় । তাঁহারা বলেন যে রুগ্ন ব্যক্তি  
ও শিশুদিগের পক্ষে উক্ত পালো উত্তম খাদ্য । পালো প্রস্তুত করিবার  
প্রণালী নিম্নে লিখিত হইল :—

কাঁচা পালো ।—রাঙালু ও শকরকন্দ আলু—উভয় প্রকার কন্দ ইহা-  
তেই পালো প্রস্তুত করিতে পারা যায় । কতগুলিকে পরিষ্কার জলে  
উত্তমরূপে চোত করিয়া পাতলা চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া রোড়ে ২৩  
দিবস উত্তমরূপে শুক করিবার পর, হামানিস্তা, ঢেঁকি বা জাঁতায় কুটন  
পূর্বক চূর্ণ করিতে হয় । পরে ছাঁকনীতে ছাঁকিয়া লইলেই কাঁচা পালো  
হইল । সাগু বা বালির ভ্রায় জলে হুসিদ্ধ করিলেই তাহা ব্যবহারোপ-  
যোগী হয় ।

পাকা বা সিদ্ধ পালো । বিধৌত কন্দগুলি জলে উত্তমরূপে সিদ্ধ  
করিয়া ছাল বা খোলা ছাড়াইয়া ফেলিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দুই দুই খণ্ড  
করিয়া রোড়ে শুক করিয়া পূর্বোক্ত প্রণালীতে কুটন করিলেই পাকা

পালো প্রস্তুত হইল। সিদ্ধ করিবার পর হইতে কুটনকাল পর্য্যন্ত তাবৎ কার্য্য ক্রিপ্তাসহকারে করিতে হয়। একদিন মধ্যে সকল প্রক্রিয়া সমাহিত না হইলে পালোতে অল্পগন্ধের সঞ্চার হয়। সিদ্ধ পালো ঈষৎ গরম জলে গুলিয়া ব্যবহার করা চলে। ইহার সহিত দ্রব্ধ চিনি প্রভৃতি মিশ্রিত করিলে উত্তম হালুয়া প্রস্তুত হয়।

### মানক বা মানকচু ( Colocasia Indica )

মানকচু এ দেশের একটা উপাদেয় তরকারী, কিন্তু হুষ্ট মানকচু ভক্ষণ-কালে মুখে কণ্ডুতি হয় এবং ওষ্ঠাধার হইতে জিহ্বা ও তালু পর্য্যন্ত কুট-কুট করে। এমন মান ও ওল ভক্ষণ করিয়াছি, যাহার কণ্ডুতি যন্ত্রণায় দ্বাদশ ঘণ্টার অধিক কাল কষ্ট পাইতে হইয়াছে। প্রবীণ গ্রন্থকারের উপদেশ,— মান বা ওল মুখে ‘লাগিলে’ বিজের মত চূপ করিয়া থাকা উচিত এবং কাহারও নিকট ব্যক্ত করা উচিত নহে। সকল মানই যে কণ্ডুরা তাহা নহে, কারণ এরূপ মানও যথেষ্ট আছে যাহা ভাতে বা ব্যঞ্জনে অতি উপাদেয় ও মোলায়েম হয়।

মানক বা মানকচু কন্দজ হইতে উদ্ভিদ, ইহার কন্দই ভক্ষণীয়। কোন কোন জেলায় মানক বিশেষের পত্র-বৃন্ত ও পত্র ব্যঞ্জনে নিষোজিত হইয়া থাকে। জমির অবস্থান মাটির প্রকৃতি ও আবাদ পরিচর্যা এতদ্বয়ের দোষে বা গুণে মানের সাদের তারতম্য হইয়া থাকে। নাবাল, ভিজা ও আগুলা জমিতে আবাদ করিলে নির্দোষ ও উত্তম জাতীয় মানক ও বিকৃত বিষাদ, তন্তুময় ও কণ্ডুরা হইয়া পড়ে। আবার উচ্চ, শুষ্ক ও উন্মুক্ত স্থানে আবাদিত হইলে ছরস্ক মানক দোষশূন্য ও লোকপ্রিয় হইয়া থাকে। ফলতঃ মানের আবাদের জন্য উচ্চ জমি, দোয়াঁশ ও অব্যাহ রৌদ্রের

প্রয়োজন। অল্পপ্রকার জমিতে আবদ করিলে মানকন্দ বৃদ্ধিশীল ও নয়ন হইতে পারে, কিন্তু তাহা শিকড়ে পানসে<sup>১</sup> কিম্বা কতুরা বা চুলকণা দায়ক হইবার আশঙ্কা থাকে।

আবাদের জন্ত ‘মুখী’ কিম্বা চারা রোপণ করিতে হয়। ক্ষেত্র হইতে মানক সংগৃহীত হইবার পর ৩৪ সপ্তাহ মধ্যে সেখানে বহু চারা জন্মে। ৩৪টা পত্রবিশিষ্ট চারা সহজলভ্য হইলে এবং তাহা সংগ্রহ করিতে পারিলে মন্দ হয় না। ‘মুখী’ বা চারার অভাবে মান-কন্দকে চক্রাকারে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রত্যেক খণ্ডকে ৩৪ টুকরা করিলে চলিতে পারে। সকল টুকরার বহির্ভাগে বা স্বকে একটা ‘চোক’ থাকা নিশ্চয় প্রয়োজন। উক্ত চোকই ভাবী উদ্ভিদ,—ইহা স্বরণ রাখিতে হইবে। মুখী বা চোক হইতে কি উপায়ে চারা উৎপাদন করিতে হয় তাহা প্রস্তাবান্তরে বলিয়াছি। মাঘ-ফাল্গুন মাসে মুখী বা চোবদিগকে জাগু দিয়া কিম্বা হাটপোরে রোপণ করিয়া মুখাইয়া লইতে হইবে। অতঃপর ভূমিতে স্থায়ীভাবে রোপণ করিতে হয়।

স্থান, জমি, মৃত্তিকা এবং মানের জাতিস্ব অনুসারে কোন মান দূরে-দূরে, কোন মান ঘন-ঘন রোপণ করিতে হয় এবং তাহা উৎপাদকের বিচার্য। কিন্তু পূর্ব-অভিজ্ঞতা না থাকিলে এক হাত অন্তর সারিতে পোনে এক হাত হইতে দেড় হাত অন্তর চারা রোপণ করিতে পারা যায়।—মানকন্দ ভূগর্ভে প্রবেশ করে না, উপরিভাগ বৃদ্ধি পায় এবং কন্দের গাত্রে চারিদিক হইতে শিকড় সকল উদ্গত হইয়া ভূমিকে যেন, ধরিয়া থাকে ফলতঃ কন্দ ভূশায়ী হইতে পায় না। কন্দ যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, ততই তাহাকে ঢাকিয়া দিতে হয়। কন্দ ঢাকিবার জন্ত কাঠের ছাই উত্তম উপকরণ, পার্শ্বদেশস্থিত অর্থাৎ শ্রেণী পরস্পর ন্যায়বর্তী স্থানের মাটি ব্যবহার করিতে পারা যায়। মাটি বা ছাই

ঘাঙ্গা কন্দ চাকিবার অন্ততম উদ্দেশ্য, কন্দের নিম্নদেশ হইতে উদ্ভিদের বল সঞ্চারিত হয়, ফলতঃ বৃদ্ধি অধিক হয়।

মান গাছ অতিশয় বৃদ্ধিশীল হইলে কন্দের গাত্রস্থ শিকড় অল্লাধিক কাটিয়া দেওয়া উচিত নতুবা পত্রের সংখ্যা ও আকার অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, কন্দ শীর্ণ হয়।

মানক দুই-তিন বৎসর ক্ষেত্রে থাকিতে পাইলে কন্দ সকল দীর্ঘ ও স্থূল হইবার অবসর পায়। মানকের আবাদ করিয়া ২১০ বৎসর অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় না। মাঘ মাসের শেষভাগ হইতে প্রত্যেক তিনটি গাছের মধ্যের গাছটি তুলিয়া লইয়া, সেই স্থানে একটি চারা রোপণ করিলে এই চারা দ্বিতীয় বৎসর ব্যবহারোপযোগী হয়। অতঃপর দ্বিতীয় বৎসর, প্রথম বৎসরের রোপিত গাছের কন্দ বৃহত্তর হইয়া থাকে এবং তখন তাহা উঠাইয়া লইলে বড় কন্দ পাওয়া যায়। এইরূপে প্রতি বৎসর কন্দ উত্তোলন এবং খালি স্থানে নূতন চারা রোপণ করিলে একই ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল আবাদ হইতে পারে, কিন্তু এ স্থলে বক্তব্য এই যে, এই স্থানে সমজাতীয় গাছ দীর্ঘ থাকিলে, তথায় সে জাতীয় গাছ রোপণ করা উচিত নহে, কিন্তু উদ্ভান-কাণ্ডে তাহা অপ্রচলিত নহে; কারণ উদ্ভান-কাণ্ডের সকল আবাদই কৃত্রিমতার উপর নির্ভরপূর্ণ। ক্ষেত্রে সারপ্রদান কৃত্রিমতার প্রধান অঙ্গ। সুতরাং যে স্থান হইতে কন্দ উত্তোলন করিয়া পুনরায় নূতন চারা রোপণ করিতে হয়, তথায় সার সংযোজিত করা একান্তই কর্তব্য।

এইরূপে যে সকল আসন শূন্য হয়, তথায় চারা রোপণ না করিলেও চলিতে পারে। যে কন্দটি উত্তোলিত হয়, তাহাদের শিরোভাগ হইতে পত্রগুলি কাটিয়া রোপণ করিলে কার্য আরও সহজ হয়।

কন্দ সকল দীর্ঘকাল জমিতে থাকিলে নিরাংশ বিকৃতাবস্থা হইয়া

যায়, ফলতঃ তাহা ব্যবহারে আসে না, এই জন্ত কোন কন্দ তিন বৎসরের অধিককাল ক্ষেত্রে রাখা উচিত নহে। কন্দজ ফসল লাভজনক। তরকারিরূপে উপাদেয় ও পুষ্টিকর এবং অনেক রোগে, বিশেষতঃ শোথ রোগে—মান-মণ্ড অতিশয় ফলপ্রসূ।

---

### শোলা-কচু ( colocasia sornicats )

স্থানবিশেষে ইহা বাঁশপোল-কচু নামে অভিহিত। দো-অঁশ মাটিতে ইহা ভাল জন্মে। মাঘ মাসে জমি উত্তমরূপে চষিয়া ও তাহাতে মই দিয়া মাটি চূর্ণ করিয়া ফাল্গুন মাসে আধ হাত বা তিনপোয়া ব্যবধানে চারা বা গেঁড় পুতিয়া দিবে। ইহার আবাদের কোন বিশেষ পাট নাই, তবে মধ্য মধ্যে জমি কোপাইয়া দিবে। হুগলী, বর্ধমান, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি অনেক জেলায় ইহার আবাদ হইয়া থাকে। শ্রাবণ মাস হইতে কচু তুলিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে।

---

### পঞ্চমুখী-কচু ( Colocasia sp. )

ময়মনসিংগ জেলায় এবং আসামের নানা স্থানে পঞ্চমুখী কচু যথেষ্ট জন্মে। উক্ত কচুর পার্শ্বদেশে স্বতন্ত্র ‘মুখ’ উদ্ভগত হইয়া যে কচু জন্মে তাহাদিগের নিরাংশ মূল-কচুর সহিত একত্রেই থাকে। আসামের অনেক হাটে-বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে ইহার আমদানী হয়। ইহার শাঁশ ডেলা কীরের দ্বার্য্য অতি কোমল, স্বাদও তেমনি উপাদেয়।

আসাম প্রদেশে ইহার আবাদের যথেষ্ট বা পাট নাই, সুতরাং অতি সহজে জন্মে। তেজপুর হইতে নাগা-পাহাড় পর্য্যন্ত সকল স্থানেই এই পঞ্চমুখী-কচু যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়।

মাঘ-কান্তন মাসে কচুর চোক এবং শিরোভাগ কাটিয়া জীবৎ ছায়াবৃত্ত স্থানে পাত বা হাণ্ডোর দিলে ১৫।২০ দিবসের মধ্যে তাহা অঙ্কুরিত হয়, অতঃপর তাহাতে পাতা দেখা দেয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে দুই-এক পসলা বুট্টি হইলেই ক্ষেতে বা চৌকায় এক-হাত অন্তর রোপণ করিতে হইবে। গাছের গোড়ায় উদ্ভিজ্জ-সার ও ছাই দিলে বিশেষ উপকার হয়। প্রথম বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসরে শস্ত অপেক্ষাকৃত অধিক সু-তার হয়। অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুনমাস পর্য্যন্ত কচু তুলিবার সময়।

পঞ্চমুখী না হইলেও মাল্লাজ প্রদেশে এক জাতীয় কচু জন্মে তাহার কোমলতাও অতি সুন্দর অতি মোলায়েম।

### মুকী-কচু (*Alocasia* sp.)

মুকী-কচু বাংলাদেশ নগণ্য তরকারীরূপে পরিগণিত ছিল কিন্তু এক্ষণে ধেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, সকল তরকারী ধেরূপ মহার্ঘ্য ও দুর্লভ্য হইয়াছে তাহাতে মুকী-কচুকে আর অবহেলা করা চলে না। মুকী-কচুর আকার তাদৃশ বড় না হইলেও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। বিভিন্ন আনাজের সহিত মিশ্রিত ভাবে রন্ধন করিলে উত্তম তরকারী হয়।

মাঘ মাসের প্রথম ভাগে জমি তৈয়ার করিয়া এক হাত অন্তর আল বা দাঁড়া করিয়া, সেই দাঁড়া বা আলের উপর এক হাত ব্যবধানে মুকী-গুলিকে পুতিয়া দিতে হইবে। এই সময়েই অর্ধাং পশ্চিমে বাতাস বহিলেই মুকীগুলি মুখাইয়া উঠে। মুকীগুলিকে বপনাগ্রে মুখাইয়া লইলে আরও ভাল হয়।

মুখাইবার অন্ত মুকীগুলিকে কোন স্থানে শুক মাটিতে কিম্বা চাকারি

বা বাজের মধ্যে প্রসারিত করিয়া বিচালী চাপা দিয়া রাখিলে ৮।১০ দিন মধ্যে মুখীগুলির চোক ফুটে। এইরূপ অবস্থাপন্ন হইলে রোপণের সময় হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

নিম্নতল রস জমিতে মুকীর আবাদে জল সেচনের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু উচ্চতল ও পাহাড়ী দেশ বা জেলায় মুকী ক্ষেতে জলসেচন অবশ্য প্রয়োজনীয়। বর্ষা সমাগত হইলে দাঁড়াগুলি মাটি দিয়া মেরামত করিয়া দিতে হইবে নতুবা বর্ষা প্রকোপে মাটি সরিয়া বা ধুইয়া বাহির হইয়া পড়ে, তাহাতে গাছের ক্ষতি হয়। আটাল জমির মুকীর পটিতে গোয়ালের আবর্জনা বা ছাই দিতে পারিলে ভাল হয়।

উক্ত-কচুর পটিতে তৃণ-জঙ্গলাদি আদৌ না জন্মিতে পারে সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

আষাঢ়-শ্রাবণ মাস হইতে উহাদিগকে উৎপাটিত করিতে পারা যায়, কিন্তু তখন কন্দগুলি নিতান্ত ছোট থাকে। কার্তিক মাসই উৎপাটনের উত্তম সময়। দীর্ঘকাল জন্মিতে থাকিতে পাইলে কন্দ বড় হয়, পরিপুষ্ট হয়, সু-তার হয়।

গ্রন্থবর্তী আবাদের কয়েক পাতি গাছ রক্ষিত হইলে মন্দ হয় না কারণ আগত প্রায় পৌষমাসে সব গাছ মরিয়া যায় এবং যথাস্থানে থাকিয়া মাষ-কান্তনের মুখরিত হইবার প্রয়াস পায়। এই সময়েই জমি হইতে মুকী তুলিয়া নূতন পটিতে রোপণ করিলে চলিতে পারে।

ইহার বিস্তৃত আবাদ লাভের বিষয়। ২০।২৫ বৎসর পূর্বে মুকী-কচু রাজ্যে অতি অল্পই আমদানী হইত কিন্তু এক্ষণে পূর্বাশেঙ্গা ঈশ্বর অগ্নিক-আমদানী হয়, কিন্তু পরিমাণ অল্প এবং মূল্য অত্যধিক,—প্রতি সের মুকী ৮০ আনা হইতে ১০ আনাতে, কোন কোন সময় ১০ আনাতে বিক্রীত হয়। পূর্বে আমদানী মূল্য এক অধিক হইত না।

## ওল (Telinga potato.)

ওলের আদিম উৎপত্তিস্থান সিংহল ও মলকুম্বী দ্বীপ-পুঞ্জ। কিন্তু প্রকৃতিগত কারণে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ইহার আবাদ হয়। বোম্বাই ও মাল্ভাজ অঞ্চলে ইহার প্রভূত আবাদ হয়। হাবড়ার সম্মি কটে সাঁতরাগাছি ওলের জন্য বিখ্যাত; কিন্তু তাহা অপেক্ষা বিখ্যাত রসনাতৃপ্তিকর—মাল্ভাজ ও মহীশূরের ওল। এখানকার ওল অতি সুস্বাদ হয়। ওল অতি সারবান্ ও পুষ্টিকর তরকারী। ভাল জাতীয় ওল অতি উপাদেয় তরকারী; কিন্তু অল্প এক জাতীয় দৃষ্ট ওল আছে, খাইলে মুখ চুলকায়। স্থানীয় মাটির দোষে অনেক সময়ে ভাল ওল খারাপ হইয়া যায়। ভালরূপে আবাদ করিলে এক-একটি ওল ৪।৫ সের ওজনের হয়। ওলের গায়ে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলুর তায় ‘মুখী’ জন্মে তাহাই বীজের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ইহার মাটি দো-আঁশ, হালকা, জমি উচ্চ ও গভীর হওয়া আবশ্যক। পৌষ মাসের প্রথমভাগে অতি উত্তমরূপে কোদলাইয়া মাটি চূর্ণ করিবে। পরে, মাঘ মাসের শেষ ভাগে ক্ষেত্রমধ্যে এক বা দেড় বিতস্তি অন্তর একটা একটা ‘মুখী’ রোপণ করিবে। বাবৎ না ‘মুখী’ সবুজ অঙ্কুরিত হয় তাবৎ মধ্যে মধ্যে জলসেচন করিবে। অঙ্কুরিত ‘মুখী’ রোপণ করিতে পারিলে আরও ভাল হয়। মুখী অঙ্কুরিত করিবার উপায় স্থানান্তরে লিখিত হইয়াছে। তৎপরে অল্প কোন পাট নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক। জমিতে পুরা এক বৎসর হইতে দুই বৎসর কাল থাকিতে পাইলে ওলের আকার বড় হয়, কিন্তু অনেকেই শ্রাবণ-ভাদ্র মাস হইতে ব্যবহার করেন। রসা-জমিতে যে ওল জন্মে তাহাতে ছিব্ড়া হয় এবং তাহা খাইলে প্রায় মুখ চুলকায়।



শীতকালে ওলের গাছ নিতেজ হইয়া ক্রমশঃ মরিয়া যায় এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে পুনরায় সেই সকল গাছের গোড়ায় আবার নূতন চারা উদ্ভূত হয়। সেই সকল চারা পুনরায় রোপণ করিতে পারা যায়। বিধী প্রতি ১০০ হইতে ২৫০ মণ পর্য্যন্ত ওল উৎপন্ন হয়-এবং প্রতি মণ এক টাকা হিসাবে সচরাচর বিক্রীত হইয়া থাকে।

মাদ্রাজ ও মহীশূরের প্রদেশে উৎকৃষ্ট ওল উৎপন্ন হইয়া থাকে। মহীশূরে অবস্থানকালে প্রায়ই ওল ব্যবহার করিতাম। বাল্যকালে একবার সুপ্রসিদ্ধ ওল ভক্ষণ করিয়া সারাদিন মুখের যন্ত্রণায় অধীর হইয়াছিলাম—সেই অবধি আমি ওল ভক্ষণ দূরের কথা, উহা দেখিলেই আমার ভয় হইত। যাহা হউক মহীশূর প্রদেশে এবং মাদ্রাজে যে ওল খাইয়াছি সে রূপ ওল কুত্রাপি জন্মে না বলিয়া মনে হয়। সুবিধা থাকিলে সেই অঞ্চল হইতে বীজ-ওল বা ‘মুখী’ আনা হইয়া আবাদ করিলে ভাল হয়। সুসিদ্ধ ওল ক্ষীরের স্নায় কোমল ও নির্দোষ হয়।

নানা দেশ হইতে উৎকৃষ্ট ফলফুল ও তরিতরকারির বীজ, ফল বা চারা আনা হইয়া দেশ মধ্যে প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা করা উচিত। ইহাতে যে কেবল নিজেরই লাভ হয় তাহা নহে, সেই সকল সামগ্রী নিজ ক্ষেত্রে উৎপন্ন করিয়া আবাদের জন্ত বিতরণ বা বিক্রয় করিলে প্রকৃত স্বদেশী হইতে পারা যায় বলিয়া আমার মনে হয়। সে চেষ্টা আমাদের কবে হইবে?

## চতুর্থ অধ্যায়

### তরমুজ ( Water melon )

স্থানীয় জল-বায়ুর উপর তরমুজের গুণাগুণ নির্ভর করে এবং উহাকে স্থানীয় ফল বলিলেও বলা যায়। জমি ও আবহাওয়ার তারতম্যে কোথাও ফল ভাল, সুমিষ্ট ও রসাল হয়, আবার কোথাও জঘন্য হইয়া থাকে। ভাল জাতীয় তরমুজ অত্র দেশে গিয়া নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইতে শুনা গিয়াছে এবং পরীক্ষা করিয়াও তাহা দেখা গিয়াছে। আমি নান্ন স্থান হইতে ভাল জাতীয় তরমুজের বীজ আনয়ন করিয়া আবাদ করিয়াছিলাম, কিন্তু যথাকার বীজ তথাকার ফলের সমতুল্য ফল উৎপন্ন করিতে পারা যায় নাই। তাই বলিয়া ইহার আবাদের বিষয়ে অসহেলা করা কোনমতে উচিত নহে। চর ও পলি-পড়া জমিতে তরমুজ ভালরূপ জন্মে। বর্ষাকালে নদীর জল নামিয়া গেলে যে চর দেখা যায়, তাহা অতিশয় সারবান। অনেক জমিতে বর্ষাকালে জল দাঁড়ায়, কিন্তু সে সকল জমিও কার্তিক-অক্টোবর মাসে শুষ্ক হইয়া যায়। এরূপ জমি তরমুজের পক্ষে ভাল। অতিরিক্ত এঁটেল বা ঠাণ্ডা জমিতে তরমুজ ভাল জন্মে না। সকলের পক্ষে উপরোক্ত প্রকারের জমি পাওয়া সম্ভব নহে, তবে দেখিতে হইবে যে, জমি নিতান্ত এঁটেল, ঠাণ্ডা বা ভিজা না হয়। কার্তিক মাসে জমির জল শুষ্ক হইয়া গেলে উত্তমরূপে ক্ষেত্র তৈয়ার করিয়া ৪৫ হাত ব্যবধানে মাদা করিয়া প্রত্যেক মাদায় ২০টা বীজ পুতিতে হয়। এখানে ব্যক্তব্য এই যে, তরমুজ আবাদের বিশেষ পাট আছে। মাদাটীর জন্ত দুই

কতক মাটি ফেলিয়া দিয়া বা উপরে আলি বাঁধিয়া দিয়া মানার ভিতরের মাটির সহিত পলি মাটি বা পাক বা অল্প সার মাটি মিশাইয়া লইয়া সমগ্র মাটিকে উত্তমরূপে চাপিয়া দিতে হয়। অতঃপর বীজ পুতিবার পূর্ব দিবস গর্ত হইতে অর্দ্ধেক মাটি উঠাইয়া পার্শ্বে রাখিয়া দিতে হয় এবং গর্ত মধ্যে দুই-এক কলসী জল ঢালিয়া দিতে হয়। পর দিবস জল শোষিত হইয়া যো হইলে গর্তের মাটির উপরিভাগ ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া বীজ পুতিতে হইবে। কয়েকদিন পরে গাছ জন্মিবে এবং ক্রমশঃ বড় হইতে থাকিবে। তখন, উপরিস্থ সঞ্চিত মাটি গর্তের ভিতর দিয়া গাছের কাণ্ডাংশ যতদূর সম্ভব—চাকিয়া দিবে। পুনরায় চারাগুলি ক্রমশঃ আরও বড় হইয়া উঠিলে আর একবার মাটি দিবে। এইরূপে ২৩ বার মাটি দিলে গাছ-গুলি ভূপৃষ্ঠোপরি আসিয়া পৌঁছিবে, তখন আর কিছু করিতে হইবে না। আমি নানাবিধ উপায় অবলম্বনেও তরমুজের আবাদ করিয়া আশানুরূপ ফল না পাইয়া, ইহার আবাদের গুহ্যতত্ত্ব জ্ঞাত হইবার জন্য রাজনগরে থাকিতে বিশেষ চেষ্টা করি। পরে তথা হইতে ৭৮ ক্রোশ দূরে অর্থাৎ যেখানে তরমুজের প্রভূত আবাদ হয় তথা হইতে উক্ত উপায় শিক্ষার্থ লোক পাঠাইয়া দিই। সেই বৎসর হইতে উল্লিখিত উপায়ে যথেষ্ট উপকার পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে অনেক ব্যক্তি আছে, কিন্তু কোন কাল বিনা ব্যক্তি সে সম্পন্ন হয় বা মনের মত ফলপ্রসূ হয়? মৎস্য শিকার করিতে গেলে কাদা মাখিতে হয়, এ কথাটা স্মরণ রাখা উচিত। এরূপেই একটা গুহ্য তত্ত্ব আছে। লতিকা যাহাতে দীর্ঘে বাড়িতে পারে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে! এতদর্থে লতিকার সুব্যবস্থা কোন কালে না পায়—একজন্ম তাহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাহা না হইলে প্রত্যেক গাছে ২৩টির অধিক লতা থাকিতে দিবে না, উপরস্থ লতা কয়টা মূল-লতিকার আদৌ কোনটি জন্মিতে দিবে না। অতীত

সংখ্যক ফল জন্মিলে, কয়েকটি মাত্র রাখিয়া অপয়গুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হয়।

লাউয়ের ত্রায় ভিজা খড়ের মধ্যে বীজ ঝাঁপিয়া মৃত্তিকামধ্যে পুতিয়া অঙ্কুরিত করিয়া লইলে ভাল হয়, অন্তথা সেই মাদাতেই বীজ পুতিয়া দেওয়া যাইতে পারে। অঙ্কুরিত বীজ পুতিতে হইলে মাদার মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ ও হাল্কা করিয়া, তন্মধ্যে বীজগুলিতে নিক্ষেপ করতঃ সাবধানে মাটি চাপা দিতে হইবে। অতঃপর সেই অঙ্কুরের উপরে পাতলা ভাবে হাল্কা মাটি চাপা দিবে এবং দুই-এক দিন কোন পাতা দ্বারা মাদাগুলি ঢাকিয়া রাখিবে। সত্ত্ব অর্থাৎ অনঙ্কুরিত বীজ বপন করিতে হইলে এত অধিক কষ্ট করিতে হয় না সত্য, তবে তাহাতে বীজ মাদা মধ্যে ২৩টা হিসাবে পুতিয়া দিবে এবং আবশ্যকমত তাহাতে মাটি চাপা দিবে ও জলসেচন করিবে। এই সময়ে মাটিতে অধিক রস থাকে না এবং রৌদ্রের উত্তাপ অধিক হয়, এজন্য মাদায় প্রতিদিন সায়ংকালে উত্তমরূপে জল-সেচন করিবে। ভাল বীজ পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়, তখন হইতে ইহার কোন মতে না মাটিতে রসের অভাব হয়। গাছ সকল ভূমিশায়ী হইয়া লতাইতে আরম্ভ করিলে আর উহাদিগের জলের প্রয়োজন হয় না।

ক্যানাকি-পোকা (Red spider) ইহার বরম শত্রু। গাছ অঙ্কুরিত হইলে আসিয়া ছুটে এবং মনে হয় যেন বীজের অঙ্কুরোদগমের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। ইহাদিগের কয়েকটাতে এক-একটি বড় চারাকে উদরস্থ করিতে পারে। প্রথমতঃ উহারা পাতার উপর তাহার গ্রন্থী হইতে কাণ্ড পর্যন্ত খাইয়া ফেলে। তীব্র তাপমাত্রায় উহারা অথবা কাঠের ছাই গাছের গোড়াও পাতার উপর উঠিয়া অনেক পরিমাণে ইহারা দমনে থাকে। চারাগুলি বতদিন নিরন্তর নৈশবাবহায় থাকে, ততদিন উহাদিগকে ভয় করিতে হয়।

গাছগুলি কোন রকমে ৮-১০টা পাতাবিশিষ্ট হইয়া লতাইতে আরম্ভ করিলে আর তত ভয়ের কারণ থাকে না। দিনের মধ্যে ছই-তিনবার উক্ত পোকাগুলিকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিতে পারিলেও অনেক সুবিধা হয়।

মাদায়ে যে কয়েকটা বীজ বপন করা গিয়াছিল, তৎসমুদায়ই যদি অঙ্কুরিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রতি মাদায়াস্থিত সর্বোৎকৃষ্ট, সবল ও সুগুঁঠ গাছটা মাত্র রাখিয়া অপরগুলিকে তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। এক মাদায়া একটীর অধিক গাছ কোন মতে রাখা উচিত নহে।

মাদায়া-পুষ্করিণীর পাঁক, গোয়াল-বাড়ীর আবর্জনা ও পোড়া মাটি দিয়া বীজ পুতিলে গাছের বিপুল তেজ হয় ও তাহাতে বিস্তর ফল জন্মে।

এক্কে মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুড়িয়া দেওয়া ভিন্ন কোন পাট নাই। ক্ষেত্র রসা থাকিলে আদৌ জল দেওয়ার আবশ্যক হয় না। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল পাকিয়া থাকে। ফল টাঙ্গাইয়া রাখিলে অনেক দিবস তাজা থাকে।

যে জাতীয় তরমুজের ছাল পাংলা, শক্ত পুরু ও বেলে, এবং অভ্যন্তর রস-পূর্ণ ও লাল তাহাই উৎকৃষ্ট তরমুজ। মোটা ছালবিশিষ্ট সাদা তরমুজ তাৎক্ষণিক ভাবে নষ্ট হয়।

ক্ষেত্র হইতে তরমুজ তুলিয়া আনিয়াই না খাইয়া, বরং উহাকে কয়েক ঘণ্টা শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিবার পরে কাটিয়া খাইলে উত্তম লাগে।

নিম্নবঙ্গের মধ্যে গোয়ালন্দে উত্তম ও বৃহদাকার তরমুজ জন্মিয়া থাকে। পশ্চিম অঞ্চলেও ইহার আবাদ হয়। ভারবঙ্গের অন্তর্গত রাজনগরের সন্নিকটস্থ কমলা নদীর তিনারায় বৃহদাকার ও অতি সুমিষ্ট তরমুজ

জন্মে। ইহার শাঁস লাল ও সুকোমল এবং ওজনে প্রায় পনের সের হয়। পূর্বে আমার ধারণা ছিল যে, গোয়ালন্দে সন্নিহিত অঞ্চলের তরমুজই সর্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু কমলা নদীর চর ও সৈকতের সংলগ্ন ক্ষেত্রে ঘেরাপ সুস্বাদ, সুমিষ্ট ও শাঁসাল তরমুজ দেখিয়াছি ও খাইয়াছি, তাহাতে সে ভ্রম দূর হইয়াছে।

### খেঁড়ো ( Melon sp. )

খেঁড়ো এক প্রকার তরমুজ জাতীয় ফল। ইহার গাছ লতানিয়া। সচরাচর বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান জেলায় ইহার আবাদ হইয়া থাকে। ফলের আকার লাউ বা কুমড়ার জায়, বীজগুলি প্রায় তরমুজের জায়। কচি ও পরিপুষ্ট অবস্থার আনাজরূপে ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পাকা অবস্থায় শাঁস শক্ত হইয়া যায়, সুতরাং ব্যঞ্জনে ব্যবহার করা চলে না। ফল পাকিয়া গেলে গবাদি পশুদিগকে সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিতে হয়।

আবাদ-প্রণালী তরমুজের জায়। কার্তিক মাসে বীজ বপন করিতে হয়। মাটির উর্বরতানুসারে ৫।৬ হাত হইতে ৮।১০ হাত ব্যবধানে শাদা করিয়া প্রত্যেক মাদায় ৩টা বীজ বপন করিতে হয়। সরস মাটিতে ৫।৬ দিনের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হয়। চারাগুলি ৬।৭টা পাতা-যুক্ত হইলে গোড়ায় মাটি উচ্চ করিয়া দিতে হয়। চৈত্র-বৈশাখে গাছ সকল ফল ধারণ করে।

## খরমুজা ( Musk-melon )

লক্ষ্মী জেলায় যে খরমুজা জন্মে তাহা সুগন্ধ, মিষ্টতা ও কোমলতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। বাঙ্গালা দেশেও খরমুজা জন্মিয়া থাকে, কিন্তু পূর্বোক্ত স্থানের জায় সুমিষ্ট সুগন্ধবিশিষ্ট হয় না। প্রতি বৎসর লক্ষ্মী-জাত খরমুজার বীজ বপন করিলে কতকটা তদনুরূপ ফল হইয়া থাকে, কিন্তু সেই বীজোৎপন্ন ফলের বীজ পুনরায় বপন করিলে ফলের আকার ছোট হয় এবং সে সকল গুণও কমিয়া যায়।

ছক্কিশ পরগণা, হুগলী, বর্ধমান বা পূর্ব-বাঙ্গাল দেশ অপেক্ষা পাটনা, ঝারভাঙ্গা মুর্শিদাবাদে যথেষ্ট খরমুজা জন্মে। পূর্বোক্ত স্থানসমূহের ফল তত নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয় না। কয়েক বৎসর পূর্বে আমি লক্ষ্মী হইতে বীজ আনাইয়া রৈইসাবাগে ( মুরসিদাবাদ ) আবাদ করিয়াছিলাম, তাহার ফল মন্দ হয় নাই, কিন্তু লক্ষ্মী-জাত ফলের বেরূপ সুগন্ধ, তাহাতে তাহ কিছু কম বোধ হইয়াছিল। পাটনা জেলায় অতি সুন্দর খরমুজা জন্মে। উক্ত জেলার মধ্যে মোকামা নামক স্থানে যে খরমুজা জন্মে, তাহা ওজনে প্রায় ৫ সের পর্য্যন্ত হয় এবং তাহার শাঁস যেমন পুরু, আনন্দ তেমন মিষ্ট, আজ্ঞা তেমন মনোহর।

চর বা বিল জমির জল নামিয়া গেলে বা শুকাইয়া গেলে তাহাতেই খরমুজার আবাদ করা প্রশস্ত। যে জমিতে তরমুজা ভাল জন্মে তাহাই খরমুজার উপযোগী। খরমুজার জমি অপেক্ষাকৃত শুষ্ক হওয়া প্রয়োজন। তরমুজার জমির জায় খরমুজার জমির পাট করিতে হয় এবং যথোপযুক্ত পরিমাণে সার দিয়া তিন হাত অন্তর শ্রেণী করিয়া তিন হাত অন্তর বাদার মধ্যে বীজ বপন করিবে। প্রতি মাদায় ২৪টি বীজ দিলেই যথেষ্ট। অগ্রহায়ণ মাস বীজ বপনের সময়। ৮।১০ বটাকা বীজগুলিকে

ভিজাইয়া লইলে ৩৪ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদগম হয় নতুবা ৭৮ দিন বিলম্ব হয়।

প্রতি মাদায় একাধিক চারা জন্মিলে সবল ও পরিপুষ্ট চারাটী রাখিয়া অপরগুলিকে তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। খরমুজা গাছে প্রায় জলসেচন করিতে হয় না, তবে সমুচ্চ ও পাহাড়ী দেশে প্রয়োজন মত জল সেচন করা আবশ্যক। গাছে ফল ধরিলে লতায় আর ফেঁকড়ী বাহির করিতে দেওয়া উচিত নহে। নূতন শাখা বা ফেঁকড়ি মুখরিত হইলেই ভাজিয়া দিতে হইবে কিন্তু আসল ডগাটি ভাঙ্গা উচিত নহে। ফল বড় করিতে হইলে নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটীমাত্র বিশিষ্ট ফল গাছে রাখিয়া অবশিষ্ট গুলিকে ত্বরায় ভাজিয়া দিতে হয়।

চৈত্র মাস হইতে ফল পাকিতে আরম্ভ হয়। ফল পাকিলে অতি সুগন্ধ বাহির হয়। বর্ষাকাল পর্য্যন্ত গাছ জীবিত থাকে কিন্তু তখন গাছের ফল ধরিলে ফলের নিম্নে ইষ্টক বা টালি পাতিয়া দিতে হয় নতুবা ঠাণ্ডা লাগিয়া ফল পচিয়া যায়।

### ফুটি (Melon sp.)

তরমুজ, কাঁকুড় প্রভৃতির ত্রায় নদীর চর, বিল বা পলি-পড়া জমিতে ফুটির আবাদ করা প্রশস্ত। মাঘ মাসে জমিতে তিন চারিবার লাঙ্গল ও মই দিয়া মাটি তৈয়ার করিতে হয়। অতঃপর ক্ষেত্রের মধ্যে ৩৪ হাত ব্যবধানে মাদা করিয়া প্রতি মাদায় ৩৪টা বীজ বপন করিবে। বপনের পূর্বে বীজগুলিকে দ্বাদশ ঘণ্টাকাল আন্দাজ জলে ভিজাইয়া রাখিবার পর মাদায় বপন করিতে হইবে। গাছের গোড়ার মাটি না কঠিন হইয়া যায়, একজু মধ্যে মধ্যে নিড়ানি করা আবশ্যক। গাছ বড় হইয়া উঠিলে আর কোন পাটের বিশেষ প্রয়োজন হয় না।



বৈশাখ মাস হইতে গর্দে ফল ধরিতে আরম্ভ হয়। ফল পাকিলে ফুটি কাটিয়া যায় এবং তখনই উহা খাইবার সময়। সুপক ফুটি চিনির সহিত খাইতে হয়। কাঁচা অবস্থায় কাঁকুড়ের ছায় ইহাতে তরকারী রন্ধন করিয়া খাওয়া যাইতে পারে।

---

### টেপারী (Gooseberry)

কোমল শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট ইহা একটা বারমেসে উদ্ভিদ। টেপারী গাছ প্রায় দুই হাত উচ্চ হয়। ইহার ফল সকলের নিকট উপাদেয় নহে, তবে ছোট ছোট ছেলেরা ইহা খাইয়া থাকে। সাহেবদিগের ইহা Dessert fruit মধ্যে পরিগণিত।

গামলায়, বাস্কে অথবা হাপোরে জুলাই মাসে বীজ পাত দিয়া চারা উৎপন্ন করতঃ চারাগুলি ৪।৫ অঙ্গুলি বড় হইলে পটিতে রোপণ করিতে হয়। আশ্বিনের শেষ ভাগ হইতে কার্তিকের প্রথম ভাগ মধ্যে রোপণ-কার্য শেষ করিতে হয়। ইহার বীজ অতিশয় ক্ষুদ্র, এজন্য একবারে বপন করিলে স্রবীধা হয় না। গামলা বা ভাটিতে হাল্কা মাটি দিয়া যথানিয়মে বীজ বপন করিলে যে চারা জন্মিবে, তাহা ৪।৬ অঙ্গুলি বড় হইলে কেবল তিন ফুট অন্তর শ্রেণী করিয়া তন্মধ্যে দুই হাত অন্তর এক-একটা চারা পুতিতে হয়। চারা গাছগুলি আধ হাত উচ্চ হইলে তাহাদিগের গোড়ায় মাটি উচ্চ করিয়া দিতে হইবে। চৈত্র মাসের শেষ ভাগ হইতে ফল পাকিতে আরম্ভ হয়। শাখা-প্রশাখা লম্বিত হইয়া গেলে ডগা কাটিয়া দেওয়া উচিত কারণ তাহা হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক শাখা জন্মে ও ফল অধিক হয়। কিন্তু ফলের আকার বড় করিতে হইলে কতকগুলি কেঁকড়ি ভাদিয়া দেওয়া উচিত। ফল ধরিতে আরম্ভ

হইলে গোড়ায় ভরল-সার দিলে ভাল হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে গাছের অর্ধ-পক্ষ ডগা কাটিয়া রোপণ করিলে চারা জন্মে এবং যথাসময়ে ফল প্রদান করে।

### শাঁখালু ( Pachyriza )

শাঁখালু—ফলের মধ্যে গণ্য। লতার মূলদেশে ইহা জন্মিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে ইহা গাছের অন্তর্ভৌম কন্দ মাত্র। ইহার উপরিভাগের ছাল ও ভিতরের সার অংশ ষ্ঠে বর্ণের। কন্দগুলি প্রায় শঙ্খের স্থায় বলিয়া বোধ হয় ইহার নাম শাঁখালু হইয়াছে।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ক্ষেত্রে মাদা করিয়া বীজ বুনিতে হয়। প্রথমতঃ ক্ষেত্রে উত্তমরূপে চষিয়া, পরে তাহাতে দুই হাত অন্তর এক একটা গর্ত করিয়া মাটি চূর্ণ এ সারমিশ্রিত মাটি দ্বারা গর্তগুলি পূর্ণ করতঃ তাহাতে বীজ পুতিতে হইবে। গর্তগুলি দেড় হাত গভীর ও এক বা দেড় হাত ব্যাসযুক্ত হওয়া আবশ্যক, কেন না মাটি যত আলগা থাকিবে, ততই উহার মূল বড় হইবে। নিচু বা রসা জমিতে কন্দ তত মিষ্ট হয় না কিন্তু সরস দো-আঁশ মাটিতে কন্দ যত উৎপন্ন হয় তাহা তত কোমল হয় না। প্রত্যেক মাদায় ঝাঁক ঝাঁক করিয়া দুইটা বীজ পুতিতে হয়। চারা জন্মিলে প্রতি মাদায় একটীর অধিক গাছ রাখা উচিত নহে। চারা উদ্গত করিতে হইলে, আবশ্যক মত জলসেচন করিবে এবং মধ্যে চারা-গুলিকে নিড়ান করিয়া দিবে। ইহার লতা বৃহদাকার হইয়া থাকে, সুতরাং অতি ঘনভাবে মাদা করিবে না, অথবা একটা মাদায় একটীর অধিক গাছ রাখিবে না। বর্ষা সমাগত হইলে গাছে আর জল দিতে হয় না, কিন্তু এই সময়ে বাহাতে ক্ষেত্রে অগাছা জল জন্মিতে না

পারে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে এবং গাছের গোড়ায় মাটি উচ্চ করিয়া দিবে।

শীতকালে লতা সমুদায় বিবর্ণ ও নির্জীব হইয়া আসে। সেই সময় কন্দ উঠাইয়া লইবার সময়। কয়েক মাস মধ্যেই উহা খাইবার উপযোগী হইয়া উঠে। কন্দ না উঠাইলে পর বৎসর পুনরায় তাহা হইতে নতুন গাছ উৎপাদিত হয় এবং সেই মূল বড় হইতে থাকে, কিন্তু দুই তিন বৎসরে কন্দের শস্ত ছিব্ড়া-বিশিষ্ট হয় সুতরাং তাহা খাইয়া আরাম পাওয়া যায় না। এজন্য প্রতি বৎসর বীজ বপন করিয়া বৎসর মধ্যেই কন্দ ব্যবহার করা উচিত। দুই তিন বৎসর যে কন্দ মাটিতে থাকিতে পায় তাহা ১০। ১৫ সের পর্য্যন্ত ওজনের হইতে দেখা গিয়াছে।

### ট্রুবেরী ( Strawberry )

ট্রুবেরী বিলাতী ফল, কিন্তু ইন্দীয়ায় এদেশে কোন কোন সৌখিনের বাগানে অল্পাধিক পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। ইহার গাছগুলি আধ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। গাছের আকার আমকল গাছের স্তায়, পত্রের ধরণ অনেকটা গোলাপ পাতার স্তায়। উদ্ভিদ শাক্সামুসারে ইহা গোলাপের সহিত সমশ্রেণীর অন্তর্গত। কয়েক বৎসর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে ইহার কতকগুলি চারা আনয়ন করিয়া রাজনগরে (বারভার্ডা) ইহার আবাদ করিয়াছিলেন।

আখির মাসের মধ্যভাগে ট্রুবেরিগাছ রোপণ করিবার সময়। রোপণ করিবার অন্ততঃ এক মাস পূর্বে জমি পতীরূপে কোদলাইয়া, তাহার মাটি চুর্ক করিয়া ইহা হইতে তাৎক্ষণিক, সুখা ও আলাহার শিকড় উত্তম-

রূপে বাছিয়া কেলিতে হয়। টুবেরী,—পটিতে রোপণ করিতে হয়। পটির প্রস্থ ও-হাত হওয়া উচিত।

গাছ রোপণ করিবার ৪৫ দিন পূর্বে পূর্বকৃত পটির মধ্যে গর্ত করিয়া গর্তের মাটির সহিত খোয়াড় বা আস্তাবলের পুরাতন আবর্জনার সহিত পাতা-সার মিশাইয়া মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ উক্ত গর্ত পূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে। প্রত্যেক পটির দীর্ঘ ভাগে তিনটা করিয়া শ্রেণী হইবে এবং সেই শ্রেণীর মধ্যে নয়-ইঞ্চি বা একবিতস্তি ব্যবধানে এক-একটা গর্ত করিতে হইবে। পটিগুলি ছয় হইতে আট ইঞ্চি গভীর ও তাহার পরিধি তদনুরূপ হওয়া উচিত। যে দিন গাছ রোপণ করিতে হইবে, সেই দিন প্রাতঃকালে পূর্বকৃত সারিমিশ্রিত গর্তের মাটি একবার উলটপালট করিয়া দেওয়া আবশ্যিক। অনন্তর অপরাহ্নে প্রত্যেক গর্তের মাটি জৈবং চাপিয়া দিয়া এক একটা গাছ যত্নসহকারে পুতিয়া দিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জলসেচন করিতে হইবে। গাছ রোপণের দুই এক দিন পূর্বে যদি বৃষ্টি হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে মাটি কৰ্দমাক্ত হইয়া থাকিবে, সুতরাং সে সময় গাছ রোপণ না করিয়া আরও দুই চারি দিন অপেক্ষা করিতে হইবে। মাটির অকরা বুয়া হইলে গাছ রোপণ করিয়া আরাম পাওয়া যায় এবং গাছ সকলও রোপিত হইয়া আরাম পায়। গাছ রোপণ করা হইলে দুই-চারি দিবস দিনের বেলায় গাছগুলিকে রোজ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কলার পেটো দিয়া ঢাকিয়া রাখা এবং সায়াংকালে খুলিয়া দেওয়া উচিত। অনন্তর সকালে ও বৈকালে জলসেচন করিলে এবং রৌদ্রের সময় ঢাকিয়া রাখিলে পাচ সাত দিবসের মধ্যে গাছগুলি মাটিতে লাগিয়া যাইবে। তখন ইহাদিগকে অন্তান্ত গাছের ন্যায় পাট করিসেই চলিবে।

টুবেরী গাছ অতিশয় জলপিপাসু, এবং বাহ্যতে ইহার কোনরূপে

জলের অভাব না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গাছ রোপণ করিবার সময় যদি মাটিতে সার না-দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে এক্ষণে গাছের গোড়ায় সার দিয়া মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দিতে হইবে। যথানিয়মে সেবা করিলে অগ্রহায়ণ মাসের শেষাংশেই প্রত্যেক গাছ হইতে কতকগুলি গাছ বাহির হইয়া প্রত্যেকটি ঝাড়ে পরিণত হইবে।

মাঘ মাসের শেষভাগ হইতে ষ্ট্রবেরি গাছে ফুল ধরে এবং সেই ফুল হইতেই দুই-দশটা সুপক ফল পাওয়া যায়। ষ্ট্রবেরি গাছে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত ফল ফুল থাকে, কিন্তু বর্ষা পড়িলে আর ফল হয় না। ষ্ট্রবেরি ফল দেখিতে অনেকটা লিচু ফলের স্থায় কিন্তু তাহা অপেক্ষা সমধিক মনোহর। আশ্বাদ অম্লমধুর ও রসনা তৃপ্তিকর ইহার বীজগুলি টেপারি বীজের স্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ষ্ট্রবেরি গাছের গোড়া হইতে দড়ী অর্থাৎ স্তম্ভীয় লতাবৎ ফেঁকড়ি বাহির হয়। ইহাদিগকে ইংরাজীতে Runners বলে। ইহাতে আপাততঃ পাতা থাকে না কিন্তু দুই একটা করিয়া গ্রন্থি থাকে এবং তাহাতে ছোট ছোট চারা গাছ থাকে। দড়ী মাটি স্পর্শ করিলে প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে শিকড় বাহির হইয়া ভূগর্ভ মধ্যে প্রবেশ করে, পরে প্রত্যেকটা স্বতন্ত্র গাছে পরিণত হয়। আশ্বিনের শেষভাগে এই সকল চারা গাছ স্বতন্ত্র করিয়া আবার স্থানান্তরে রোপণ করিতে পারা যায়। এই সকল ফেঁকড়ি হইতে যে গাছ জন্মে, তাহাদিগকে তথা হইতে উঠাইয়া না-লাইলে পটীগুলি আগাছাপূর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং তাহাতে ফল হওয়া সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় বৎসর ইহাদিগকে উত্তমরূপে পাট করিতে হইবে। বর্ষাকালে পাটিতে জল না দাঁড়াইতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন।

## কেন্দ্র

বর্ষার প্রাকালে গাছগুলিকে জমি হইতে উঠাইয়া কোন আবৃত স্থানে বাগানের দিরা রাখিতে পারিলে খুব ভালই হয় কারণ ইহার বর্ষার জল বড় সহ্য করিতে পারে না। পরে কার্তিক মাসে বর্ষানিয়মে পটীতে রোপণ করা চলে। তাহা ব্যতীত পৌষ মাসে এতোক গাছের গোড়ায় পকাছাই একবার করিয়া তরল সার দিতে পারিলে আরও ভাল হয়। আদি ইহাতে যে তরল সার ব্যবহার করিতাম তাহা অস্থচূর্ণের সহিত গোবর বা সর্বণ খৈল সমভাগে মিশ্রিত ও উন্নয়নরূপে বিগলিত করিয়া নইতাম। উক্ত তরল সার গাছে দেওয়ার গাছের অবয়ব যেমন সুন্দর ও পরিপুষ্ট হয়, ফলও ভেমনি অপরিমিত হয় এবং কড় বড় হয়। অনেক ফল ওজনে দুই তরি হইয়া থাকে এবং ফল বড় হইলে লিচু বলিয়া ভ্রম হয়।

প্রাক্তনসম্মত পাতনম্ ।—কার্তিক মাসে মাটির গায়লায় বা কাটের বাড়ে ৩০টা করিয়া চারা রোপণ করিলে বর্ষাসময়ে তাহারা প্রদান করে। কিন্তু বর্ষার পূর্বেই তাহাদিগকে আবৃত স্থানে রক্ষা করা প্রয়োজন এবং পুনরায় কার্তিক মাসে নূতন গাছে নূতন মাটিতে বর্ষানিয়মে রোপণ করিতে হয়।

## কেন্দ্র (Eclipta Kreda)

কেন্দ্র, কেন্দ্রী ও কেন্দ্রী—তিন নামেই ইহা অভিহিত হইয়া থাকে। কেন্দ্র এক প্রকার সুখা বাসের জার পৌড়বিশিষ্ট কিছু ফলক উদ্ভিদ। খাল, বিল ও পুকুরিণীর কিনারায় বর্ষাকালে জন্মিয়া থাকে। যে সকল নদীতে জন্মে ফল ঝড়ায় তথায় কিংবা পুকুরিণী ও বিলের কিনারায় উদ্ভূত মাসের শেষে পৌড় পুতিয়া দিলে দুই একটা বর্ষার জল পাইলেই গাছ বাহির হয়। প্রোভের জল অপেক্ষা দ্বিগুণ অধিক

জলে ও পৃথিবী বাটিতে ভাল জন্মে। আশ্চর্য জল যেমন-যেমন বাড়িতে  
 থাকে, গাছও সেই সঙ্গে বাড়িয়া উঠে। কঁচা কলের ভায় কেতোরের  
 পোক খাইতে হয়। শিকড়গুলি গাছ বসিয়া যায় এক তখনই পোক আহারণ  
 করিতে হয়। পোক তুলিয়া না লইলে আবার পরবর্তী বর্ষাকালে সেই  
 স্থানে আশ্রয় হইতে নতুন গাছ জন্মে। ইহার অল্প বিশেষ কিছু পাট  
 নাই।



## পঞ্চদশ অধ্যায়

### প্রদর্শনী

আজকাল কলিকাতা ও বাঙ্গালাদেশের নানাহানে কৃষি-প্রদর্শনী হইয়া থাকে। এই সকল প্রদর্শনীতে নানাবিধ কল, সব্জী উদ্ভাদ ও কেরাজাত অস্ত্রাদ্রব্য প্রদর্শিত হয় এবং উৎকৃষ্ট সামগ্রীর স্তম্ভ প্রদর্শকগণ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এরূপ প্রদর্শনীর সব্জী বধন একটা অঙ্গ, তখন এ পুস্তকে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু না বলিলে পুস্তকের অসম্পূর্ণতা প্রোক্ষিয়া যায়।

প্রদর্শনীতে জিনিষ প্রদর্শন করিবার কয়েকটা বিশেষ নিয়ম আছে কিন্তু তাহা সাধারণের জানা না থাকায় অনেক সময় প্রদর্শিত দ্রব্য পারিতোষিক পাইবার অযোগ্য হইয়া থাকে। সুতরাং বাহারা প্রদর্শনীতে জিনিস পাঠাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের পক্ষে সেই নিয়মগুলি জানিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

কোন জিনিষ পাঠাইবার পূর্বে প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষকে অগ্রে জানাইতে হয় এবং তাঁহাদিগের খাজায় প্রদর্শকের নাম এবং কোন্ শ্রেণীতে কোন্ দ্রব্য প্রদর্শন করিবেন ইত্যাদি লিখাইয়া দিতে হয়। পরে তাঁহারা এ সমুদায় বিশেষ বিবরণ লিখিয়া লইয়া টিকিট দেন। সেই টিকিট অতুল্যারে দ্রব্য সাজাইতে হয়। জিনিষগুলি এরূপভাবে সাজাইতে হইবে যে, সকল জিনিস যেন স্পষ্টরূপে দেখা যায় এবং সাজাইবার প্রণালী নয়নরঞ্জন হয়।

সব্জী ও তরিতরকারির মধ্যে কোন কল-পাকুড় থাকা উচিত নহে। যে সকল কল বাঁটা বাঁকানো



যায় কিন্তু এমন অনেক ফল আছে, যাহা রন্ধন করিয়া খাওয়া যায় বলিয়া উহাদিগকে সব্জীর শ্রেণী মধ্যে কোন মতে গণ্য করা উচিত নহে। আবার কাঁকড়া, মূলা, টমেটো প্রভৃতি কাঁচা অবস্থায় খাওয়া চলে, তাহা বলিয়া ইহাদিগকে ফল বলা যায় না। এইরূপে ভ্রমক্রমে সব্জীর সহিত কোনও ফল মিশাইয়া দিলে প্রদর্শিত দ্রব্য পারিতোষিকের অযোগ্য হইয়া যায়।

তরকারীর আকারের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। অনেক মনে করেন যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আকার হইলেই যথেষ্ট কিন্তু তাহা ভ্রম। প্রত্যেক সব্জীরই গুণবিশেষের জন্ত আদর হয় এবং সেই গুণ সব্জী মধ্যে থাকা প্রয়োজন। আকারের সঙ্গে গুণের সামঞ্জস্য রাখিতে হইবে। বাঁধাকপি প্রকাণ্ড আকারবিশিষ্ট হইলে চলিবে না। উহার ভিতর নীরেট ও দৃঢ় হওয়া আবশ্যিক। কুলকপির মূল বড়, দৃঢ়, শুভ্র, নয়নরঞ্জক ও অপ্ৰক্ষুটিত হওয়া উচিত। মূলা, শালগম, গাজর প্রভৃতি অতিরিক্ত বড় হইলে ছিবড়াবিশিষ্ট হয় সুতরাং অতিরিক্ত বড় করিবার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া বাহ্যতে কোমল ও সুস্বাদু হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অনেক সব্জী কাঁচ অবস্থায় জলীয়স্বাদ বা পানসে হয়, সুতরাং তাহাদিগের পূর্ণাবস্থা ভাল। প্রদর্শনীর যোগ্য আলুগুলি সুঠাম, নীরোগ ও সুদৃঢ় হওয়া স্পৃহনীয়।

এতদ্ব্যতীত প্রদর্শকগণের মধ্যে আর একটা ভ্রম দেখা যায়। প্রদর্শনীর জালিকায় দেশী সব্জীর কথা লেখা থাকিলেও তাঁহারা দেশী সব্জীর সহিত বিলাতী সব্জী দিয়া থাকেন, কিম্বা বিলাতী সব্জীর স্থানে দেশী সব্জীও মিশাল দেন। ইহাতেও প্রদর্শিত দ্রব্য পারিতোষিকের অযোগ্য হয়। এই সকল বিষয় বিশেষ বিবেচনাপূর্বক প্রদর্শনীতে জিনিষ পাঠাইতে হয়।

## প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ও উপকারিতা

আজও পর্যন্ত এদেশে অনেকে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ও উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারেন না। প্রদর্শনীতে বিস্তর লোকের সমাগম হয়, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ রং তামাসা দেখিতে যান, কেহ বা অকৃত সামগ্রী দেখিয়াই সন্তোষ লাভ করেন। উল্লিখিত উদ্দেশ্যে বাঁহারা প্রদর্শনী দেখিতে যান, তাঁহাদিগের তথায় যাওয়া-না-যাওয়া একই কথা, কেন না ইহাতে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় না। প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য—নানাহানের নানাবিধ দ্রব্য নানা লোকের শ্রম ও শিল্পজাত সামগ্রী একস্থানে সংগৃহীত হইলে প্রদর্শকগণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব উদ্ভিক্ত হয়। অনেক জিনিস একত্রে সমাধিষ্ট না হইলে কোন জিনিষের দোষগুণ বিচার হয় না। এই সকল কারণে প্রদর্শনী মাত্রই জ্ঞানলাভের কেন্দ্র-স্বরূপ মনে করা উচিত। শত পুস্তক পাঠ করিয়াও যে জ্ঞানলাভ হয় না, একটা প্রদর্শনী দর্শনে তাহাপেক্ষা অধিক জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। যিনি প্রদর্শনীর অধ্যয়ন করেন, যিনি প্রদর্শনীর উদ্ভোগী, যিনি সাহায্যকারী ইহাদিগের সকলেই প্রসংসাহ। প্রদর্শনী মাত্রই জাতীয় আয়ত্ত্বের অমোঘ উপায় বলিয়া জানিতে হইবে।

বাঁহারা তথায় জিনিষ পত্র প্রদর্শন করেন, তাঁহারা সকলেই দেশের হিতকাঙ্ক্ষী। যিনি প্রদর্শনী দেখিয়া কিছুমাত্রও শিক্ষালাভ করেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।

কলিকাতায় উপনগরীতে দুইটা কৃষি-পুষ্প-প্রদর্শনী হইত। তাহাতে ক্ষেত্রজাত নানাবিধ সব্জী, ফুল এবং গাছপালা প্রদর্শিত হইত।

দুইটা প্রদর্শনীর, একটা আলিপুর সোঁসাইটীর বাগানে, অপর সাত-

পুকুরের বাগানে অধিষ্ঠিত হইত। আলিপুরের প্রদর্শনী এখনও প্রেতি-  
বৎসর অধিষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রদর্শনী সাধারণের অর্থ সাহায্যে অর্থাৎ  
আলিপুর কৃষি-ও-উদ্যান-সমিতির উদ্যোগে সম্পন্ন হয়। সাতপুকুরের বাগানে  
যে প্রদর্শনী হইত তাহা কালিপুর হটিকলচান্দল ইনষ্টিটিউশনের ওরফে  
৮হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে ও অর্থব্যয়ে হইত। ৮হেমচন্দ্র মিত্র  
মহাশয় ছোপার্জিত বিপুল অর্থ উক্ত মেলা উপলক্ষে প্রেতি বৎসর ব্যয়  
করিতেন। এজন্য তিনি সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। প্রেতি বৎসর  
কেতুমারি মাসে এই মেলায় অধিবেশন হইত। কয়েক বৎসর হইল  
হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের দেহত্যাগ হওয়ায় তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ও প্রেদ-  
র্শনী—উভয়েরই তিরোভাব হইয়াছে। কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে  
ঐতৃধনাচ্য ব্যক্তি থাকিতে হেমবাবুর কীর্তি বিলুপ্ত হইল ইহা বাঙ্গালী  
জাতির কলঙ্ক।

আজ কাল সহরেই কি, মফঃস্বলেই কি, সব্জী বেরূপ দুস্ত্রাপ্য তাহাতে  
আমাদিগের ধারণা যে, সব্জী উৎপাদন একটা বিশেষ লাভজনক ব্যবসা।  
আমার হুই একটা বিশেষ বন্ধু সব্জীর আবাদ করিয়া বেশ হুই পয়সা  
রোজগার করেন। এই ব্যবসায় অল্প পুঞ্জিতে আরম্ভ করা বাইতে পারে।  
কেতজাত সব্জী ও তরিতরকারী নগদ বিক্রয় হয় এবং কড়েগণ আসিয়া  
কেত হইতেই জিনিষ লইয়া যায়, স্নতরাং ইহাতে বিলাত বা বাকী পড়িবার  
আশঙ্কা অতি অল্প। বাহাতে বিলাত পড়িবার আশঙ্কা নাই এবং কসল  
জন্মিলেই নগদ পয়সার আমদানী হইয়া থাকে, সে ব্যবসায় অতি অল্প  
মূলধনেই আরম্ভ করা বাইতে পারে। তবে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে  
বাঙ্গারে যত শীঘ্র জিনিষ আমদানী করিতে পারা যায় তত অধিক লাভের  
সম্ভাবনা। বাঙ্গারে যে জিনিষের নূতন আমদানী হয় তাহা লোকে আগ্রহ  
সহকারে অধিক মূল্য দিয়া গ্রহণ করে এবং যত দিন যায়, অর্থাৎ যতই সে

সব্জী পুস্কাতন হয় ও তাহার অধিক আমদানী হয়, তত তাহার দাম কমিয়া যায়। আমাদিগের নিজের এ বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তাই বলি সব্জী উৎপাদন ও বিক্রয় বড়ই সুবিধাজনক। তবে একটা ও শেষ কথা এই যে, ইহাতে যথেষ্ট অধ্যবসায় থাকা যেমন প্রয়োজন, কষ্ট সহিষ্ণুতাও ততোধিক আবশ্যক।

তরি উন্নয়নের আবশ্যক করিয়া চাষীগণ ক্রমশঃ দিনাতিপাত করে এক তাহার। সকলেই মধ্যবিত্ত জমিদারের অপেক্ষাও সুখে বসেন। জীবিকানির্ভর করে।

---

সমাপ্ত













